家用急救包怎么配

只囤药、**不备纱布碘伏**，
外伤时直接卡壳。

9 图讲清：配什么 / 别放什么 / 放哪儿 / 怎么用



依据：应急管理部《全国基础版家庭应急物资储备建议清单》（2020）、北京急救中心《家庭医疗应急物品指导目录》（2020）、国家药监局科普

骨架 · 四类齐全

记住四类，比记数量有用

齐不齐看四类，**不看件数**。




止血包扎

先止住、先盖住



消毒

清洁创面，降感染



常用药

对症备用，不囤货



工具

能动手，也能防护

分类为本文整理。应急管理部清单是「家庭应急」口径，
北京急救中心目录才是「医疗急救」口径，做急救包更贴题。


来源：应急管理部《全国基础版家庭应急物资储备建议清单》 2020-11-29;
北京急救中心《家庭医疗应急物品指导目录》 2020-08-02

清单 · 第一类与第二类

止血包扎和消毒，买什么

先止住、先盖住；消毒**首选碘伏**。

第一类 止血包扎



- 无菌纱布 3×3 、 4×4 英寸各 5 片
- 弹力绷带 3 、 4 英寸各 1 卷
- 三角巾 2 条 · 医用胶带 1 卷
- 多尺寸创可贴 约 25 片

第二类 消毒



- 碘伏 + 无菌棉签**可直接上伤口**
- 0.9% 生理盐水：冲洗伤口首选
- 消毒湿巾：只擦伤口周围皮肤

⚠ 碘过敏者禁用碘伏，甲亢病人慎用

数量参考美国红十字会四口之家最小配置，按家里人数增减；
碘伏、生理盐水的用法为国内官方科普口径。


来源：美国红十字会急救包清单；国家药监局与卫健系统健康科普；
北京急救中心《家庭医疗应急物品指导目录》 2020

清单 · 第三类与第四类

常用药和工具，怎么备


药**按用途备**，工具齐了才动得了手。

第三类 常用药



- 五个用途：退烧止痛、抗过敏
- 肠胃应急、外用止痛、清凉解暑
- 老人：硝酸甘油或速效救心丸
- 小孩：儿童退热药、无菌敷贴

第四类 工具



- 一次性医用手套、外科口罩
- 护目镜 · 圆头剪刀 · 镊子
- 电子体温计（非水银非玻璃）
- 急救毯 · 人工呼吸面膜 · 手电筒

电子血压计要定期检查电量与校准

对症备用，不盲目囤货；再加上家人长期服用的药和急救电话。
本页只给品类，具体用药遵医嘱或看说明书，不给剂量。

来源：北京急救中心《家庭医疗应急物品指导目录》 2020; 应急管理部《全国基础版家庭应急物资储备建议清单》 2020; 美国红十字会急救包清单

这几样，今天就清出去

含汞、有致癌风险，**消毒还不可靠**。

红药水（汞溴红）

含汞有毒、消毒不可靠，大面积擦伤可致坏死



紫药水（龙胆紫）

深或脏的伤口易在痂下积脓，且是潜在致癌剂

酒精、碘酒直接涂伤口

只能消毒伤口周围皮肤；碘酒还需酒精脱碘

过期药与变色变质的药

药效全无，还可能变质引发不良反应

粘连、变硬、开裂缺角的，没过期也别用

清出来的药怎么扔

破坏药品包装盒 → 随生活垃圾丢弃，或送正规回收点

⚠ 争议条目：止血粉在应急管理部清单里被列为外用药品，但国防部科普明确不建议用于伤口，本清单不列为必备。


来源：国家药监局与广西药监局用药科普；卫健系统健康科普；《国家危险废物名录》（2021 年版）；国防部网止血包扎科普

放哪儿，多久查一次

阴凉干燥、孩子够不着；每 3 个月一查。

放哪儿

- 阴凉干燥、通风避光
- 远离炉灶、水槽和发热电器
- 别放卫生间：潮气让药提前变质
- 孩子够不着，大人一伸手就到



⚠ 车上可另放一个包，但药别放汽车手套箱

多久查一次

3 个月

自查一次
每年再彻底复核

检查五步：查箱体 → 逐件查包装与有效期 → 清灰尘
→ 换掉过期或破损的 → 记下检查时间，把记录留在箱边

保质期参考：胶带、敷料、纱布、冰袋、手套、剪刀镊子
包装完好可达 5 年；酒精湿巾、抗生素软膏约 2 年。
创可贴黏性会下降，纱布包装受潮或变色也要换。

来源：卫健系统健康科普与北京急救中心药师建议（每 3 个月）；
美国红十字会急救包年度复核与物资保质期参考

割伤出血怎么处理

小伤口先冲洗；大出血**先打 120 再压**。

先判断 伤口深不深？止得住吗？



小伤口 自己处理

1. 洗手，流动清水冲伤口
2. 肥皂洗周围，别进伤口
3. 碘伏消伤口，由内向外
4. 薄涂软膏，再盖上纱布

大出血 先打 120

1. 立即打 120
2. 有条件先戴一次性手套
3. 不拔大异物，别探伤口
4. 纱布盖住，手掌用力压
5. 先盖后包，力度要适中

渗血后在原敷料上加盖继续压，不要揭下原敷料；
不按压眼部损伤、嵌入异物处，疑颅骨骨折不压头部伤口；
止血带只在有成品且受过训练时用，不用围巾皮带自制。
立即打 120: 持续胸痛超 15 分钟 / 意识模糊或抽搐昏迷 / 严重创伤或出血不止 / 呼吸困难面色青紫。

来源 :Mayo Clinic 割伤擦伤与严重出血急救；美国红十字会；国防部网止血包扎科普；卫健系统健康科普 (120 判断)


现场 · 烫伤

烫伤：冲 脱 泡 盖 送

第一步永远是**常温自来水**，冲够时间。

20 分钟

以上，冲得越早越好；3 小时内开始仍有意义



冲 15~25℃ 常温自来水持续冲洗
15~30 分钟，至少 15 分钟，越久越好

脱 冲洗后再轻柔脱去衣物
粘连处用剪刀剪开周围，保留粘着部分

泡 小面积可用冷水浸泡 10~20 分钟
大面积烫伤及老人、儿童禁止久泡

盖 无菌纱布或干净棉布轻覆创面
冷却后保鲜膜可平铺覆盖，不要缠绕

送 面积大于手掌、起泡变色、头面部或关节
婴幼儿或老人、化学或电烧伤，立即就医

不要涂牙膏、酱油、醋、香油、草木灰，也不要涂乳膏油类；
不要用冰块或冰水冷却，可能造成进一步组织损伤；
不要强行撕扯粘在皮肤上的衣物；
小于 1 厘米的水疱保留，大于 1 厘米交医生，严禁自己挑破。

来源：国内卫健系统烫伤急救科普 (15~25℃、15~30 分钟)；
英国 NHS 与澳新复苏委员会 ANZCOR 烧伤急救指南 (≥20 分钟)

收尾 · 长按保存

一张总表，长按保存

照着买、照着清、**照着查**。

分类	物品	要点
止血包扎	无菌纱布 各 5 片	渗血加盖不揭
止血包扎	弹力绷带 · 三角巾	先盖后包，适中
止血包扎	创可贴 · 医用胶带	黏性会随时间降
消毒	碘伏 + 无菌棉签	可直接上伤口
消毒	0.9% 生理盐水	冲洗伤口首选
消毒	消毒湿巾	只擦周围皮肤
常用药	退烧止痛 · 抗过敏	对症备，不囤货
常用药	肠胃 · 外用 · 解暑	遵医嘱看说明书
常用药	家人专用药	老人小孩各自备
工具	圆头剪刀 · 镊子	剪衣物取表浅异物
工具	手套 · 外科口罩	施救前先防护
工具	电子体温计	非水银非玻璃
工具	急救毯 · 手电筒	保暖、夜间取用
别放	红药水 · 紫药水	含汞或致癌，清出
别放	过期或变质药	破坏包装再丢弃

备对药 + 懂急救，才是双重保障

建议家里至少一人参加一次红会或急救中心培训

总表为本文整理，条目与要点均来自前 8 页标注的官方来源