LACTANCIA · GUÍA PARA PACIENTES

Cómo dejar de amamantar

Depende de ti y de tu bebé decidir cuándo quieres terminar con la lactancia materna. No hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo.

PUNTOS CLAVE

- La lactancia exclusiva se recomienda durante los primeros 6 meses de vida.
- No hay una forma correcta o incorrecta de dejarla: lo más sencillo suele ser quitar una toma por vez.
- Si el bebé tiene menos de 1 año, cada toma retirada se reemplaza por fórmula.
- Completar el destete puede llevar desde unas pocas semanas hasta varios meses.

Cuánto tiempo amamantar

Se recomienda amamantar a tu bebé de forma exclusiva (darle solo leche materna) durante los primeros 6 meses de vida.

La lactancia sigue aportando muchos beneficios para ti y para tu bebé después de los 6 meses. Lo protege de infecciones y hay evidencia de que ayuda con la digestión de los primeros alimentos sólidos. Además, continúa aportando el equilibrio de nutrientes que tu bebé necesita.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que todos los bebés sean amamantados de forma exclusiva durante los primeros 6 meses y que, a partir de los 6 meses, empiecen a comer alimentos sólidos sin dejar la lactancia, hasta los 2 años o más.

Dejar la lactancia de forma gradual

No hay una forma correcta o incorrecta de dejar la lactancia. Para muchas madres y bebés, dejar de amamantar ocurre de manera gradual a medida que el niño crece y come más alimentos sólidos.

Es importante que la comida sólida no reemplace simplemente a la leche materna. Hay evidencia de que la leche materna puede ayudar al sistema digestivo del bebé a manejar sus primeros sólidos.

Una vez que come sólidos, tu bebé todavía necesitará leche materna o de fórmula como bebida principal, al menos hasta su primer cumpleaños.

La leche de vaca no es adecuada como bebida principal para bebés menores de 1 año, aunque puede agregarse a los alimentos, como el puré de papas.

Seguir amamantando mientras le das algo de fórmula a tu bebé puede funcionar muy bien.

Los bebés amamantan por consuelo además de por alimento. Retirar la lactancia poco a poco les da tiempo a ambos para acostumbrarse a la idea. Dejarlo gradualmente también ayuda a prevenir problemas como pechos muy llenos y duros (congestión) y mastitis.

Probablemente te resulte más fácil quitar 1 toma por vez. No importa qué toma quites primero, así que normalmente se tratará de cómo encaja con tu vida. Por ejemplo, algunas madres prefieren continuar con las tomas nocturnas para que su bebé siga teniendo el consuelo de noche.

Si tu bebé tiene menos de 1 año, tendrás que reemplazar la toma de pecho que quitaste por una toma de fórmula en biberón o, si tiene más de 6 meses, en vaso o taza.

Si tu hijo tiene más de 1 año y come y bebe una variedad de alimentos, no necesitará una toma de reemplazo.

Una vez que tú y tu bebé se hayan adaptado a un patrón con 1 toma menos, puedes pensar en quitar otra. Dejar la lactancia por completo puede llevar desde unas pocas semanas hasta varios meses.

Si estás intentando dejar la lactancia y tienes problemas, puedes obtener ayuda e ideas de una matrona o visitadora de salud, o de un especialista en lactancia.

Combinar leche materna y fórmula

Algunas mujeres deciden combinar la lactancia con biberón de fórmula en lugar de dejar la lactancia por completo.

Si quieres hacer esto, es mejor esperar hasta que tu producción de leche esté completamente establecida. Esto puede llevar alrededor de 6 a 8 semanas.

Puedes empezar reemplazando 1 de las tomas diarias habituales de tu bebé por un biberón de fórmula o, si tu bebé tiene más de 6 meses, por una taza o vaso.

Motivos frecuentes para dejar la lactancia

Pechos sensibles o dolorosos

A algunas mujeres amamantar les resulta incómodo, especialmente en los primeros días y semanas. Los problemas frecuentes incluyen pezones sensibles o agrietados y pechos dolorosos.

Estos problemas suelen ocurrir cuando el bebé no está bien posicionado o no está bien prendido al pecho. Una matrona, visitadora de salud o especialista en lactancia puede ayudarte con la posición y con que el bebé se prenda correctamente.

No tener suficiente leche

Muchas mujeres se preocupan porque su bebé no recibe suficiente leche cuando en realidad tienen de sobra para cubrir sus necesidades.

Una matrona, visitadora de salud o especialista en lactancia puede sugerir formas de aumentar la producción si es necesario. Tal vez solo se trate de asegurarte de que tu bebé esté bien prendido al pecho y de que amamantes con la frecuencia suficiente.

Volver al trabajo

Algunas mujeres se preocupan por la lactancia y el regreso al trabajo. Volver a trabajar no significa necesariamente que tengas que dejar de amamantar.

Si tu producción de leche está bien establecida, el regreso al trabajo no tiene por qué afectarla. Puedes extraerte leche en el trabajo, dar tu leche a la persona que cuida a tu hijo, o darle fórmula mientras no estés.

Si tu empleador no conoce las normas sobre lactancia y extracción de leche en el lugar de trabajo, vale la pena compartir con él la guía de ACAS sobre embarazo y maternidad, o contactar a tu sindicato si tienes uno.

Irse de vacaciones

Como con el trabajo, irse de vacaciones no significa que tengas que dejar la lactancia. De hecho, amamantar puede ser más práctico mientras estás fuera.

Si amamantas, no tienes que preocuparte por hervir agua ni esterilizar el equipo de alimentación. Además, si viajas en avión, no hay que preocuparse por las restricciones para llevar biberones o vasos de fórmula en los controles de seguridad del aeropuerto.

La lactancia también ayuda a igualar la presión en los oídos de tu bebé durante el despegue y el aterrizaje.

Quedar embarazada de nuevo

Si quedas embarazada otra vez mientras amamantas, no debería afectar a tu bebé ni al embarazo. Sin embargo, puedes sentirte cansada, y los cambios en el apetito y en las emociones pueden hacer que amamantar sea más difícil.

No te desanimes por amamantar a un bebé mayor y a un recién nacido (lactancia en tándem). Cuanta más leche toman tus bebés, más producen tus pechos, así que es posible alimentar a más de 1 bebé.

Tomar algunos medicamentos

La mayoría de los medicamentos se pueden tomar durante la lactancia sin dañar a tu bebé.

Pero siempre es mejor decirle al médico, al dentista o al farmacéutico que estás amamantando.

Volver a amamantar después de dejarlo

Dejar la lactancia no siempre tiene que ser permanente, pero volver a empezar puede llevar mucho tiempo y no todas las personas producirán lo suficiente para cubrir las necesidades de su bebé. En parte depende de lo bien establecida que estuviera tu producción de leche.

Estimular los pechos extrayéndote leche y ofreciendo el pecho a tu bebé con regularidad puede animar a tu cuerpo a empezar a producir leche de nuevo.

El contacto piel con piel con tu bebé también puede favorecer la producción de leche.

Puedes pedir ayuda a una matrona, visitadora de salud o especialista en lactancia si quieres retomar la lactancia.

Amamantar a niños mayores

No hay ninguna razón por la que no debas seguir amamantando a tu hijo durante su segundo año y más allá. Tú y tu niño pequeño pueden seguir disfrutando de los beneficios de la lactancia todo el tiempo que quieran.

Tu niño pequeño también puede encontrar consuelo en la lactancia cuando está enfermo o molesto.

TUS NOTAS O PREGUNTAS PARA LA PRÓXIMA CONSULTA

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Fuente: NHS, «How to stop breastfeeding», guía de lactancia para madres y bebés. Traducción al español para uso educativo del paciente.

Este folleto no sustituye la consulta con tu profesional de la salud. Ante cualquier duda o problema con la lactancia, consultá con tu equipo de salud.