SECCIÓN 3

Aprender a amamantar

Reproducción literal de la Sección 3 del folleto La importancia de la lactancia, en su versión en español. Se conserva el texto íntegro, la maquetación original, la infografía «Pautas para madres lactantes» y todas las imágenes de la sección.

DATOS DE LA EXTRACCIÓN

FUENTE	La importancia de la lactancia. Una guía importante sobre la lactancia para mujeres y sus familias
EDICIÓN	Best Start: Ontario's Maternal, Newborn and Early Child Development Resource Centre · revisado en 2016
ARCHIVO DE ORIGEN	breastfeeding_matter_SPANISH.pdf
PÁGINAS	18–26 del PDF · 16–24 impresas en el folleto
CONTENIDO	9 páginas · 6 fotografías · 5 ilustraciones · 1 infografía
TIPO DE EXTRACCIÓN	Literal: texto e imágenes originales, sin reedición

CONTENIDO DE LA SECCIÓN

Posiciones para amamantar 16
Ayudando a su bebé a acoplarse 16
Cómo saber si su bebé se ha acoplado bien 19
Señales de que la lactancia está yendo bien 20
Compresiones del seno 21
¿Está mi bebé recibiendo suficiente leche? 22
El tamaño del vientre de su bebé 23
Página de cierre (fotografía) 24

SECCIÓN 3

Aprender a amamantar

Posiciones para amamantar



Cuando esté preparada para alimentar a su bebé, asegúrese de que usted y su bebé estén en una posición que facilite la lactancia. Las madres y los bebés pueden amamantar en varias posiciones. Al principio puede encontrarse más cómoda en una cierta posición, como sentada en su silla favorita o acostada en la cama. A medida que usted y su bebé se conviertan en expertos de la lactancia, será capaz de alimentar a su bebé en cualquier lugar, mientras camina, mientras lo sostiene en un cargador para bebés o sentada a la mesa.

Cualquiera que sea la posición que le guste usar (lactancia semiacostada, sentada o acostada), su bebé debe estar en una posición que le permita acoplarse de manera profunda y para que trague de manera fácil. Aquí hay algunas cosas que tener en mente:


- Haga que su espalda esté bien apoyada.
- Asegúrese de estar en una posición que no le cause dolor (de una episiotomía o cesárea).
- La oreja, hombro y cadera de su bebé deben estar en una línea recta.
- La cabeza de su bebé debe estar ligeramente inclinada hacia atrás. Esto le permite acoplarse de manera profunda y tragar más fácil.
- Tenga a mano una bebida para usted antes de comenzar.

Ayudando a su bebé a acoplarse

Cuando su bebé esté listo para acoplarse, acérquelo a sus pechos. Existen varias posiciones y maneras de acoplar al bebé. Aquí hay algunos consejos que le pueden ayudar.

Barriga a mamá – Posicione la barriga de su bebé sobre su barriga. Sostenga los hombros y el cuerpo de su bebé ya que es mejor para los bebés cuando pueden levantar y mover la cabeza libremente.

Posiciones – En una posición sentada, coloque sus dedos en ambos lados de la cabeza del bebé por debajo de las orejas o soportando su cuello. En una posición semiacostada o acostada de lado, su bebé es libre de mover la cabeza.



Posición acostada

Cuando está cansada (¡y todas las madres primerizas lo están!) la postura acostada para amamantar puede ser útil.


- Acuéstese de lado, con una almohada debajo de la cabeza. A algunas madres les gusta tener una almohada detrás de la espalda o también entre las rodillas.
- Deje que la almohada apoye el peso de su cabeza.
- Ponga a su bebé de lado y mirando hacia usted.
- Acerque al bebé de tal manera que su nariz esté a la altura de su pezón y su barbilla se presione contra el pecho. Cuando el bebé incline la cabeza y abra completamente la boca, acérquelo para ayudar a que se acople.



Posición invertida o "de rugby"

(cuando amamante del pecho izquierdo)

- Ponga una almohada detrás de su espalda y a su lado para apoyar su brazo y al bebé.
- Sostenga al bebé a su lado con su cuerpo entre su codo izquierdo y el costado, de tal manera que las piernas y pies del bebé estén hacia su espalda.
- Su mano izquierda estará detrás de los hombros y el cuello del bebé.
- Puede sostener su seno con la mano derecha.



Posición sentada cruzada o de acunar cruzada *(cuando amamante del pecho izquierdo)*

- Sostenga a su bebé con el brazo derecho.
- Coloque la mano derecha detrás de los hombros y cuello del bebé.
- Puede sostener su seno con la mano izquierda.



Posición sentada o de acunar


(cuando amamante del pecho izquierdo)

- Sostenga a su bebé con el brazo derecho, con la cabeza del bebé cerca de su codo. Su mano sostiene su trasero.
- Puede sostener su seno con la mano derecha si es necesario, o puede usar la mano derecha para sostener el peso del bebé.

Cualquier postura que sea cómoda para usted y para su bebé es una buena postura. Una buena postura permite que el bebé se acople bien.

Mano guía – En una posición sentada, puede que necesite sostener su seno mientras el bebé se acopla. Cuando utilice sus dedos para sostener su seno, asegúrese de que estén alejados del área oscura o rosada (areola) alrededor de su pezón.

Acoplamiento – Sostenga la boca de su bebé a la altura de su pezón. Cuando el bebé se acopla bien, presiona su barbilla contra su pecho, su cabeza está inclinada hacia atrás y la punta de su nariz puede tocar su pecho. Lo ideal es que introduzca en su boca el pezón y parte de su pecho.



Colocar una boca amplia en su seno – La barbilla de su bebé tocará su pecho, alrededor de una pulgada de su pezón. Entonces puede esperar a que su boca se abra de manera amplia sobre su pezón. Después, utilizando el pulgar de su mano guía para amamantar, empuje de manera ligera su areola en la boca de su bebé. Su pezón será casi la última parte dentro de su boca. Acurruque sus hombros aun más. Cuando hay un acoplamiento profundo, habrá más areola en la boca del bebé y usted estará más cómoda. Su bebé puede ahora comenzar a succionar. No necesita empujar a su bebé hacia su pecho. De hecho, a los bebés no les gusta ser empujados y puede que empujen su mano de vuelta. Esto le puede hacer pensar que su bebé no quiere comer. Cuando esté sentada puede utilizar un reposapiés para estabilizar su regazo y ayudar a que la almohada se quede en su lugar.

Almohadas – Cualquier tipo de almohada puede servir de apoyo, en especial bajo sus muñecas y codos. También pueden proteger su cicatriz si tuvo una cesárea.

Un último vistazo – Cuando su bebé se esté alimentando notará que su barbilla está escondida entre su pecho, su cabeza está inclinada ligeramente hacia atrás y su nariz está libre.

> *“Los consultores de lactancia son un gran recurso al cual acudir si tiene dificultades al amamantar.”*

> *"La lactancia es un proceso de aprendizaje y puede que tome más tiempo de lo esperado. Es la experiencia de vinculación más reconfortante y emocional que puede tener con su bebé. Incluso a los 6 meses, si ella se molesta mucho, el cargarla en contacto piel a piel y/o el amamantarla siempre calma a mi hija."*

Si su bebé se queja y no se acopla, intente estas cosas:

- Ubicarlo nuevamente en una posición vertical entre sus senos.
- Acarícielo y hable a su bebé hasta que se calme.
- Cálmese. Esto también calmará a su bebé.
- Cambie de posición para amamantar.
- Vea si el bebé se acoplará por sí solo en la posición semiacostada.
- Extraiga un poco de leche sobre su pezón para que el bebé pueda olerlo y probarlo inmediatamente.

Si no puede acoplar a su bebé, pida ayuda. Para información *Para recibir ayuda*, vaya a la página 40 de este folleto.

Cómo saber si su bebé se ha acoplado bien

Mientras su bebé está amamantando, puede saber que se ha acoplado bien si sucede lo siguiente:



- Usted está cómoda amamantando.
- Su bebé está succionando de manera regular, lenta y firme.
- Puede escuchar que traga.
- La boca de su bebé está abierta de manera amplia y sus labios se ensanchan. Si su bebé está acoplado profundamente, puede que no vea sus labios.
- Las orejas o las sienes de su bebé se mueven mientras succiona.

Cuando su bebé termine de amamantar:

- Sus pezones tendrán una forma normal y circular y no deben verse comprimidos.
- Sus senos se sienten más suaves/ligeros. Esto se nota más durante las primeras semanas de lactancia.
- Su bebé debe estar relajado y satisfecho. Puede que los bebés más jóvenes se queden dormidos después de comer. Los bebés más grandes pueden quedarse despiertos pero le dejarán saber que han terminado al voltearse o comenzar a jugar.
- De manera frecuente, los bebés más jóvenes se quedan dormidos sobre el pecho, pero se despiertan de nuevo cuando los aleja del pecho. Si su bebé hace esto, es una señal de que todavía no había terminado.



Señales de que la lactancia está yendo bien

¿Cada cuánto debo amamantar y por cuánto tiempo?

La mayoría de los bebés recién nacidos se alimentan al menos ocho veces en 24 horas. El amamantar proporciona a su bebé la comida que necesita para crecer y desarrollarse. También es reconfortante y le ayuda a usted y a su bebé a desarrollar una conexión emocional cercana. Algunos bebés se alimentan de manera regular y establecen rápidamente una rutina, a otros les gusta alimentarse por períodos cortos muy seguido, en especial durante la tarde o en la noche. A esto se le conoce como "alimentación en grupos" (cluster feeding). Es muy común en las primeras semanas.

Alimente a su bebé cuando muestre señales de hambre. Deje que se alimente tanto tiempo como quiera. Cuando termine de alimentarse del primer seno, hágalo eructar y ofrezca el segundo seno. Esto asegurará de que tenga un buen suministro de leche a medida que su bebé crece. Algunos bebés se alimentan por 20 minutos, otros toman más tiempo. Puede que su bebé se alimente por más tiempo en algunas comidas y menos tiempo en otras. No necesita medir el tiempo que toma en alimentarse o preocuparse por ello siempre y cuando su bebé:

- Se alimente con frecuencia, 8 veces o más en 24 horas, tanto durante el día como durante la noche. Esto es normal. Si su bebé pasa por periodos largos sin alimentarse, busque una evaluación de un proveedor de asistencia sanitaria calificado.
- Se alimente succionando y tragando de manera firme.
- Tenga muchos pañales mojados y sucios.
- Gane peso de manera adecuada. Es normal que su bebé pierda peso durante los primeros días después del parto (consulte la gráfica en la página 22).

Recuerde; observe a su bebé, no el reloj.



A medida que los bebés crecen pueden cambiar qué tan seguido o la cantidad de tiempo durante el que se alimentan. Siga las señales de su bebé. Su bebé sabe cuando tiene hambre y cuando está lleno.

Cuando su bebé quiera alimentarse, comience con el seno más lleno. Éste es normalmente el seno del que se alimentó la última vez. Si tan solo se alimentó de un seno la última vez, comience con el lado del que no se alimentó. Deje que su bebé se alimente tanto como esté interesado. Cambie al otro seno:

- Una vez que el primer seno se sienta suave/ligero.
- Si su bebé ya no está succionando de manera activa.
- Si su bebé suelta el seno o se queda dormido.

Asegúrese de que su bebé se alimente de manera regular de ambos senos. Si su bebé suelta el segundo seno y todavía parece tener hambre, ofrezca el primer seno de nuevo. Su pecho continúa produciendo leche mientras su bebé se alimenta. El ofrecerle al bebé cada seno más de una vez durante una comida se conoce como lactancia “de intercambio” (switch nursing). Esto puede ser de ayuda durante los primeros días o semanas.

Algunos bebés sueltan el seno cuando han terminado, otros no. Si su bebé hace varias pausas y ya no está tragando, lo puede separar del pecho. Deslice un dedo entre su seno y las encías de su bebé para detener la succión. Algunos bebés siempre se alimentan de ambos senos, otros no. Algunos bebés toman una siesta corta y después se alimentan del otro seno.

Cambie el seno con el que comienza en cada comida. En ocasiones las madres saben qué lado está más lleno. Algunas mujeres llevan un registro poniendo un listón en su sostén o una pulsera en su brazo. Haga lo que funcione mejor para usted y su bebé.

Compresiones del seno

Algunos bebés recién nacidos se quedan fácilmente dormidos mientras están alimentándose. Para animar a su bebé a que siga alimentándose hasta que esté lleno, puede usar compresiones del seno. Comprima el pecho entre sus costillas y la areola para ayudar a que la leche fluya si:

- Su bebé se queda dormido después de unos pocos minutos de estar en el pecho.
- Succiona ligeramente y traga poco.
- La succión se convierte en un chupar ligero o en mordisqueos.
- La succión se detiene.

Utilice su mano entera y comprima de manera suave pero firme. Las compresiones del seno nunca deben doler o dejar un moretón. Note si su bebé traga más cuando comprime sus senos entre cada succión o con una sola succión. Esto le ayudará a su bebé a obtener más leche. Para algunos bebés, el utilizar compresiones del seno mientras amamanta puede ser un problema ya que el flujo de la leche es demasiado grande. Algunos bebés pueden rechazar el pecho por esta razón. Las compresiones del seno solo deben utilizarse cuando se requiere de un flujo de leche más intenso. Lo mejor es observar el patrón de la succión de su bebé.

Para obtener más información sobre cómo hacer compresiones de manera adecuada, vea el video en www.breastfeedinginc.ca/content.php?pagename=vid-4dayold. A algunos bebés les va mejor cuando las compresiones suceden una vez que el bebé comienza a succionar como se ve en el video. A otros bebés les va mejor cuando las compresiones suceden cuando hay una pausa en la succión. Experimente y observe qué es lo que funciona mejor para su bebé.

¿Está mi bebé recibiendo suficiente leche?


Estas son señales de que su bebé está recibiendo suficiente leche (consulte la gráfica a continuación):

- Su bebé se alimenta al menos ocho veces en 24 horas.
- Su bebé tiene suficientes pañales mojados y sucios de acuerdo a su edad.
- Su bebé está activo y tiene un llanto fuerte.
- Su bebé tiene la boca húmeda y rosa, y sus ojos están brillantes.

Para asegurarse de que su bebé reciba suficiente leche durante la primera semana, mantenga un registro del número de pañales mojados y sucios en un período de 24 horas.

Al principio puede ser difícil para los padres primerizos el saber si su bebé tiene un pañal mojado. Un pañal muy mojado es más pesado que un pañal seco. Si quiere saber cómo se siente un pañal muy mojado, vierta 30 ml (dos cucharadas) de agua en un pañal seco. La orina de su bebé (pipí) debe ser clara o de un amarillo pálido, y no debe tener ningún olor. Si un pañal sucio está pesado, cuéntelo tanto como un pañal mojado como un pañal con popó.

Si su bebé no tiene varios pañales mojados y sucios, ¡busque ayuda de inmediato!



Para descargar esta gráfica, visite http://www.beststart.org/resources/breastfeeding/pdf/spanish_magnet_art.pdf

En promedio, los bebés pierden un 7% del peso que tuvieron al nacer durante los primeros tres días de vida. Por ejemplo, un bebé de siete libras perderá aproximadamente 230 gramos o media libra. A partir del cuarto día, su bebé debe ganar de 20 a 35 gramos por día (de 2/3 a 1 1/3 onzas) y alcanzar el peso que tuvo al nacer para el día 10 a 14. Durante los primeros tres o cuatro meses su bebé debería seguir ganando de 20 a 35 gramos (2/3 – 1 1/3 onzas) por día. Si su bebé gana peso de manera lenta, despiértelo para más periodos de alimentación y busque ayuda para asegurarse de que su bebé esté alimentándose bien. También puede utilizar las compresiones del seno y alimentar de ambos senos más de una vez. También puede exprimir leche a mano y darle a su bebé cualquier leche materna que obtenga. Siempre amamante cuando parezca que su bebé tenga hambre.



Una vez que el bebé tenga dos días de nacido, anticipe que su bebé lactante tenga 3 o más deposiciones grandes, blandas y normalmente granosas por día. Vaya a la sección *Para recibir ayuda* en la página 40 si su bebé no tiene 3 o más deposiciones al día si es menor de tres semanas de edad.

Entre las tres y cuatro semanas, algunos bebés sólo tendrán de 1 a 2 deposiciones por día. Algunos tienen una sola deposición grande cada par de días. Esto es normal siempre y cuando su bebé se esté alimentando bien, parezca satisfecho y su popó sea suave. Si su bebé no se está alimentando bien, es más exigente de lo normal o no ha tenido una popó en más de una semana, consulte la sección *Para recibir ayuda* en la página 40 de este folleto.

> ***"Las parejas y los familiares pueden ayudar de muchas maneras. El cambiar al bebé, hacerlo eructar, mecerlo o cantarle puede ayudarles a llegar a conocer al bebé y saber que están ayudando."***

El tamaño del vientre de su bebé

Su bebé necesita alimentarse de manera seguida ya que su estómago es pequeño. Cuando su bebé nace, su estómago es del tamaño de una cereza. Para el día tres, el estómago de su bebé incrementa al tamaño de una nuez. A los siete días de edad, el estómago de su bebé es del tamaño de un huevo. Puede ver esto en la gráfica en la página 22.

