Sabit Süratli ve Sabit Hızlı Hareket Grafikleri & Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişmeye Giriş

FB.6.2.4. Sabit süratli ve sabit hızlı hareket kavramlarını karşılaştırarak yol-zaman ve sürat-zaman grafiklerini yorumlayabilme · FB.6.3.1. Canlılarda eşeysiz ve eşeyli üremeyi temel özellikleriyle karşılaştırıp eşeysiz üreme çeşitlerini örnek canlılarla ilişkilendirebilme

HATIRLAYALIM

- Birim zamanda alınan yola sürat ($\frac{\text{Alınan Yol}}{\text{Geçen Zaman}}$), yönlü yer değiştirmeye hız denir; çembersel pistte eşit sürede eşit yol alan aracın sürati sabitken yönü değiştiği için hızı değişkendir.
- Sabit süratli harekette yol–zaman grafiği sıfırdan düzgün artan doğru, sürat–zaman grafiği yatay düz çizgidir; yol–zaman grafiğindeki yatay çizgi cismin durduğunu gösterir.

1 EŞLEŞTİRME

Sol sütundaki canlı örneklerini ve hareket kavramlarını sağ sütundaki açıklamalarıyla eşleştiriniz.

a	1. Bakteri, amip ve öglena	a)	Bölünerek eşeysiz çoğalan tek hücreli canlılar
c	2. Hidra, mercan ve bira mayası	b)	Kopan vücut parçasından rejenerasyonla yeni birey oluşturan hayvanlar
b	3. Denizyıldızı ve planarya	c)	Ana gövdedeki çıkıntıdan tomurcuklanarak çoğalan canlılar

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Hareket grafikleri ve canlılarda üreme konusuyla ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Sabit süratli hareket yapan bir aracın sürat–zaman grafiğinin altındaki alan aracın aldığı toplam yolu verir.	☑	☐
Üreme olayı tek bir bireyin hayatta kalması için zorunludur; üremeyen canlı yaşamını sürdüremez.	☐	☑
Kertenkelenin kopan kuyruğunu yeniden onarması birey sayısını artırmadığı için üreme değil, doku yenilenmesidir.	☑	☐
Eşeysiz üreme sonucunda meydana gelen yavru bireyler ata canlıdan farklı kalıtsal özellikler taşır.	☐	☑

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutuda verilen uygun kavramlarla tamamlayınız.

üreme · vejetatif · sabit · bölünme

1. Doğrusal yolda eşit sürede eşit yol alan cisim **sabit** hızlı hareket yapar.
2. Canlıların nesillerini devam ettirmek amacıyla çoğalmasına **üreme** denir.
3. Söğüt dalının suda köklendirilip dikilmesi **vejetatif** üremeye örnektir.

4 KISA CEVAP

Doğrusal bir yoldaki I. aracın konumu 0–3 saniye boyunca hep 15. metrede kalırken, II. araç her saniyede 10 metre yol almaktadır. I. araç ile II. aracın hareket durumlarını karşılaştırarak açıklayınız.

I. araçta konum hep 15 m kaldığından araç durmaktadır; II. araç ise sabit süratle ilerler.

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki doğrusal rayda hareket eden K treni ile çembersel pistte dolanan L aracı eşit zaman aralıklarında 20 metre yol almaktadır. Bu iki hareketli için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

K Treni (Doğrusal Ray)
Her 1 sn'de 20 m yol alır; yönü sabittir.

L Aracı (Çembersel Pist)
Her 1 sn'de 20 m yol alır; yönü sürekli değişir.

(A) K treni hem sabit süratli hem sabit hızlıdır; L aracının ise sürati sabit fakat yönü değiştiği için hızı değişkendir.

(B) Her iki aracın da hareket yönü korunduğu için hem süratleri hem de hızları sabittir.

(C) L aracı çembersel pistte döndüğü için sabit hızlı, K treni ise değişken süratlidir.

(D) K treninin sürati zamanla artarken L aracının sürati zamanla sıfıra düşmektedir.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki hareket ölçüm kartlarındaki verilere göre doğrusal bir yolda ilerleyen bisikletlinin sabit sürati kaç $\frac{m}{sn}$'dir ve 10 saniye sonunda alacağı toplam yol kaç metredir?

Bisikletlinin Yol – Zaman Ölçümleri
1. saniye: 12 m · 2. saniye: 24 m · 3. saniye: 36 m

Hesaplanacak Değerler
Sabit sürat = ? $\frac{m}{sn}$ · 10. saniye sonunda toplam yol = ? m

(A) Sürati 8 $\frac{m}{sn}$ — Toplam yol 80 m

(B) Sürati 12 $\frac{m}{sn}$ — Toplam yol 120 m

(C) Sürati 24 $\frac{m}{sn}$ — Toplam yol 240 m

(D) Sürati 36 $\frac{m}{sn}$ — Toplam yol 360 m

7 KISA CEVAP · DÜŞÜN

K olayı tek atadan döllenmesiz çoğalmayı, L olayı ise sperm ve yumurtanın birleşmesiyle çoğalmayı göstermektedir. K ve L olaylarını kalıtsal çeşitlilik açısından karşılaştırınız.

K olayı (eşeysiz) atayla aynı yavrular oluşturur; L olayı (eşeyli) kalıtsal çeşitlilik sağlar.

8 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki sabit süratli K, L, M ve N araçlarının hareket verilerini kullanarak tablodaki boş bırakılan hücreleri tamamlayınız. İlk satır örnektir.

1. K Aracı
Yol: 60 m · Zaman: 4 sn

2. L Aracı
Yol: 180 km · Zaman: 2 sa

3. M Aracı
Zaman: 5 sn · Sürat: $20\ \frac{\text{m}}{\text{sn}}$

4. N Aracı
Yol: 240 km · Sürat: $80\ \frac{\text{km}}{\text{sa}}$

Araç	Alınan Yol	Geçen Zaman	Sürat
1. K Aracı	60 m	4 sn	$15\ \frac{\text{m}}{\text{sn}}$
2. L Aracı	180 km	2 sa	$90\ \frac{\text{km}}{\text{sa}}$
3. M Aracı	100 m	5 sn	$20\ \frac{\text{m}}{\text{sn}}$
4. N Aracı	240 km	3 sa	$80\ \frac{\text{km}}{\text{sa}}$

9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki bahçıvan, bahçesindeki çok verimli çilek bitkisinden kalıtsal özellikleri birebir aynı olan yeni çilek fideleri elde etmek istemektedir. Bahçıvan hangi yöntemi seçerse amacına ulaşır?

Ata Bitki · Verimli Çilek
Özelliği: İri ve tatlı meyve veren çilek bitkisi

Bahçıvanın Üretim Hedefi
Kalıtsal yapısı ata bitkiyle birebir aynı fideler üretmek

A) Farklı iki çilek bitkisini tozlaştırarak yeni tohumlar üretmek

B) Çiçeklerde döllenme gerçekleştikten sonra oluşan meyve çekirdeklerini ekmek

C) Böceklerle taşınan polenlerin başka çilek çiçeklerini döllemesini beklemek

D) Çileğin sürünücü gövdesinden (vejetatif yolla) yeni fideler çoğaltmak

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görseldeki hareket ölçüm kartlarındaki verilere göre sabit süratle ilerleyen K ve L araçlarından hangisinin 6 saniye sonunda kaç metre daha fazla yol aldığını hesaplayarak açıklayınız.

K Aracı Hareket Ölçüm Kartı
Sabit sürati: $20\ \frac{\text{m}}{\text{sn}}$ ·
Hareket süresi: 6 sn

L Aracı Hareket Ölçüm Kartı
Sabit sürati: $12\ \frac{\text{m}}{\text{sn}}$ ·
Hareket süresi: 6 sn

K aracı 20×6=120 m, L aracı 12×6=72 m alır; K aracı 120−72=48 m fazla yol almıştır.

11 SIRALAMA

Eşeyli üreyen bir canlıda yeni bireyin meydana gelme sürecindeki yapıları ve olayları gerçekleşme sırasına göre 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

3 Döllenmiş yumurta hücresi olan zigotun oluşması

1 Dişi üreme hücresi (yumurta) ve erkek üreme hücresinin (sperm) üretilmesi

2 Yumurta ve sperm çekirdeklerinin birleşerek döllenme olayını gerçekleştirmesi

4 Zigotun gelişerek önce embriyoyu, ardından yeni yavru bireyi meydana getirmesi

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört posterde gösterilen olaylardan hangisi canlı sayısını artıran bir eşeysiz üreme örneği **değildir?**

1. Poster · Amip
1 hücre → 2 yeni amip

2. Poster · Hidra
Tomurcuk → yeni hidra

3. Poster · Kertenkele
Kopan kuyruğun onarımı

4. Poster · Denizyıldızı
Kopan koldan yeni birey

A) 1. Poster: Amipin ortadan ikiye bölünerek iki yeni amip oluşturması

B) 2. Poster: Hidranın gövdesindeki tomurcuktan yeni bir hidra gelişmesi

C) 3. Poster: Kertenkelenin kopan kuyruğunun yerine yeni kuyruk çıkması

D) 4. Poster: Denizyıldızının kopan kolundan yeni bir denizyıldızı oluşması

13 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları kutulara yazınız. Numaralı harflerle birim zamanda alınan yolun adını bulunuz.

Erkek üreme hücresine verilen ad	S P E R M
Canlıların nesillerini devam ettirmek için yeni bireyler oluşturması	Ü R E M E
Tomurcuklanarak eşeysiz çoğalan omurgasız tatlı su canlısı	H İ D R A
Belirli bir büyüklüğe ulaştığında bölünerek çoğalan tek hücreli canlı	A M İ P
Yumurta ile spermin döllenmesi sonucunda oluşan ilk hücre	Z İ G O T

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
SÜRAT

14 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki eşeysiz üreme sınıflandırma tablosunda numaralanmış örneklerden hangisi **yanlış** sütuna yazılmıştır?

1. Bölünerek
Bakteri

2. Tomurcuklanarak
Bira mayası

3. Rejenerasyon
Menekşe yaprağı

4. Vejetatif
Patates yumrusu

A) 1. Sütun (Bölünerek): Bakteri

B) 2. Sütun (Tomurcuklanarak): Bira mayası

C) 3. Sütun (Rejenerasyonla): Menekşe yaprağı

D) 4. Sütun (Vejetatif): Patates yumrusu

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.