Uzayda Neler Var?

FB.7.1.4. Yıldızların yaşamını açıklayarak yapılandırabilme · Konu kapsamındaki temel kavramları, modelleri ve ilişkileri örnekler üzerinden çözümler.

HATIRLAYALIM

- Yıldızlar hidrojen gazı ve tozdan oluşan bulutsularda (nebula) doğar; kütle çekimiyle çöken bulut önce donuk kırmızı ön yıldızı, çekirdek tepkimeleri başlayınca da yıldızı oluşturur.
- Atbaşı ve Orion bulutsuları Avcı Takımyıldızı'ndadır (Orion çıplak gözle görülür); Tarantula Bulutsusu güney yarım küreden görülür ve en büyük kütleli, en sıcak yıldızları barındırır.
- Kütle arttıkça yıldızın ömrü kısalır: 8 Güneş kütlesinden küçük yıldızlar kırmızı dev → gezegenimsi bulutsu → beyaz cüce (demir-karbon yığını) yolunu izler.

1 EŞLEŞTİRME

İfadeleri yıldızların yaşamı konusuyla ilgili uygun kavramlarla eşleştiriniz.

c 1. nebula	a) Çöken bulutun ısınmasıyla beliren ancak çekirdek tepkimesi başlamamış yapı
a 2. ön yıldız	b) Büyük kütleli yıldızların kırmızı süperdev evresinden sonraki şiddetli patlaması
b 3. süpernova	c) Hidrojen gazı ve tozdan oluşan yıldız doğum bulutsusunun diğer adı

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Yıldızların oluşumu, yaşam yolu ve yaş tahminiyle ilgili ifadelerden doğru olanların D, yanlış olanların Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Bulutsudaki gaz ve toz yığını kendi kütle çekiminin etkisiyle çökerek ısınmaya başlar.	☑	☐
Donuk kırmızı görünümlü ön yıldız, merkezinde çekirdek tepkimeleri başlamadan önce de tam bir yıldız sayılır.	☐	☑
Güneş'in kütlesi sekiz Güneş kütlesinden küçük olduğu için Güneş küçük kütleli yıldızlar grubundadır.	☑	☐
Parlaklık ve sıcaklık grafiğinin alt bölgesinde yer alan yıldızlar genç yıldızlardır.	☐	☑

3 KISA CEVAP

Bulutsuda sıkışarak oluşan donuk kırmızı görünümdeki ön yıldızın tam bir yıldıza dönüşmesini sağlayan temel olayı ve görünüm değişimini kısaca yazınız.

Donuk kırmızı ön yıldızda çekirdek tepkimeleri başlayınca parlak yıldız oluşur.

4 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Bir yıldızın parlaklığının zamanla düzenli olarak artıp azalmasının nedenini ve gök bilimcilerin bu parlaklık değişiminden yıldız hakkında neleri tahmin ettiğini yazınız.

Nedeni iç titreşimlerdir; bu değişimden yıldızın iç yapısı ve yaşı tahmin edilir.

5 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki şemada bulutsuda doğan iki farklı yıldız grubunun yaşam yolları modellenmiştir. Şemada K, L ve M kutularına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Küçük Kütleli Yıldız (< 8 Güneş Kütlesi)
1. Kırmızı dev evresi → 2. K = ?
3. Son basamak: L = ? (Demir ve karbondan oluşan yığın)

Büyük Kütleli Yıldız (> 8 Güneş Kütlesi)
1. Kırmızı süperdev evresi → 2. Büyük patlama: M = ?
3. Son basamak: Nötron yıldızı ya da kara delik

(A) K: Kırmızı süperdev — L: Kara delik — M: Gezegenimsi bulutsu
(B) K: Gezegenimsi bulutsu — L: Beyaz cüce — M: Süpernova patlaması
(C) K: Nötron yıldızı — L: Kırmızı dev — M: Ön yıldız
(D) K: Beyaz cüce — L: Süpernova patlaması — M: Kırmızı dev

6 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

hidrojen · sekiz · helyum · Atbaşı

1. Bulutsuların yapısında en çok ___hidrojen___ gazı ve uzay tozu bulunur.
2. Şekli denizatının başına benzetilen bulutsuya ___Atbaşı___ Bulutsusu denir.
3. Başlangıç kütlesi yaklaşık ___sekiz___ Güneş kütlesini aşanlar büyük kütlelidir.

7 TABLOYU TAMAMLA

Tabloda başlangıç kütleleri verilen dört yıldızın kütle grubunu (8 Güneş kütlesi sınırına göre) ve yaşamının son basamağında geriye bırakacağı yapıyı yazarak tabloyu tamamlayınız. İlk satır örnektir.

Yıldız ve Başlangıç Kütlesi	Kütle Grubu	Son Basamakta Kalan Yapı
Güneş (1 Güneş kütlesi)	Küçük kütleli yıldız	Beyaz cüce
R Yıldızı (4 Güneş kütlesi)	Küçük kütleli yıldız	Beyaz cüce
S Yıldızı (15 Güneş kütlesi)	Büyük kütleli yıldız	Nötron yıldızı veya kara delik
T Yıldızı (25 Güneş kütlesi)	Büyük kütleli yıldız	Nötron yıldızı veya kara delik

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki panoda üç tanınmış bulutsunun özellikleri ve gökyüzündeki konumları verilmiştir. Buna göre numaralı kartların hangisinde bilgi yanlışı **yapılmıştır?**

1. Kart: Atbaşı Bulutsusu
Avcı Takımyıldızı'ndadır; şekli denizatının başına benzer.

2. Kart: Orion Bulutsusu
Avcı Takımyıldızı'ndadır; gözlem aracı olmadan rahatça görülür.

3. Kart: Tarantula Bulutsusu
Yalnızca en soğuk ve en küçük kütleli yıldızları barındırır.

4. Kart: Ortak Özellikleri
Hidrojen gazı ve tozdan oluşur; yıldızların doğum bölgeleridir.

(A) 1. kartta Atbaşı'nın Avcı Takımyıldızı'nda olduğu doğrudur.
(B) 2. kartta Orion'un çıplak gözle görülebildiği doğrudur.
(C) 3. kartta Tarantula'nın yalnız soğuk yıldız içerdiği hatalıdır.
(D) 4. kartta üçünün de yıldız doğum bölgesi olduğu doğrudur.

9 SIRALAMA

Güneş benzeri (küçük kütleli) bir yıldızın bulutsudan son kalıntısına kadar geçirdiği evreleri baştan sona doğru 1'den 5'e kadar sıralayınız.

5 Merkezde demir ve karbondan oluşan yoğun beyaz cüce yığınının kalması
4 Dış katmanların uzaya yayılmasıyla gezegenimsi bulutsu evresinin yaşanması
3 Yıldızın ilerleyen dönemde genişleyerek kırmızı dev hâline gelmesi
2 Ön yıldızın merkezinde çekirdek tepkimelerinin başlamasıyla yıldızın doğması
1 Bulutsudaki gaz ve toz bulutunun kütle çekimiyle çöküp ısınması

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Küçük kütleli yıldızın geçtiği "gezegenimsi bulutsu" ile yıldızların doğduğu "bulutsu (nebula)" kavramlarının görev farkını açıklayınız.

Bulutsu yıldızların doğum yeridir; gezegenimsi bulutsu kırmızı dev sonrası evredir.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir gök bilimci yaptığı gözlemde, incelenen gök cisminin donuk kırmızı renkte göründüğünü, kütle çekimiyle çökmekte olan sıcak bir gaz-toz topu olduğunu ancak merkezinde henüz çekirdek tepkimelerinin başlamadığını rapor etmiştir. Bu gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?

(A) Kırmızı süperdev
(B) Beyaz cüce
(C) Ön yıldız
(D) Nötron yıldızı

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki sütun grafiğinde aynı anda doğan X, Y ve Z yıldızlarının başlangıç kütleleri Güneş kütlesi cinsinden verilmiştir. Grafiğe göre bu yıldızlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine **ulaşılamaz?**

X Yıldızı Başlangıç Kütlesi
3 Güneş kütlesi

Y Yıldızı Başlangıç Kütlesi
20 Güneş kütlesi

Z Yıldızı Başlangıç Kütlesi
10 Güneş kütlesi

Kütle – Yaşam Süresi Kuralı
Sınır: 8 Güneş kütlesi (Kütle arttıkça ömür kısalır)

(A) Kütlesi en büyük olduğu için ömrü en kısa olan yıldız Y'dir.
(B) X yıldızı 8 Güneş kütlesinin altında olduğundan son kalıntısı beyaz cücedir.
(C) Y ve Z yıldızları yaşamlarını süpernova patlamasıyla tamamlar.
(D) Z'nin kütlesi X'ten büyük olduğu için Z yıldızı X'ten daha uzun yaşar.

13 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde M ve N yıldızlarının parlaklık-sıcaklık grafiğindeki konumları ile kendi eksenleri etrafındaki dönme hızları verilmiştir. Gözlem verilerine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Parlaklık ve Sıcaklık Grafiği
M Yıldızı (Üst bölge)
N Yıldızı (Alt bölge)
Sıcaklık ve Parlaklık Bölgeleri

2. Dönme Hızı Gözlem Tablosu
M Yıldızı: Ekseninde hızlı döner
N Yıldızı: Ekseninde yavaş döner

(A) M yıldızı üst bölgede olduğu ve hızlı döndüğü için N'den daha gençtir.
(B) N yıldızı yavaş döndüğü ve alt bölgede olduğu için yeni doğmuş ön yıldızdır.
(C) Grafiğin üst bölgesindeki yıldızlar ekseni etrafında en yavaş dönenlerdir.
(D) Dönme hızı ve grafikteki konum yıldızın yaşı hakkında bilgi vermez.

14 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları yazınız. Numaralı harflerle yıldız doğum bulutsularının diğer adını bulunuz.

Süpernova sonrası kalabilen yoğun yıldız türü: ... yıldızı — N Ö T R O N
Küçük kütleli yıldızdan kalan demir ve karbon yığını: ... cüce — B E Y A Z
Hidrojen gazı ve tozdan oluşan, yıldızların doğduğu uzay bulutu — B U L U T S U
Güney yarım küreden görülen, en büyük kütleli yıldızları içeren bulutsu — T A R A N T U L A
Genç yıldızların kendi eksenindeki dönme hızını anlatan kavram — H I Z L I
Şekli denizatının başına benzeyen Avcı Takımyıldızı'ndaki bulutsu — A T B A Ş I

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
NEBULA

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.