

## Make-Up Exam of Linear Algebra

1. Given

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix},$$

find the matrices for

(a) projection to the column space of  $A$ .

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix}.$$

(b) projection to the left nullspace of  $A$ .  $(I - P)$ .

2. Find the 4 fundamental subspaces of matrix  $B$ ,

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\text{row space} = \{y \mid y = c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3 + c_4 e_4\}$$

$$\text{nullspace} = \{y \mid y = c(1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1)\}$$

$$\text{column space} = \{x \mid x_1 + x_2 + x_6 = 0, x_3 - x_5 - x_6 = 0\}$$

$$\text{left nullspace} = \{x \mid x = c_1(1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1) + c_2(0 \ 0 \ 1 \ 0 \ -1 \ -1)\}$$

3. (20%) Suppose a linear transformation  $T$  transforms  $a$  to  $c$  and  $b$  to  $d$ , where

$$a = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}, c = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}, d = \begin{bmatrix} -5 \\ 10 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Find the matrix  $M$  such that

$$T(x) = Mx \text{ for any } x \in \mathbb{R}^2.$$

$$M = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Find the best approximation (closest in the function space) to the function  $x^4 + 2x^3$  by a linear combination of 1,  $x$  and  $x^2$  in the interval  $[0, 1]$ .

$$A^T A x = A^T b \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} \frac{7}{10} \\ \frac{17}{30} \\ \frac{10}{21} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x = \begin{bmatrix} 9 & -36 & 30 \\ -36 & 192 & -180 \\ 30 & -180 & 180 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{7}{10} \\ \frac{17}{30} \\ \frac{10}{21} \end{bmatrix} \doteq \begin{bmatrix} 0.19 \\ -2.11 \\ 4.71 \end{bmatrix}.$$

5. Find the  $QR$  factorization of the following matrix,

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{5} & \frac{-4}{5} & 0 \\ 0 & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & \frac{26}{5} & \frac{13}{5} \\ 0 & 0 & \frac{7}{5} & \frac{-9}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} = QR$$