

# Mackey 関手まとめ

オ

2023 年 7 月 27 日

## 概要

Mackey 関手のまとめです.

## 1 Mackey 関手

$G$  は有限群,  $R$  は単位元を持つ可換とは限らない環とする. また,  $R\text{-Mod}$  で  $R$  加群全体の成す圏,  $G\text{-set}$  で有限  $G$  集合全体の成す圏を表す.

### 1.1 Green による定義

**定義 1.1** 以下の条件を満たす対応の組  $(M, t, r, c)$  を  $G$  の  $R\text{-Mod}$  に値を持つ Mackey 関手と呼ぶ.

1. 任意の部分群  $H \leq G$  に対して,  $M(H)$  は  $R$  加群である.
2. 任意の部分群  $H \leq K \leq G$  と  $g \in G$  に対して,

$$\begin{aligned} r_H^K: M(K) &\rightarrow M(H), \\ t_H^K: M(H) &\rightarrow M(K), \\ c_{g,H}: M(H) &\rightarrow M({}^gH) \end{aligned}$$

は  $R$  加群の準同型写像である.

3. 任意の  $H \leq K \leq L \leq G$  と  $x, y \in G$  に対して, 図式

$$\begin{array}{ccccc} & & M(L) & & \\ & \swarrow r_H^L & \downarrow r_K^L & \searrow t_H^L & \\ M(H) & \xleftarrow{r_H^K} & M(K) & \xrightarrow{t_H^K} & M(K) & \xrightarrow{c_{y,H}} & M({}^{yx}H) \\ & & & & \uparrow t_K^L & \uparrow c_{y, {}^xH} \\ & & & & M(L) & \end{array}$$
$$\begin{array}{ccc} M(K) & \xrightarrow{c_{x,K}} & M({}^xK) \\ r_H^K \downarrow & & \downarrow r_{{}^xH}^{{}^xK} \\ M(H) & \xrightarrow{c_{x,H}} & M({}^xH) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} M(K) & \xrightarrow{c_{x,K}} & M({}^xK) \\ t_H^K \uparrow & & \uparrow t_{{}^xH}^{{}^xK} \\ M(H) & \xrightarrow{c_{x,H}} & M({}^xH) \end{array}$$

は可換である.

4. 任意の  $g \in H \leq G$  に対して,  $r_H^H = t_H^H = c_{g,H} = \text{id}_{M(H)}$  である.
5. (Mackey の公理) 任意の  $K \leq H \geq L$  に対して,

$$r_L^H \circ t_K^H = \sum_{LxK \in L \backslash H / K} t_{L \cap xK}^L \circ c_{x, L^x \cap K} \circ r_{L^x \cap K}^K. \quad \square$$

## 1.2 Dress による定義

**定義 1.2** 以下の条件を満たす関手の組  $M = (M^*, M_*)$  を,  $G$  の  $R\text{-Mod}$  に値を持つ **Mackey 関手** と呼ぶ.

1.  $M^*: G\text{-set} \rightarrow R\text{-Mod}$  は反変関手,  $M_*: G\text{-set} \rightarrow R\text{-Mod}$  は共変関手である.
2. 任意の  $X \in G\text{-set}$  に対して,  $M^*(X) = M_*(X) = M(X)$ .
3. 任意の  $X, Y \in G\text{-set}$  とその直和  $X \xrightarrow{i_X} X \sqcup Y \xleftarrow{i_Y} Y$  に対して,

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} M^* i_X \\ M^* i_Y \end{bmatrix} &= M^* i_X \times M^* i_Y: M(X \sqcup Y) \rightarrow M(X) \oplus M(Y), \\ \begin{bmatrix} M_* i_X & M_* i_Y \end{bmatrix} &= M_* i_X \sqcup M_* i_Y: M(X) \oplus M(Y) \rightarrow M(X \sqcup Y) \end{aligned}$$

が同型  $M(X) \oplus M(Y) \cong M(X \sqcup Y)$  を与える.

4. 任意の  $G\text{-set}$  の引き戻し

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\pi_f} & X \\ \pi_g \downarrow & \text{PB} & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{g} & Z \end{array}$$

に対して,

$$\begin{array}{ccc} M(P) & \xleftarrow{M^* \pi_f} & M(X) \\ M_* \pi_g \downarrow & & \downarrow M_* f \\ M(Y) & \xleftarrow{M_* g} & M(Z) \end{array}$$

は可換である.  $\square$

**命題 1.1** 定義 1.1 の意味での Mackey 関手と, 定義 1.2 の意味での Mackey 関手は, 1 対 1 に対応する.  $\square$

**証明**  $M$  が定義 1.1 の意味での Mackey 関手だとする. 任意の  $X \in G\text{-set}$  に対して

$$\widetilde{M}_*(X) = \widetilde{M}^*(X) = \widetilde{M}(X) = \bigoplus_{Gx \in G \backslash X} M(G_x)$$

と定める. また, 部分群  $H, K \leq G$  と  $a \in G$  が  $H \leq {}^a K$  を満たすならば, 任意の  $k \in K$  に対して

$$c_{(ak)^{-1}, {}^a k K} \circ t_H^{a k K} = c_{k^{-1}, K} \circ c_{a^{-1}, {}^a K} \circ t_H^{a K} = c_{a^{-1}, {}^a H} \circ t_H^{a K}$$

が成り立つ．よって，任意の  $f \in \text{Hom}_{G\text{-set}}(G/H, G/K)$  に対して，

$$\widetilde{M}_*(f) = c_{a^{-1}, aK} \circ t_H^{aK} \quad (f(H) = aK)$$

と定められる．このとき，任意の  $G/H \xrightarrow{f} G/K \xrightarrow{g} G/L$  に対して， $f(H) = aK$ ,  $g(K) = bL$  とすると，図式

$$\begin{array}{ccccc} & & & & \widetilde{M}(G/L) \\ & & & \nearrow^{c_{(ab)^{-1}, abL}} & \uparrow^{c_{b^{-1}, bL}} \\ & & M(^{ab}L) & \xrightarrow{c_{a^{-1}, abL}} & M(^bL) \\ & \nearrow^{t_H^{abL}} & \uparrow^{t_{aK}^{abL}} & & \uparrow^{t_K^bL} \\ \widetilde{M}(G/H) & \xrightarrow{t_H^{aK}} & M(^aK) & \xrightarrow{c_{a^{-1}, aK}} & \widetilde{M}(G/K) \end{array}$$

が可換になる．よって， $\widetilde{M}_*(gf) = \widetilde{M}_*(g)\widetilde{M}_*(f)$  が成り立つ．また，

$$\widetilde{M}_*(\text{id}_{G/H}) = c_{e_G, H} t_H^H = \text{id}_{M(H)} = \text{id}_{\widetilde{M}(H)}$$

が成り立つ．したがって，任意の  $f \in \text{Hom}_{G\text{-set}}(X, Y)$  に対して

$$\widetilde{M}_*(f) = \left[ i_{M(G_{f(x)})} \widetilde{M}_*(f|_{Gx}) \right]_{Gx \in G \setminus X} = \bigsqcup_{Gx \in G \setminus X} i_{M(G_{f(x)})} \widetilde{M}_*(f|_{Gx})$$

と定めると， $\widetilde{M}_*: G\text{-set} \rightarrow R\text{-Mod}$  は関手になる．ただし， $i_{M(G_{f(x)})}$  は自然な入射  $M(G_{f(x)}) \hookrightarrow \widetilde{M}(Y)$  であり， $f|_{Gx}: Gx \rightarrow Gf(x)$  は同型により  $G/G_x$  から  $G/G_{f(x)}$  への  $G$  写像と見なす．さらに，写像  $\pi: G \setminus X \rightarrow G \setminus Y$  を  $\pi(Gx) = Gf(x)$  と定め，任意の  $f \in \text{Hom}_{G\text{-set}}(X, Y)$  に対して

$$\begin{aligned} \widetilde{M}^*(f) &= \left[ \sum_{Gx \in \pi^{-1}(Gy)} i_{M(G_x)} \widetilde{M}^*(f|_{Gx}) \right]_{Gy \in G \setminus Y} = \bigsqcup_{Gy \in G \setminus Y} \left( \sum_{Gx \in \pi^{-1}(Gy)} i_{M(G_x)} \widetilde{M}^*(f|_{Gx}) \right), \\ \widetilde{M}^*(f|_{Gx}) &= r_{G_x}^{aG_{f(x)}} c_{a, G_{f(x)}} \quad (f(G_x) = aG_{f(x)}) \end{aligned}$$

とおけば，同様にして  $\widetilde{M}^*: G\text{-set} \rightarrow R\text{-Mod}$  が反変関手となることが分かる．

直和  $G/H \xrightarrow{i_{G/H}} G/H \sqcup G/K \xleftarrow{i_{G/K}} G/K$  に対して，

$$\begin{aligned} \widetilde{M}^* i_{G/H} &= \text{id}_{M(H)} \sqcup 0, & \widetilde{M}^* i_{G/K} &= 0 \sqcup \text{id}_{M(K)} \\ \widetilde{M}_* i_{G/H} &= i_{M(H)}, & \widetilde{M}_* i_{G/K} &= i_{M(K)} \end{aligned}$$

となるから

$$\begin{bmatrix} \widetilde{M}^* i_{G/H} \\ \widetilde{M}^* i_{G/K} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \widetilde{M}_* i_{G/H} & \widetilde{M}_* i_{G/K} \end{bmatrix} = \text{id}_{M(H) \oplus M(K)}.$$

したがって、これらが同型  $\widetilde{M}(G/H \sqcup G/K) = M(H) \oplus M(K)$  を与える. さらに,  
 $G/H \xrightarrow{f} G/L \xleftarrow{g} G/K$  の引き戻し

$$\begin{array}{ccc} \bigsqcup_{HxK \in H \backslash aLb^{-1}/K} G/H \cap {}^x K & \xrightarrow{\pi_g} & G/K \\ \pi_f \downarrow & & \downarrow g \\ G/H & \xrightarrow{f} & G/L \end{array} \quad (1.1)$$

に対して, 図式

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{HxK \in H \backslash aLb^{-1}/K} M(H \cap {}^x K) & \xleftarrow{\widetilde{M}^* \pi_g} & G/K \\ \widetilde{M}_* \pi_f \downarrow & & \downarrow \widetilde{M}_* g \\ G/H & \xleftarrow{\widetilde{M}^* f} & G/L \end{array} \quad (1.2)$$

の可換性を示す.

$$\begin{aligned} \widetilde{M}_* \pi_f \circ \widetilde{M}^* \pi_g &= \left( \bigsqcup_{HxK} t_{H \cap {}^x K}^H \right) \circ \left( \sum_{HxK} i_{M(G_{(H,xK)})} r_{H \cap {}^x K}^K c_{x,K} \right) \\ &= \sum_{HxK} \left( \bigsqcup_{HyK} t_{H \cap {}^x K}^H \right) i_{M(G_{(H,xK)})} c_{x,H^x \cap K} r_{H^x \cap K}^K \\ &= \sum_{HxK} t_{H \cap {}^x K}^H c_{x,H^x \cap K} r_{H^x \cap K}^K \\ &= \sum_{H^{ab^{-1}}xK \in H^{ab^{-1}} \backslash {}^b L/K} t_{H \cap {}^{ab^{-1}}xK}^H c_{ab^{-1}x, H^{ab^{-1}}x \cap K} r_{H^{ab^{-1}}x \cap K}^K \\ &= \sum_{H^{ab^{-1}}xK \in H^{ab^{-1}} \backslash {}^b L/K} t_{H \cap {}^{ab^{-1}}xK}^H c_{ab^{-1}, H^{ab^{-1}} \cap {}^x K} c_{x, H^{ab^{-1}}x \cap K} r_{H^{ab^{-1}}x \cap K}^K \\ &= \sum_{H^{ab^{-1}}xK \in H^{ab^{-1}} \backslash {}^b L/K} c_{ab^{-1}, H^{ab^{-1}} \cap {}^x K} t_{H^{ab^{-1}} \cap {}^x K}^{H^{ab^{-1}}} c_{x, H^{ab^{-1}}x \cap K} r_{H^{ab^{-1}}x \cap K}^K \\ &= c_{ab^{-1}, H^{ab^{-1}}} r_{H^{ab^{-1}}}^{{}^b L} t_K^{{}^b L} \\ &= r_H^{{}^a L} c_{ab^{-1}, {}^b L} t_K^{{}^b L} \\ &= (r_H^{{}^a L} c_{a,L}) \circ (c_{b^{-1}, {}^b L} t_K^{{}^b L}) \\ &= \widetilde{M}^* f \circ \widetilde{M}_* g \end{aligned}$$

より, (1.2) は可換である. したがって,  $\widetilde{M} = (\widetilde{M}^*, \widetilde{M}_*)$  は  $G$  の定義 1.2 の意味での Mackey 関手となる.

逆に,  $M = (M^*, M_*)$  を定義 1.2 の意味での  $G$  の Mackey 関手とする. 任意の  $H \leq K \leq G$  と  $x \in G$  に対して,

$$M_1(H) = M(G/H), \quad r_H^K = M^* p_H^K, \quad t_H^K = M_* p_H^K, \quad c_{x,H} = M^* \gamma_{x^{-1}, {}^x H}$$

とおく．ここで， $p_H^K: G/H \rightarrow G/K$  は自然な射影， $\gamma_{x,H}$  は  $\gamma_{x,H}(H) = x^{-1}xH$  で定まる  $G$  写像である．この  $M_1$  が定義 1.1 の意味での Mackey 関手になることを確認するには，Mackey の公理を満たすことを確認すればよい．

引き戻し図式 (1.1) において， $H \leq L \leq K$  だとし， $f = p_H^L$ ， $g = p_K^L$  とする．このとき， $\pi_f = \bigsqcup_{HxK \in H \backslash L/K} p_{H \cap^x K}^H$ ， $\pi_g = \bigsqcup_{HxK \in H \backslash L/K} p_{H^x \cap K}^K \gamma_{x^{-1}, H \cap^x K}$  である．また，

$$\begin{aligned} \widetilde{M}_* \pi_f \circ \widetilde{M}^* \pi_g &= \left( \bigsqcup_{HxK} t_{H \cap^x K}^H \right) \left( \sum_{HxK} c_{x, H^x \cap K} r_{H^x \cap K}^K \right) = \sum_{HxK} t_{H \cap^x K}^H c_{x, H^x \cap K} r_{H^x \cap K}^K, \\ \widetilde{M}^* f \circ \widetilde{M}_* g &= r_H^L t_K^L \end{aligned}$$

である．よって，図式 (1.2) の可換性から Mackey の公理を得る．したがって，組  $(M_1, t, r, c)$  は定義 1.1 の意味での Mackey 関手となる． ■

### 1.3 Mackey 代数による定義

Mackey 関手は Mackey 代数上の加群と見なすこともできる．

**定義 1.3**  $G$  の部分群全体を頂点集合とし，辺集合が

$$\begin{aligned} &\{t_H^K \mid H, K \leq G, \text{out}(t_H^K) = H, \text{in}(t_H^K) = K\}, \\ &\{r_H^K \mid H, K \leq G, \text{out}(r_H^K) = K, \text{in}(r_H^K) = H\}, \\ &\{c_{x,H} \mid H \leq G, x \in G, \text{out}(c_{x,H}) = H, \text{in}(c_{x,H}) = {}^x H\} \end{aligned}$$

の和集合から成る簾の  $\mathbb{Z}$  上の道代数を  $Q$  とおく．また， $Q$  の部分代数  $\Lambda$  を

$$\begin{aligned} \Lambda = \left\langle &r_H^K r_K^L - r_K^L, t_K^L t_H^K - t_H^L, c_{y, {}^x H} c_{x, H} - c_{yx, H}, \right. \\ &c_{x, H} r_H^K - r_{{}^x H}^K c_{x, K}, c_{x, K} t_H^K = t_{{}^x H}^K c_{x, H}, \\ &r_H^H - c_{h, H}, t_H^H - c_{h, H}, \\ &r_L^H t_K^H - \sum_{LxK \in L \backslash H/K} t_{L \cap^x K}^L c_{x, L^x \cap K} r_{L^x \cap K}^K, \\ &\left. \sum_{J \leq G} r_J^J - 1, \sum_{J \leq G} t_J^J - 1 \mid H, K \leq L \leq G, x \in G, h \in H \right\rangle_{\mathbb{Z}} \end{aligned}$$

で定める．

このとき， $R$  代数  $\mu_R(G) = R \otimes_{\mathbb{Z}} (Q/\Lambda)$  を  $G$  の  $R$  上の **Mackey 代数** という． □

$G$  の  $\mathbb{Z}$  上の Mackey 代数を  $\mu(G)$  と表す．

### 1.4 Mackey 関手の圏

以下，特に断らない限り，Mackey 関手は  $R\text{-Mod}$  に値を持つものとする．

**定義 1.4**  $M, N$  を  $G$  の Mackey 関手とする.  $R$  準同型写像の族  $\theta = \{\theta_X \in R\text{-Mod}(MX, NX)\}_{X \in \text{set}^G}$  が, 任意の  $f \in \text{set}^G(X, Y)$  に対して, 図式

$$\begin{array}{ccc} M(X) & \xrightarrow{\theta_X} & N(X) \\ M_*(f) \downarrow & & \downarrow N_*(f) \\ M(Y) & \xrightarrow{\theta_Y} & N(Y) \end{array}, \quad \begin{array}{ccc} M(X) & \xrightarrow{\theta_X} & N(X) \\ M^*(f) \uparrow & & \uparrow N^*(f) \\ M(Y) & \xrightarrow{\theta_Y} & N(Y) \end{array}$$

を可換にするとき,  $\theta$  を  $M$  から  $N$  への **Mackey 関手の射** という. □

**定義 1.5** 対象が  $G$  の Mackey 関手全体, 射が Mackey 関手の射, 合成が自然変換の垂直合成であるような圏を  $\text{Mack}(G)$  で表す. □

## 2 Mackey 関手の構成

**補題 2.1**  $M$  を  $G$  の  $R\text{-Mod}$  に値を持つ Mackey 関手とする. 任意の  $G$  集合  $Y$  に対して, 関手の組  $M_Y = (M_Y^*, M_{Y*})$  を

$$\begin{aligned} M_Y^*(X) &= M_{Y*}(X) = M_Y(X) = M(X \times Y), \\ M_Y^*(f) &= M^*(f \times \text{id}_Y), \quad M_{Y*}(f) = M_*(f \times \text{id}_Y) \end{aligned}$$

で定める. このとき,  $M_Y$  は  $G$  の  $R\text{-Mod}$  に値を持つ Mackey 関手となる. □

**補題 2.2**  $M$  を  $G$  の Mackey 関手,  $g \in \text{set}^G(Y, Y')$  を  $G$  写像とする.  $M_Y$  から  $M_{Y'}$  への  $R$  準同型写像の族  $M^g, M_g$  をそれぞれ

$$M^g_X = M^*(\text{id}_X \times g), \quad (M_g)_X = M_*(\text{id}_X \times g)$$

で定めると,  $M^g, M_g$  は  $M_Y$  から  $M_{Y'}$  への Mackey 関手の射となる. □

**証明**  $M_g$  についてのみ示す. 任意の  $f \in \text{set}^G(X, Y)$  に対して, 図式

$$\begin{array}{ccc} M_Y(X) & \xrightarrow{(M_g)_X} & M_{Y'}(X) \\ (M_Y)_*(f) \downarrow & & \downarrow (M_{Y'})_*(f) = M_*(f \times \text{id}_Y) \\ M_Y(X') & \xrightarrow{(M_g)_{X'}} & M_{Y'}(X') \end{array} \quad \begin{array}{ccc} M(X \times Y) & \xrightarrow{M_*(\text{id}_X \times g)} & M(X \times Y') \\ \downarrow M_*(f \times \text{id}_Y) & & \downarrow M_*(f \times \text{id}_{Y'}) \\ M(X' \times Y) & \xrightarrow{M_*(\text{id}_X \times g)} & M(X' \times Y') \end{array}$$

は,  $G\text{-set}$  の可換図式

$$\begin{array}{ccc} X \times Y & \xrightarrow{\text{id}_X \times g} & X \times Y' \\ f \times \text{id}_Y \downarrow & & \downarrow f \times \text{id}_{Y'} \\ X' \times Y & \xrightarrow{\text{id}_{X'} \times g} & X' \times Y' \end{array} \quad (2.1)$$

の  $M_*$  による像なので, 可換である. さらに, 図式 (2.1) は  $G\text{-set}$  における  $\text{id}_{X'} \times g$  と  $f \times \text{id}_{Y'}$  の引き戻しなので, 図式

$$\begin{array}{ccc} M_Y(X) & \xrightarrow{(M_g)_X} & M_{Y'}(X) & & M(X \times Y) & \xrightarrow{M_*(\text{id}_X \times g)} & M(X \times Y') \\ \uparrow M_Y^*(f) & & \uparrow M_{Y'}^*(f) = M^*(f \times \text{id}_Y) & & \uparrow & & \uparrow M^*(f \times \text{id}_{Y'}) \\ M_Y(X') & \xrightarrow{(M_g)_{X'}} & M_{Y'}(X') & & M(X' \times Y) & \xrightarrow{M_*(\text{id}_X \times g)} & M(X' \times Y') \end{array}$$

は可換である. したがって,  $M_g$  は  $M_Y$  から  $M_{Y'}$  への Mackey 関手の射である. ■

関手  $M^\square, M_\square: G\text{-set} \rightarrow \text{Mack}(G)$  が  $M^\square(g) = M^g, M_\square(g) = M_g$  により定まる. また,  $\text{Mack}(G) \cong \mu_R(G)\text{-Mod}$  なので, 次の定理が成り立つ.

**定理 2.3**  $M$  を  $G$  の Mackey 関手とする. 関手の組  $(M^\square, M_\square)$  は  $G$  の  $\mu_R(G)\text{-Mod}$  に値を持つ Mackey 関手となる. □

## 参考文献

- [1] Serge Bouc. **Green Functors and  $G$ -sets**. No. 1671 in Lecture Notes in Mathematics. Springer, 1997.