

# Introducción al Análisis Matemático

## Tema 3

### Clase Práctica 2

Licenciatura en Matemática

Curso 2022



## Al estudiante:

Bienvenido a la primera Clase Práctica del segundo tema del curso *Introducción al Análisis Matemático*. Los siguientes ejercicios pueden ser abordados con los conocimientos adquiridos en las conferencias 3.3 y 3.4. ¡Éxitos!

Colectivo de la asignatura

## EJERCICIOS

### PARTE I

#### Ejercicio 1.

Calcula la longitud del arco de cicloide  $x = a(t - \sin t)$ ,  $y = a(1 - \cos t)$ , cuando  $0 \leq t \leq 2\pi$ .

#### Ejercicio 2.

Un punto material se mueve a lo largo de una recta con una velocidad  $v = 2t + 4$  cm/s. Calcula el espacio recorrido en los primeros 10 segundos.

#### Ejercicio 3.

Una varilla rectilínea de longitud  $L$  tiene una distribución de masa dada por

$$m(x) = k x,$$

donde  $k$  es una constante. Calcula la masa total de la varilla y su centro de masa.

### PARTE II

#### Ejercicio 4.

Calcula las integrales siguientes utilizando cambios de variables adecuados:

a)  $\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$

b)  $\int_0^{\pi} \sin^2 x \cos x dx$

c)  $\int_0^1 \frac{\arctan^2 x}{1+x^2} dx$

d)  $\int \frac{\sinh 2x}{\sqrt[3]{1+\sinh^2 x}} dx$

## Ejercicio 5.

Calcula las integrales siguientes utilizando el método de integración por partes:

a)  $\int x \sin(ax) dx$  con  $a \in \mathbb{R}$ .

b)  $\int_0^1 (x^2 + 2x - 5)e^x dx$

c)  $\int \ln^2 x dx$

d)  $\int \cos(\ln x) dx$

## Ejercicio 6.

Calcula las integrales siguientes:

a)  $\int \frac{dx}{\sqrt{e^x + 1}}$

b)  $\int_0^1 \frac{x-1}{x^2-x-1} dx$

c)  $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{1+\cos x} dx$

d)  $\int \frac{x^3}{\sqrt{x-1}} dx$

e)  $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx$

f)  $\int x \arcsin\left(\frac{1}{x}\right) dx$

## Ejercicio 7.

a) Pruebe que

$$\int_0^{2\pi} e^{imx} \cdot e^{-inx} dx = \begin{cases} 0, & \text{si } m \neq n \\ 2\pi, & \text{si } m = n \end{cases}$$

siendo  $m, n \in \mathbb{N}$

b) Usando a), calcule las integrales

i)  $\int_0^{2\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx$

ii)  $\int_0^{2\pi} \operatorname{sen}(mx) \operatorname{sen}(nx) dx$

iii)  $\int_0^{2\pi} \cos(mx) \operatorname{sen}(nx) dx$

## Ejercicio 8.

Calcula el área de la figura limitada por el eje de abscisas y las curvas  $y = \arcsin x$  y  $y = \arccos x$ .

## Ejercicio 9.

Consideremos la figura limitada por la lemniscata de Bernoulli:

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2).$$

Halla su área y la porción de ella que está dentro de la circunferencia

$$x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2}.$$

**Sugerencia:** Utiliza las coordenadas polares.

## Ejercicio 10.

Halla el volumen del cuerpo generado por la rotación alrededor del eje de abscisas de la figura limitada por la curva  $\arccos x$  y cuya base es el intervalo  $[0, 1]$ .

## Ejercicio 11.

Explica las paradojas siguientes:

a) Como

$$\int \sin x \cos x \, dx = \frac{\sin^2 x}{x} \text{ y } \int \sin x \cos x \, dx = -\frac{\cos^2 x}{x}$$

entonces

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 0.$$

b) Ya que

$$\int \frac{dx}{x} = \int -\frac{dx}{(-x)}$$

entonces

$$\ln(x) = \ln(-x)$$

lo que significa que  $-x = x$  y que, por tanto,

$$1 = -1.$$

## Ejercicio 12.

La velocidad de un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial  $v_0$ , contando con la resistencia del aire, se expresa por la fórmula

$$v = C \tan \left( -\frac{g}{C}t + \arctan \frac{v_0}{C} \right),$$

donde  $g$  es la aceleración de la gravedad y  $C$  una constante. Halla la altura máxima a la que se eleva el cuerpo.