

Introducción al Análisis Matemático

Tema 2

Conferencia 6

Ejercicios Resueltos

“El arte es la ciencia de la belleza, las matemáticas son la ciencia de la verdad. ”

Oscar Wilde

Licenciatura en Matemática

Curso 2022



Ejercicio 1

Demuestre que si f y g son dos funciones diferenciables en \mathbb{R} y tales que

$$f'(x)g(x) \neq f(x)g'(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

entonces entre dos raíces de $f(x) = 0$ hay, al menos, un cero de g .

Respuesta

Conviene aquí analizar por *reducción al absurdo*. Supongamos entonces que entre dos ceros de $f(x)$ no hay un cero de g y sean a, b tales ceros. Sin pérdida de generalidad, sea $a < b$. Como

$$f, g \in D(\mathbb{R}) \implies f, g \in D[a, b]$$

y como estamos asumiendo

$$g(x) \neq 0, \quad \forall x \in [a, b]$$

$$\Downarrow$$

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \in D[a, b].$$

Entonces, aplicando el teorema de Lagrange

$$\exists c \in (a, b) : h'(c) = \frac{h(b) - h(a)}{b - a}$$

$$\Updownarrow$$

$$\frac{f'(c)g(c) - f(c)g'(c)}{g^2(c)} = \frac{\frac{f(b)}{g(b)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{b - a}.$$

El Miembro Izquierdo de la igualdad anterior siempre es distinto de cero debido a que se tiene la hipótesis

$$f'(x)g(x) \neq f(x)g'(x), \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

mientras que el Miembro Derecho es igual a cero ya que $f(a) = f(b) = 0$ y $b > a$. Lo anterior constituye una **contradicción**. Por tanto, lo supuesto es falso, es decir, entre dos ceros de f hay, al menos, un cero de g si

$$f'(x)g(x) \neq f(x)g'(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ejercicio 2

Halle todas las soluciones reales de la ecuación

$$5^x + 2^x = 4^x + 3^x.$$

Respuesta

La ecuación posee dos soluciones obvias ($x = 0$, $x = 1$). Ahora, ¿serán estas las únicas? Reescribamos la ecuación anterior en la forma

$$5^x - 4^x = 3^x - 2^x.$$

Consideremos entonces la función

$$f(t) = t^x, \quad t > 0, \quad x \text{ fijo.}$$

Notemos que

$$f(t) \in D([2, 3] \cup [4, 5]),$$

luego, por el teorema de Lagrange

$$\exists t_1 \in [4, 5] : f'(t_1) = xt_1^{x-1} = \frac{5^x - 4^x}{5 - 4} = 5^x - 4^x$$

y

$$\exists t_2 \in [2, 3] : f'(t_2) = xt_2^{x-1} = \frac{3^x - 2^x}{3 - 2} = 3^x - 2^x.$$

Como

$$5^x - 4^x = 3^x - 2^x$$

$$xt_1^{x-1} = xt_2^{x-1}$$

$$\Downarrow$$

$$x(t_1^{x-1} - t_2^{x-1}) = 0.$$

De lo anterior se obtiene que $x = 0$ es una solución; se obtiene también que una solución es $x \in \mathbb{R}$ tal que

$$t_1^{x-1} - t_2^{x-1} = 0$$

$$t_1^{x-1} = t_2^{x-1}$$

$$\left(\frac{t_1}{t_2}\right)^{x-1} = 1$$

$$\Downarrow$$

$$x = 1$$

pues $t_1 \neq t_2$ ya que $t_1 \in [4, 5]$, $t_2 \in [2, 3]$ y $[2, 3] \cap [4, 5] = \emptyset$.

Se concluye entonces que las únicas soluciones son las triviales: $x = 0$ y $x = 1$.

Ejercicio 3

Demuestre que

$$(e+x)^{e-x} > (e-x)^{e+x}, \quad \forall x \in (0, e).$$

Respuesta

Transformemos la inecuación que se debe probar en la equivalente

$$(e-x) \ln(e+x) > (e+x) \ln(e-x), \quad \forall x \in (0, e)$$

y consideremos la función auxiliar

$$h(x) = (e-x) \ln(e+x) - (e+x) \ln(e-x) \in D[0, e]$$

\Downarrow

$$\begin{aligned} h'(x) &= -\ln(e+x) + \frac{e-x}{e+x} - \ln(e-x) + \frac{e+x}{e-x} \\ &= -\ln[(e+x)(e-x)] + \frac{(e-x)^2 + (e+x)^2}{e^2 - x^2} \\ &= \frac{2(x^2 + e^2)}{e^2 - x^2} - \ln(e^2 - x^2) \end{aligned}$$

de la cual a simple vista no puede afirmarse nada. Analicemos h'' :

$$\begin{aligned} h''(x) &= 2 \left[\frac{2x(e^2 - x^2) - (x^2 + e^2)(-2x)}{(e^2 - x^2)^2} \right] + \frac{2x}{e^2 - x^2} \\ &= 4 \left[\frac{xe^2 - x^3 + x^3 + xe^2}{(e^2 - x^2)^2} \right] + \frac{2x}{e^2 - x^2} \\ &= \frac{8xe^2}{(e^2 - x^2)^2} + \frac{2x}{e^2 - x^2} \\ &= \frac{8xe^2 + 2x(e^2 - x^2)}{e^2 - x^2} \\ &= \frac{2x(5e^2 - x^2)}{(e^2 - x^2)^2} \end{aligned}$$

de modo que

$$h''(x) > 0 \quad \forall x \in (0, e)$$

\Downarrow

$h'(x)$ es estrictamente creciente en $(0, e)$ y como $h'(0) = 0$ entonces

$$\Downarrow$$

$$h'(x) > 0 \quad \forall x \in (0, e)$$

$$\Downarrow$$

$h(x)$ es estrictamente creciente en $(0, e)$ y como $h(0) = 0$ entonces

$$\Downarrow$$

$$h(x) > 0 \quad \forall x \in (0, e)$$

con lo cual queda finalmente que

$$(e - x) \ln(e + x) > (e + x) \ln(e - x), \quad \forall x \in (0, e)$$

$$\Updownarrow$$

$$(e + x)^{e-x} > (e - x)^{e+x}, \quad \forall x \in (0, e).$$

Ejercicio 4

Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable y tal que no existe x para el que se cumpla que $f(x) = f'(x)$. Pruebe entonces que el conjunto $E = \{x \in [0, 1] : f(x) = 0\}$ es finito.

Respuesta

Consideremos la función auxiliar

$$f(x) = e^{-x} f(x) \in D[0, 1]$$

por ser $f \in D[0, 1]$ y $y = e^{-x} \in D(\mathbb{R}) \Rightarrow y = e^{-x} \in D[0, 1]$

$$\Downarrow$$

$$h'(x) = e^{-x}(f'(x) - f(x)) \neq 0$$

pues no existe x tal que $f(x) = f'(x)$ por hipótesis y $y = e^{-x} \neq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Supongamos ahora que el conjunto

$$E = \{x \in [0, 1] : f(x) = 0\}$$

es infinito. Entonces posee al menos dos elementos $x_1, x_2 \in [0, 1]$ tal que $f(x_1) = f(x_2) = 0$. Sin perder generalidad supongamos que $x_1 < x_2$. Se tendría entonces que $h \in D[0, 1] \Rightarrow h \in D[x_1, x_2]$ y $h(x_1) = h(x_2) = 0$, luego, por el corolario de Rolle se tiene que

$$\exists c \in (x_1, x_2) : h'(c) = 0 = e^{-c}(f'(c) - f(c))$$

\Downarrow

$$\exists c \in (0, 1) : f'(c) = f(c),$$

lo cual constituye una **contradicción**.

Por tanto, el conjunto E es finito. De hecho, se ha probado que E tiene, a lo más, un elemento.

Ejercicio 5

Demuestre que si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función derivable que cumple $f'(x) \neq 0$ para todo $x \in (a, b)$ entonces f es inyectiva.

Respuesta

Comencemos por notar que si para todo $x \in (a, b)$ $f'(x) < 0$ o $f'(x) > 0$ entonces f sería estrictamente monótona y, por tanto, inyectiva pero, en principio, nada garantiza que f mantenga el signo en $[a, b]$.

Razonemos entonces por *reducción al absurdo*. Supongamos que f no sea inyectiva en $[a, b]$ y satisfaga

$$f \in D[a, b] : f'(x) \neq 0 \quad \forall x \in [a, b].$$

Sean

$$x_1 < x_2, \quad x_1, x_2 \in [a, b] : f(x_1) = f(x_2)$$

\Downarrow

$$f \in D[x_1, x_2], \quad f(x_1) = f(x_2)$$

entonces por el teorema de Rolle se tiene que

$$\exists c \in (x_1, x_2) \subset (a, b) : f'(c) = 0,$$

lo cual constituye una **contradicción**. Por tanto, f es inyectiva.

Ejercicio 6

Demuestre que

$$2 \arctan(e^x) - \frac{\pi}{2} = \arctan(\operatorname{arcsenh}(x)) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Respuesta

Basta ver que la función

$$h(x) = 2 \arctan(e^x) - \arctan(\operatorname{arcsenh}(x)) = \frac{\pi}{2} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Para ello notemos que si hacemos

$$h_1(x) = 2 \arctan(e^x), \quad h_2(x) = \arctan(\operatorname{arcsenh}(x))$$

se tiene que

$$h'_1(x) = h'_2(x) = \frac{2e^x}{1 + (e^x)^2},$$

de modo que

$$h'(x) = h'_1(x) - h'_2(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

de modo que h es constante en \mathbb{R} . Notemos que

$$h(0) = 2 \arctan(0) - \arctan(\operatorname{arcsenh}(0)) = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2},$$

con lo que queda demostrado lo que se quería.

Referencias

- [1] Valdés, C. (2017) *Introducción al Análisis Matemático*. Universidad de La Habana.