

# Mandelbrot Set 的生成与探索

赵天健

信息与计算科学 3210101830

2022 年 7 月 1 日

## 摘要

本文主要介绍 Mandelbrot Set 问题定义及其背景. 将集合中的点在复平面上表示后, 只要计算的点足够多, 其就会展现出无穷的细节及不同的几何分形, 它体现出的美感使其被称为”上帝的指纹”.

Mandelbrot Set 不只是图形美丽, 其背后的数学理论也十分深奥. 本文仅对其一些基本性质和几个主要的分形所具有的性质进行讨论, 并给出一些数值算例对上述性质加以验证.

同时, 本文还将简单介绍生成 Mandelbrot Set 图片的迭代算法, 具体可到[我的 github 仓库](#) 查看.

## 1 引言

Mandelbrot Set 具有漂亮的几何分形, 被称为”上帝的指纹”. 只要你计算的点足够多, 不管你把图案放大多少倍, 都能显示出更加复杂的局部, 这些局部既与整体不同, 又有某种相似的地方. 图案具有无穷无尽的细节和自相似性. 如图1所示分形产生过程, 其中后一个图均是前一个图的某一局部放大:




图 1: 将细节放大后的结果

自 20 世纪 80 年代以来, 由于计算机的分辨率逐渐变高, 可以更清晰地显示 Mandelbrot Set 的细节, 人们对 Mandelbrot Set 的研究也逐渐深入.

## 2 问题的背景介绍

Mandelbrot Set 源于复动力学, 最早于 1978 年被 Robert W. Brooks 和 Peter Matelski 定义, 并被作为研究 Kleinian 群的一部分. 1980 年 3 月 1 日, 在 IBM 的 Benoit Mandelbrot 首次将该集合可视化. Mandelbrot 在 1980 年发表的一篇文章中研究了二次多项式的参数空间. 曼德尔布罗集的数学研究实际上始于数学家 Adrien Douady 和 John Hubbard 1985 年起的工作. 他们确立了许多基本属性, 并以 Mandelbrot 命名来纪念其在分形几何方面有影响力的工作.

数学家 Heinz-Otto Peitgen 和 Peter Richter 以用照片, 书籍宣传该分形而闻名.

1985 年 8 月 *Scientific American* 的封面文章向广大受众介绍了计算曼德尔布罗特集的算法. 封面由不来梅大学的 Peitgen, Richter 和 Saope 创作. Mandelbrot Set 在 20 世纪 80 年代中期作为计算机图形演示变得突出, 当时个人计算机变得足够强大, 可以以高分辨率绘制和显示该集.

Douady 和 Hubbard 的工作恰逢人们对复动力学和抽象数学的兴趣大幅增加. 自那以后, 对 Mandelbrot 集的研究一直是该领域的核心. 自那时以来, 所有对理解此集合做出贡献的人的详尽名单很长, 但必然会包括 Jean-Christophe Yoccoz, Mitsuhiro Shishikura, Curt McMullen, John Milnor 和 Mikhail Lyubich.

## 3 数学理论

### 3.1 定义

Mandelbrot Set( 后称为  $M$  ) 是所有使得  $z = 0$  在二次映射  $z_{n+1} = z_n^2 + c$  的迭代下保持有限的  $c$  的集合. 也就是说若  $c \in \mathbb{C}$  在 Mandelbrot Set 中, 那么从  $z_0 = 0$  开始, 重复进行上述迭代,  $|z_n|$  始终保持有界.

### 3.2 基本性质

**性质 1.** *Mandelbrot Set* 是一个紧集.

证明. 因为我们有

$$c \in M \iff |z_n| \leq 2 (n \geq 0)$$

这是显然的, 当  $z_n$  模长大于 2 时, 这个序列会趋于无穷. 而同时由于  $z_1 = c$ , 可得  $c \in M \Rightarrow |c| \leq 2$ , 即  $c$  处在以原点为中心, 2 为半径的闭圆盘中. 结合有界闭集是紧集, 可以推知.  $\square$

**性质 2.**  $M \cap \mathbb{R} = [-2, \frac{1}{4}]$ .

证明. 由性质1知  $M \cap \mathbb{R} \subseteq [-2, 2]$ , 下面分三步证明:

1'  $c \in [-2, 0] \Rightarrow c \in M$ :

易知  $z_0 = 0, z_1 = c$ , 下面归纳证明  $z_n \in [c, -c]$ :

假设已知  $z_{n-1} \in [c, -c]$ , 那么显然成立

$$z_n = z_{n-1}^2 + c \geq c$$

且

$$z_{n-1}^2 + 2c \leq c^2 + 2c \leq 0 \Rightarrow z_n = z_{n-1}^2 + c \leq -c$$

从而情况 1 得证.

2'  $c \in (0, \frac{1}{4}] \Rightarrow c \in M$ :

归纳证明  $z_n \in [0, \frac{1}{2}]$ :

易知  $z_n \geq 0$ , 只需证  $z_n \leq \frac{1}{2}$  即可. 同 1 讨论, 可假设  $n \geq 1$  时, 有  $z_{n-1} \leq \frac{1}{2}$ . 那么有

$$z_n = z_{n-1}^2 + c \leq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

从而情况 2 得证.

3'  $c \in (\frac{1}{4}, 2] \Rightarrow c \notin M$ :

有

$$z_{i+1} - z_i = z_i^2 - z_i + c \geq c - \frac{1}{4}, \forall i \in \mathbb{N}.$$

故取  $i = \lceil \frac{2}{c-\frac{1}{4}} \rceil$ , 就有  $z_{i+1} \geq 2$ , 则根据前面的讨论, 有  $c \notin M$ .

从而情况 3 得证. 综上, 原命题得证. □

**性质 3.** *Mandelbrot Set* 是连通集.

Douady 和 Hubbard 提供了此性质的证明.

还有一些性质, 不论是其本身还是证明方法都要用到更高深的数学知识和技巧, 作者压根看不懂在此不做深入介绍.

## 4 算法

绘制 Mandelbrot Set 用到了**逃逸时间算法**, 通俗讲就是根据上一节的讨论, 我们知道所有的  $c$  都落在以原点为中心, 2 为半径的闭圆盘中, 且若某次迭代后  $|z_i| > 2$ , 则必有  $c \notin M$ . 由此, 我们可以设置一个**逃逸时间** (escape time), 即迭代多少次后还没出圈, 就认为  $c \in M$ . 由此, 容易形成以下算法:

```
for each c in C: //C is the complex plain
    z = 0
    ok = 1
    for i = 1 to N: //N is the escape time
```

```
z = z * z + c
if |z| >= 2:
    ok = 0
if ok = 1:
    draw(c) //draw(p) means draw complex number p on the picture
```

了解位图 ( .bmp ) 文件的标准格式, 并循环每个窗口上的像素点进行上述判断, 就可以编写程序生成画有 Mandelbrot Set 的位图了.

## 5 数值算例

通过运行上述程序, 将逃逸时间设为 100, 并按仓库中README.md中提示执行如下命令:

```
./run.sh my.bmp 0 0 5
```

就会得到如下文件:




图 2: my.bmp

对参数进行修改, 可以改变图像的中心位置, 大小. 对代码中的参数进行修改, 可以更改逃逸时间, 逃逸半径等参数.

## 6 结论

作为一个数学问题, Mandelbrot Set 已经因其美学价值在数学之外的领域愈发著名. 其通过应用简单的规则形成复杂的结构的特点吸引着人们不断探索它的奥秘.

## 参考文献

- [1] Wikipedia contributors. Mandelbrot set — Wikipedia, the free encyclopedia. [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandelbrot\\_set&oldid=1094796296](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandelbrot_set&oldid=1094796296), 2022. [Online; accessed 1-July-2022].
- [2] 朱华 and 姬翠翠. 分形理论及其应用. 分形理论及其应用, 2011.