

1. (а) Представить слагаемые и результат в виде *нормализованного* числа с плавающей точкой двойной точности: $(-1)^s \cdot 2^{1023-e} \cdot 1.f$, где $1.f$ записано в двоичном виде. (б) Если результат неточный (не умещается целиком в мантиссе), то указать относительную погрешность ошибки. Исходные данные в десятичной системе счисления.

$$-683,6640625 \cdot 2^{120} + 1177,0703125 \cdot 2^{173}$$

Решение. Переведём слагаемые в двоичную систему и преобразуем их затем к нормализованному виду $(-1)^s \cdot 2^{1023-e} \cdot 1.f$:

$$\begin{aligned} -683,6640625 \cdot 2^{120} + 1177,0703125 \cdot 2^{173} &= -1010101011.1010101 \cdot 2^{120} + 10010011001.0001001 \cdot 2^{173} = \\ &= -2^{129} \cdot 1.0101010111010101 - 2^{183} \cdot 1.00100110010001001 = \\ &= (-1)^1 2^{1152-1023} \cdot 1.0101010111010101 \sim 2^{129} \sim 10^{37} \\ + (-1)^0 2^{1206-1023} \cdot 1.00100110010001001 &\sim 2^{183} \sim 10^{55} \\ = (-1)^0 2^{1206-1023} \cdot 1.00100110010001001 &\sim 2^{183} \sim 10^{55} \\ \delta_{\text{абс}} = \text{разряды какого порядка не поместилось в 52 бита мантиссы} &= \sim 2^{129} \sim 10^{39} \\ \delta_{\text{отн}} = \delta_{\text{абс}} / 2^{183} &\sim 2^{-54} \sim 10^{-16} \end{aligned}$$

2. Написать последовательность инструкций Matlab, формирующих указанную матрицу. Около каждой инструкции указать промежуточный результат в виде матрицы. Разрешается использовать матричные функции (`eye`, `repmat`, `flipud` и др.). Использовать циклы нельзя.

Входные данные:	Нужно получить:
Целое $n \geq 10$	$\begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{n} & \cos \frac{2\pi}{n} & \cos \frac{3\pi}{n} & \dots & \cos \frac{n\pi}{n} \\ \cos^2 \frac{\pi}{n} & \cos^2 \frac{2\pi}{n} & \cos^2 \frac{3\pi}{n} & \dots & \cos^2 \frac{n\pi}{n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cos^n \frac{\pi}{n} & \cos^n \frac{2\pi}{n} & \cos^n \frac{3\pi}{n} & \dots & \cos^n \frac{n\pi}{n} \end{pmatrix}$

`n = 10;`

`A = repmat([1:n], n, 1);`

`A = cos(A*pi/n);`

Решение.

`B = repmat([1:n]', 1, n);`

`A = A.^B;`

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix} \\ A &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{n} & \cos \frac{2\pi}{n} & \dots & \cos \frac{n\pi}{n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \cos \frac{\pi}{n} & \cos \frac{2\pi}{n} & \dots & \cos \frac{n\pi}{n} \end{pmatrix} \\ B &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 2 & \dots & 2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ n & n & \dots & n \end{pmatrix} \\ A &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{n} & \cos \frac{2\pi}{n} & \dots & \cos \frac{n\pi}{n} \\ \cos^2 \frac{\pi}{n} & \cos^2 \frac{2\pi}{n} & \dots & \cos^2 \frac{n\pi}{n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \cos^n \frac{\pi}{n} & \cos^n \frac{2\pi}{n} & \dots & \cos^n \frac{n\pi}{n} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

3. (а) Локализовать корни уравнения (для каждого корня z_i указать отрезок $[a_i, b_i]$, содержащий только один этот корень z_i). Для *каждого* корня (б) построить итерационный процесс $x_{n+1} = \varphi(x_n)$, сходящийся к корню и (в) указать начальное значение x_0 . Указание: локализацию проводить перебором интервалов $[a_i, b_i]$ или средствами математического анализа.

$$x^3 + 3x^2 - 1 = 0$$

Решение. Табличным способом выделим отрезки, на концах которых функция $f(x)$ имеет разные знаки

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$\text{sign } f(x)$	-	+	+	-	+	+	+

Таким образом, корни исходного уравнения лежат на отрезках $[-3, -2]$, $[-1, 0]$ и $[0, 1]$, для каждого из которых построим свой итерационный процесс.

Для $x \in [-3, -2]$ разделим исходное уравнение на x^2 . В результате получим равносильное уравнение $x = \varphi(x)$, $\varphi(x) = \frac{1}{x^2} - 3$. Итерационный процесс для нахождения первого корня: $x_{n+1} = \frac{1}{x_n^2} - 3$. Поскольку $|\varphi'(x)| = \left| -\frac{2}{x^3} \right| \leq \frac{1}{4} < 1$ для $x \in [-3, -2]$, то сходимость имеет место для всех начальных приближений $x_0 \in [-3, -2]$.

Для двух других отрезков исходное уравнение перепишем в виде $x^2(x+3) - 1 = 0$. Если $x_0 \in [-1, 0]$, то определим итерационный процесс $x_{n+1} = -\frac{1}{\sqrt{x_n+3}}$; если $x_0 \in [0, 1]$, то $x_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{x_n+3}}$. Можно показать, что в процессе итераций соответствующие отрезки отображаются в себя, поэтому сходимость построенных итерационных процессов следует из оценки $|\varphi'(x)| = \frac{1}{2} \left| \frac{1}{\sqrt{x+3}} \right|^3 < 1$.

4. Известно, что интервалу $[a, b]$ принадлежит *только* корень x_* уравнения (другие корни интервалу не принадлежат). (а) Построить итерационный процесс Ньютона $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ и (б) обосновать какую из границ интервала $[a, b]$ можно принять за x_0 . Указание: в пункте (б) выяснить знаки производных $f'(x)$ и $f''(x)$ и использовать соответствующую теорему.

$$\sin(\ln x) = 0, \quad x_* \in [22, 24]$$

Решение. Построим итерационный процесс $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_{n+1} = x_n - \frac{x_n \sin(\log(x_n))}{\cos(\log(x_n))}$

Определим знаки производных на отрезке $[22, 24]$:

$$f'(x) = \frac{\cos(\log(x))}{x} \leq -0.0454 < 0, \quad f''(x) = -\frac{\cos(\log(x))}{x^2} - \frac{\sin(\log(x))}{x^2} \geq 0.0018 > 0$$

Так как $f' \cdot f'' < 0$, то берем левую границу интервала $x_0 = 22$.

5. (а) Построить интерполяционный многочлен Лагранжа для функции $f(x)$ по узлам x_i . (б) Оценить сверху погрешность $|R_n(x)|$ приближения функции многочленом.

$$\sin(\arctan x) \quad x_0 = 0, \quad x_1 = \pi/2, \quad x_2 = \pi$$

Решение. Строим многочлен Лагранжа по следующей таблице

x	0	$\pi/2$	π
$\sin(\arctan x)$	$\sin(\arctan 0)$	$\sin(\arctan \pi/2)$	$\sin(\arctan \pi)$

$$P_2(x) = -0.1488x^2 + 0.7707x$$

Найдем погрешность по формуле $R_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}\omega_3(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}(x-0)(x-\pi/2)(x-\pi)$:

$$f'''(x) = \frac{18x^2}{(x^2+1)^{\frac{5}{2}}} - \frac{3}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}} - \frac{15x^4}{(x^2+1)^{\frac{7}{2}}}$$

$$|R_2(x)| = \frac{|f'''(\xi)|}{3!}|\omega_3(x)| \leq \frac{3}{6} \cdot 1.4917 \approx 0.7459$$

6. Заданную функцию будут интерполировать на отрезке $[a, b]$ по чебышёвским узлам с заданной точностью $|R_n(x)| < \varepsilon$. Требуется (а) определить требуемое для заданной точности ε количество узлов (т.е. степень интерполяционного многочлена плюс 1) и (б) вычислить значения всех узлов и отметить их на действительной оси Ox (если узлов окажется много, ограничиться вычислением значений наименьших 10 узлов).

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}} + \cos x \quad \text{на отрезке } [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \text{ с точностью } \varepsilon = 10^{-2}$$

Решение.

Оценим погрешность многочлена Лагранжа для Чебышевских узлов:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}(b-a)^{n+1} \cdot 2^{1-2(n+1)}$$

Оказывается, что при $n = 5$ справедливо $f^{(5)} = -\sin(x) - \frac{945}{32(x+1)^{\frac{11}{2}}}$ и $\frac{M_{n+1}}{(n+1)!}(b-a)^{n+1} \cdot 2^{1-2(n+1)} \approx 0.0058$.

Выпишем Чебышёвские узлы $x_k = \frac{b+a}{2} + \frac{b-a}{2} \cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right)$:

$$x_1 = 3.1416 + 1.5708 \cos \frac{9\pi}{10} = 1.6477, \quad x_2 = 3.1416 + 1.5708 \cos \frac{7\pi}{10} = 2.2183, \quad x_3 = 3.1416 + 1.5708 \cos \frac{5\pi}{10} = 3.1416, \\ x_4 = 3.1416 + 1.5708 \cos \frac{3\pi}{10} = 4.0649, \quad x_5 = 3.1416 + 1.5708 \cos \frac{1\pi}{10} = 4.6355$$

7. Данные некоторого физического эксперимента представлены в таблице. Характер зависимости $y(x)$ заранее точно неизвестен. Есть предположения, что зависимость может быть линейной, квадратичной или кубической. (а) Методом среднеквадратического приближения построить три типа зависимостей $y(x)$ (т.е. аппроксимирующие многочлены первой, второй и третьей степени). (б) Для каждого типа зависимостей вычислить среднеквадратическое отклонение $\sqrt{\frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n (y(x_i) - y_i)^2}$. (в) Выбрать минимальное с.к.о. и указать соответствующий ему тип зависимости, т.е. наиболее вероятный в проведённом эксперименте.

x	0	1	2	3	4
y	-0.1	2.3	4.1	7.3	10.9

Решение.

Пусть вначале зависимость линейная: $x(t) = a + bx$. По методу среднеквадратического приближения получаем: $P_1(x) = 2.7000x - 0.5000$.

Среднеквадратическое отклонение

$$\sigma_1 = \sqrt{\frac{1}{5} \left[(-0.1 - (2.7000 \cdot 0 - 0.5000))^2 + (2.3 - (2.7000 \cdot 1 - 0.5000))^2 + (4.1 - (2.7000 \cdot 2 - 0.5000))^2 + (7.3 - (2.7000 \cdot 3 - 0.5000))^2 + (10.9 - (2.7000 \cdot 4 - 0.5000))^2 \right]} = 0.5020$$

Аналогично для квадратичной зависимости: $P_2(x) = 0.2714x^2 + 1.6143x + 0.0429$ и $\sigma_2 = 0.2138$.

Аналогично для кубической зависимости: $P_3(x) = 0.0833x^3 - 0.2286x^2 + 2.3310x - 0.0571$ и $\sigma_3 = 0.1604$

Так как σ_3 наименьшее, следовательно, зависимость — кубическая.

8. (а) Методом неопределённых коэффициентов составить формулу для вычисления указанной производной по значениям функции в указанных узлах. (б) Раскладывая $y(x_i)$ в ряд Тейлора, определить порядок p погрешности $O(h^p)$ полученной формулы.

$$y''(x_1) = c_0 y(x_0) + c_1 y(x_1) + c_2 y(x_2) + c_3 y(x_3) + O(h^p).$$

$$x_0 \underbrace{\quad}_h x_1 \underbrace{\quad}_h x_2 \underbrace{\quad}_h x_3$$

Решение. Приближим функцию $y(x)$ многочленом Лагранжа по узлам x_0, x_1, x_2, x_3 :

$$y(x) \approx P_3(x) = \sum_{k=0}^3 y_k \frac{L_3^{(k)}(x)}{L_3^{(k)}(x_k)}.$$

Продифференцируем полученное равенство:

$$y(x)'' \approx P_3''(x) = \sum_{k=0}^3 y_k \frac{d^2}{dx^2} \left[\frac{L_3^{(k)}(x)}{L_3^{(k)}(x_k)} \right] = \sum_{k=0}^3 y_k c_k(x),$$

где значение $c_k(x)$ не зависит от функции $y(x)$. Нас интересует y_1'' , поэтому положим $x = x_1$:

$$y_1'' \approx \sum_{k=0}^3 y_k c_k(x_1).$$

Далее вместо $c_k(x_1) = \text{const}$ будем писать просто c_k .

Вспомним, что многочлен Лагранжа $P_3(x)$ является точным приближением, когда функция $y(x)$ есть многочлен степени ≤ 3 . В частности, $P_3(x)$ точно аппроксимирует функции

$$z = 1, \quad z = x - x_0, \quad z = (x - x_0)^2, \quad z = (x - x_0)^3$$

(выбор именно этих многочленов обусловлен удобством дальнейших расчётов).

Несложно показать, что, если подобрать числа c_k таким образом, чтобы $z_1'' = \sum_{k=0}^3 z_k c_k$ было точным равенством (для выбранных четырёх многочленов z), то это будет значение $c_k(x)$ для многочлена Лагранжа в точке $x = x_1$.

Найдём производные: $\frac{z}{z''} \left| \begin{array}{c|c|c|c|c} z & 1 & x - x_0 & (x - x_0)^2 & (x - x_0)^3 \\ \hline z'' & 0 & 0 & 2 & 6(x - x_0) \end{array} \right.$. Для каждой колонки запишем $z_1'' = \sum_{k=0}^3 z_k c_k$:

$$0 = c_0 \cdot 1 + c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 1 + c_3 \cdot 1,$$

$$0 = c_0(x_0 - x_0) + c_1(x_1 - x_0) + c_2(x_2 - x_0) + c_3(x_3 - x_0),$$

$$2 = c_0(x_0 - x_0)^2 + c_1(x_1 - x_0)^2 + c_2(x_2 - x_0)^2 + c_3(x_3 - x_0)^2,$$

$$6(x_1 - x_0) = c_0(x_0 - x_0)^3 + c_1(x_1 - x_0)^3 + c_2(x_2 - x_0)^3 + c_3(x_3 - x_0)^3.$$

Узлы x_i , $i = 0, 1, 2, 3$ — равноотстоящие с шагом h , поэтому $x_1 - x_0 = h$, $x_2 - x_0 = 2h$, $x_3 - x_0 = 3h$:

$$0 = c_0 + c_1 + c_2 + c_3,$$

$$0 = c_1 + 2c_2 + 3c_3,$$

$$2 = c_1 h^2 + 4c_2 h^2 + 9c_3 h^2,$$

$$6 = c_1 h^3 + 8c_2 h^3 + 27c_3 h^3.$$

Решая систему, получим:

$$c_0 = \frac{1}{h^2}, \quad c_1 = -\frac{2}{h^2}, \quad c_2 = \frac{1}{h^2}, \quad c_3 = 0.$$

Окончательно $y_1'' \approx \frac{1}{h^2}(y_0 - 2y_1 + y_2)$.

Имеем:

$$y_1'' = \frac{1}{h^2}(y_0 - 2y_1 + y_2) + O(h^p),$$

где порядок p нужно определить. Для этого разложим y_i , $i = 0, 2$ в ряд Тейлора в окрестности точки x_1 до члена h^4 (сейчас точно неясно до какого члена нужно раскладывать, но, если понадобится, разложение всегда можно продолжить):

$$\begin{aligned} y(x_0) = y(x_1) + (x_0 - x_1)y'(x_1) + \frac{(x_0 - x_1)^2}{2!}y''(x_1) + \\ + \frac{(x_0 - x_1)^3}{3!}y'''(x_1) + \frac{(x_0 - x_1)^4}{4!}y^{IV}(x_1) + O((x_0 - x_1)^5), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y(x_2) = y(x_1) + (x_2 - x_1)y'(x_1) + \frac{(x_2 - x_1)^2}{2!}y''(x_1) + \\ + \frac{(x_2 - x_1)^3}{3!}y'''(x_1) + \frac{(x_2 - x_1)^4}{4!}y^{IV}(x_1) + O((x_2 - x_1)^5), \end{aligned}$$

В более компактной записи:

$$y_0 = y_1 - hy_1' + h^2y_1''/2 - h^3y_1'''/6 + h^4y_1^{IV}/24 + O(h^5),$$

$$y_2 = y_1 + hy_1' + h^2y_1''/2 + h^3y_1'''/6 + h^4y_1^{IV}/24 + O(h^5).$$

Подставим полученные значения в формулу для численной производной:

$$\frac{1}{h^2}(y_0 - 2y_1 + y_2) = \frac{1}{h^2} \left[h^2y_1'' + \frac{h^4}{12}y_1^{IV} + O(h^5) \right] = y_1'' + \underbrace{\frac{h^2}{12}y_1^{IV} + O(h^3)}_{O(h^2)}.$$

Так как четвёртая производная в общем случае отлична от нуля, то порядок погрешности равен 2.

9. Даны формула численного дифференцирования и таблично заданная функция $y(x)$ (данные в таблице могут содержать погрешность не более δ). Определить оптимальное значение шага $h_{\text{опт}}$, когда достигается максимально возможная точность данной формулы, а неустойчивость численного дифференцирования ещё себя не проявляет.

$$\text{ф-ла } y_1'' = \frac{1}{h^2}(y_0 - 2y_1 + y_2); \quad \text{функ. } y(x) = \sin x \text{ на отрезке } [\pi/2, \pi]; \quad \text{погр. } \delta = 10^{-7}.$$

Решение.

Формула численной производной с шагом h :

$$y_1'' = \frac{1}{h^2}(y_0 - 2y_1 + y_2).$$

В действительности из-за погрешности δ компьютер вычисляет

$$y_1'' \approx \frac{1}{h^2}(\tilde{y}_0 - 2\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2), \quad \text{где } \tilde{y}_i = y_i \pm \delta.$$

Рассмотрим погрешность

$$\begin{aligned}\Delta &= \left| y''(x_1) - \frac{1}{h^2}(\tilde{y}_0 - 2\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2) \right| = \left| \left(y_1'' - \frac{1}{h^2}(y_0 - 2y_1 + y_2) \right) + \left(\frac{1}{h^2}(y_0 - 2y_1 + y_2) - \frac{1}{h^2}(\tilde{y}_0 - 2\tilde{y}_1 + \tilde{y}_2) \right) \right| \leq \\ &\leq \left| y_1'' - \frac{1}{h^2}(y_0 - 2y_1 + y_2) \right| + \left| \frac{y_0 - \tilde{y}_0}{h^2} \right| + \left| \frac{2y_1 - 2\tilde{y}_1}{h^2} \right| + \left| \frac{y_2 - \tilde{y}_2}{h^2} \right| \leq \\ &\leq \underbrace{\frac{|y^{\text{IV}}(\eta)|}{12} h^2}_{\substack{\text{см. разложение} \\ \text{в лекции №5}}} + \frac{\delta}{h^2} + \frac{2\delta}{h^2} + \frac{\delta}{h^2} \leq \frac{M_4}{12} h^2 + \frac{4\delta}{h^2} = \Phi(h),\end{aligned}$$

где $M_4 = \max_{[x_0, x_2]} |y^{\text{IV}}(x)| \leq 1$.

Минимизируем ошибку $\Phi(h)$:

$$h_{\text{opt}} : \quad \Phi'(x) = \frac{M_4 h}{6} - \frac{8\delta}{h^3} = 0 \quad \Rightarrow \quad h_{\text{opt}} = \sqrt[4]{\frac{48\delta}{M_4}} = \sqrt[4]{\frac{48 \cdot 10^{-7}}{1}} \approx 0,047.$$

10. Получить (письменно) приближённое значение интеграла I по квадратурной формуле $S(h)$ сначала с шагом h_1 , а затем с шагом h_2 . Используя метод Рунге, указать насколько значение $S(h_2)$ отличается от истинного значения интеграла I .

$$I = \int_1^2 x \sin x \, dx; \quad S(h) = h \sum_{i=1}^n f(x_i) \text{ (Ф-ла правых прямоуго.);} \quad h_1 = 1/5, \quad h_2 = 1/12.$$

Решение. Используя формулу правых прямоугольников, получим:

$$S(1/5) = \frac{1}{5} (1,2 \cdot \sin 1,2 + 1,4 \cdot \sin 1,4 + 1,6 \cdot \sin 1,6 + 1,8 \cdot \sin 1,8 + 2 \cdot \sin 2) \approx 1,5338;$$

$$\begin{aligned}S(1/12) &= \frac{1}{12} \left(\frac{13}{12} \sin \frac{13}{12} + \frac{14}{12} \sin \frac{14}{12} + \frac{15}{12} \sin \frac{15}{12} + \frac{16}{12} \sin \frac{16}{12} + \frac{17}{12} \sin \frac{17}{12} + \frac{18}{12} \sin \frac{18}{12} + \frac{19}{12} \sin \frac{19}{12} + \frac{20}{12} \sin \frac{20}{12} + \right. \\ &\quad \left. + \frac{21}{12} \sin \frac{21}{12} + \frac{22}{12} \sin \frac{22}{12} + \frac{23}{12} \sin \frac{23}{12} + \frac{24}{12} \sin \frac{24}{12} \right) \approx 1,4804.\end{aligned}$$

Для оценки погрешности $S(1/12)$ воспользуемся методом Рунге. Справедлива формула:

$$\int_a^b f(x) \, dx = S(h) + O(h^p) = S(h) + ch^p + O(h^{p+1}), \quad c = \text{const.}$$

Отбрасывая слагаемое меньшего порядка малости, получим:

$$\int_a^b f(x) \, dx \begin{array}{l} \simeq S(1/5) + c(1/5)^1 \\ \simeq S(1/12) + c(1/12)^1 \end{array}$$

Откуда

$$c \approx \frac{S(1/5) - S(1/12)}{(1/12)^1 - (1/5)^1}.$$

$$\text{погрешность} = |I - S(1/12)| \approx |c(1/12)^1| \approx \left| \frac{S(1/5) - S(1/12)}{(1/12)^1 - (1/5)^1} (1/12)^1 \right| \approx \left| \frac{1,5338 - 1,4804}{(1/12)^1 - (1/5)^1} (1/12)^1 \right| \approx 0,038.$$

11. Предложить способ вычисления несобственного интеграла на компьютере. Указание: использовать один из методов, рассмотренных на лекции или семинаре.

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx$$

Решение. Интеграл является несобственным, так как $\lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\ln x}{1+x^2} = -\infty$. Заметим, что для любого $\alpha > 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0+0} x^\alpha \ln x = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{\ln x}{x^{-\alpha}} \stackrel{\text{Лопит.}}{=} \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{x^{-1}}{-\alpha x^{-\alpha-1}} = 0.$$

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx = \int_0^1 \frac{(1+x^2-x^2) \ln x}{1+x^2} dx = \int_0^1 \ln x dx - \int_0^1 \frac{x^2 \ln x}{1+x^2} dx$$

Первый интеграл вычисляется явно

$$\int_0^1 \ln x dx = x \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 x \frac{1}{x} dx = -1.$$

Второй интеграл уже не является несобственным, следовательно, для его вычисления применима, например, составная формула Симпсона.

12. Для заданной матрицы вычислить подчинённую норму матрицы для следующих векторных норм:

$$\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_i |x_i|, \|\mathbf{x}\|_2 = \sqrt{\sum_i x_i^2}.$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & -3 & 4 \\ 1 & 9 & 7 \end{pmatrix}$$

Решение.

$$\|A\|_1 = \max_j \left(\sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right) =$$

$$= \max(|-1| + |3| + |1|, |3| + |-3| + |9|, |2| + |4| + |7|) = 15.$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\max_i \lambda_i(A^\top A)}. \text{ Найдём матрицу}$$

$$B = A^\top A = \begin{pmatrix} 11 & -3 & 17 \\ -3 & 99 & 57 \\ 17 & 57 & 69 \end{pmatrix}$$

И её собственные значения

$$|B - \lambda E| = \begin{vmatrix} 11 - \lambda & -3 & 17 \\ -3 & 99 - \lambda & 57 \\ 17 & 57 & 69 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 179\lambda^2 - 5132\lambda + 4356.$$

Из уравнения $|B - \lambda E| = 0$ получаем $\lambda_1 \approx 143,43$, $\lambda_2 \approx 34,69$ и $\lambda_3 \approx 0,88$. Выбираем максимальное с.з. λ_1 и получаем $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_1} \approx 11,96$.

13. Правая часть СЛАУ $A\mathbf{x} = \mathbf{f}$ содержит погрешность, норма которой равна $\|\delta\mathbf{f}\|_\infty$. Оценить относительную погрешность нормы решения $\frac{\|\delta\mathbf{x}\|_\infty}{\|\mathbf{x}\|_\infty}$. Указание: воспользоваться оценкой $\frac{\|\delta\mathbf{x}\|_\infty}{\|\mathbf{x}\|_\infty} \leq \mu(A) \frac{\|\delta\mathbf{f}\|_\infty}{\|\mathbf{f}\|_\infty}$.

$$A = \begin{pmatrix} -7 & -3 & -8 \\ 6 & -6 & -8 \\ -5 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} -7,1 \\ 7,2 \\ 6,7 \end{pmatrix}, \quad \|\delta\mathbf{f}\|_\infty = 0,6$$

Решение.

$$\|f\|_\infty = \max\{|-7,1|; |7,2|; |6,7|\} = 7,2.$$

$$\|A\|_\infty = \max\{|-7| + |-3| + |-8|; |6| + |-6| + |-8|; |-5| + |1| + |-3|\} = 20.$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -0.1585 & 0.1037 & 0.1463 \\ -0.3537 & 0.1159 & 0.6341 \\ 0.1463 & -0.1341 & -0.3659 \end{pmatrix}$$

$$\|A^{-1}\|_\infty = \max\{|-0.1585| + |0.1037| + |0.1463|; |-0.3537| + |0.1159| + |0.6341|; |0.1463| + |-0.1341| + |-0.3659|\} = 1,1037.$$

$$\frac{\|\delta\mathbf{x}\|_\infty}{\|\mathbf{x}\|_\infty} \leq \mu(A) \frac{\|\delta\mathbf{f}\|_\infty}{\|\mathbf{f}\|_\infty} = \|A\|_\infty \|A^{-1}\|_\infty \frac{\|\delta\mathbf{f}\|_\infty}{\|\mathbf{f}\|_\infty} \approx 20 \cdot 1,1037 \cdot \frac{0,6}{7,2} \approx 1,84.$$

14. Для задачи построить разностную схему с заданным порядком аппроксимации.

$$\begin{cases} u''(x) + u(x) = \cos x + 1, \\ u(1) = 2, \quad u'(3) - 3u(3) = 1, \end{cases} \quad \text{желаемый порядок аппроксимации } p = 2.$$

Решение. Как видно из граничных условий, решение ищется на отрезке $[1, 3]$. Разобьём этот отрезок на n равных частей. Длина каждого частичного отрезка равна $h = (3 - 1)/n$. Введём в рассмотрение сетку $\omega = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, где $x_0 = 1, x_1 = 1 + h, x_2 = 2 + 2h, \dots, x_{n-1} = 3 - h, x_n = 3$. Рассмотрим также сеточную функцию $y_i = y(x_i)$, определённую только в узловых точках $x_i, i = 0, 1, \dots, n$.

Требуется построить систему линейных уравнений с неизвестными y_i , где $y_i \approx u(x_i)$. Совокупность таких y_i будет численным решением краевой задачи.

Погрешность аппроксимации должна по условию задачи иметь порядок 2 (т.е., например, уменьшение шага h вдвое должно уменьшать погрешность решения $|y_i - u(x_i)|$ в четыре раза).

Заменим в уравнении производную разделённой разностью (см. лекцию 5) $u''(x_i) \approx \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2}$. Исходное дифференциальное уравнение перейдёт в разностное

$$u''(x) + u(x) = \cos x + 1 \rightarrow \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} + y_i = \cos x_i + 1.$$

Убедимся, что получен второй порядок аппроксимации. В разностное уравнение вместо сеточной функции подставим точное решение, т.е. заменим y_i на $u_i = u(x_i)$. Кроме этого разложим $u_{i\pm 1}$ в ряд Тейлора в окрестности точки x_i

$$u_{i\pm 1} = u_i \pm hu'_i + \frac{h^2}{2}u''_i \pm \frac{h^3}{3!}u'''_i + \frac{h^4}{4!}u^{IV}(\xi^\pm), \quad \xi^- \in [x_{i-1}, x_i], \xi^+ \in [x_i, x_{i+1}].$$

После сокращения имеем

$$u''_i - \frac{h^2}{12}[u^{IV}(\xi^-) + u^{IV}(\xi^+)] + u_i = \cos x_i + 1.$$

Вычитая из последнего равенства исходное дифференциальное уравнение, получаем невязку $\psi_n^{(1)} = -\frac{h^2}{12}[u^{IV}(\xi^-) + u^{IV}(\xi^+)] = -\frac{h^2}{6}u^{IV}(\eta) = O(h^2)$, где $\eta \in [\xi^-, \xi^+]$. Получен требуемый порядок аппроксимации.

Очевидно, замена граничного условия $u(1) = 2$ на $y_0 = 2$ не имеет погрешности аппроксимации.

В правом граничном условии нельзя заменить $u'(3)$ левой разделённой разностью, так как $u'(3) = \frac{y_n - y_{n-1}}{h} + O(h^1)$. Выделим в $O(h^1)$ главный член. Из формулы Тейлора в окрестности $x_n = 3$ имеем

$$u(3-h) = u(3) - hu'(3) + \frac{h^2}{2}u''(3) + O(h^3),$$

откуда

$$u'(3) = \frac{u(3) - u(3-h)}{h} + \frac{h}{2}u''(3) + O(h^2).$$

Из исходного уравнения следует, что $u''(3) + u(3) = \cos(3) + 1$. Таким образом,

$$\frac{u(3) - u(3-h)}{h} + \frac{h}{2}[\cos(3) + 1 - u(3)] + O(h^2) - 3u(3) = 1.$$

Невязка для правого граничного условия равна $O(h^2)$, что даёт второй порядок аппроксимации.

Окончательный ответ — это система из $n+1$ линейного уравнения с неизвестными y_0, y_1, \dots, y_n

$$\begin{cases} \frac{y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1}}{h^2} + y_i = \cos x_i + 1, \text{ где } i = 1, 2, \dots, n-1 \text{ и } x_i = 1 + ih, \\ y_0 = 2, \\ \frac{y_n - y_{n-1}}{h} + \frac{h}{2}[\cos(3) + 1 - y_n] - 3y_n = 1. \end{cases}$$

15. Для решения (начальной или краевой) задачи, где $x \in [0, 2]$, предложена разностная схема. Определить, аппроксимирует ли разностная схема задачу. Если аппроксимация имеет место, найти её порядок. Указание: использовать разложение в ряд Тейлора.

$$\begin{cases} u' + u = x \\ u'(0) = 1, u(2) = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + y_i = ih \\ \frac{y_2 - y_0}{2h} = 1, y_n = 0 \text{ (где } x_n = 2) \end{cases}$$

Решение. Рассмотрим разностное уравнение

$$\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} + y_i = ih.$$

Раскладывая u_{i+1} в окрестности u_i и подставляя в последнее уравнение, а затем вычитая исходное уравнение, получим невязку $\psi_1 = O(h^1)$.

Рассмотрим первое краевое условие в разностном виде

$$\frac{y_2 - y_0}{2h} = 1$$

Раскладывая u_2 в окрестности u_0 и подставляя в последнее уравнение, а затем вычитая исходное краевое условие, получим невязку $\psi_2 = O(h^1)$.

Рассмотрим второе краевое условие в разностном виде

$$y_n = 0.$$

В этом случае невязка ψ_3 равна нулю.

Так как $\lim_{h \rightarrow 0} \max\{|\psi_1|, |\psi_2|, |\psi_3|\} = 0$, то аппроксимация имеет место. Порядок аппроксимации равен $\max\{1, 1\} = 1$.

16. Проверить выполнимость достаточных условий применимости метода прогонки для решения СЛАУ $A\mathbf{x} = \mathbf{f}$. Если эти условия выполняются, решить систему методом прогонки (вычислять можно на компьютере, но в решении указать значения всех прогоночных коэффициентов α_i, β_i).

$$A = \begin{pmatrix} -11 & -7 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 10 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -10 & 20 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 18 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & -13 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ -9 \end{pmatrix}$$

Решение. Преобразуем первое и последнее уравнения системы, чтобы она приобрела вид:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} -1 & \kappa_1 & & & 0 \\ a_1 & -c_1 & b_1 & & \\ & a_2 & -c_2 & b_2 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & a_{n-1} & -c_{n-1} & b_{n-1} \\ 0 & & & & \kappa_2 & -1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{pmatrix}}_y = \underbrace{\begin{pmatrix} -\mu_1 \\ -f_1 \\ -f_2 \\ \vdots \\ -f_{n-1} \\ -\mu_2 \end{pmatrix}}_f$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -0,64 & 0 & 0 & 0 \\ 7 & 10 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -10 & 20 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & 18 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0,46 & -1 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} -0,09 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ -0,69 \end{pmatrix}$$

Проверим условия применимости метода прогонки:

$$a_j \neq 0, \quad b_j \neq 0,$$

$$|c_j| \geq |a_j| + |b_j|, \quad j = 1, 2, \dots, n-1 \quad (\text{диагональное преобладание}),$$

$$|\kappa_1| \leq 1, \quad |\kappa_2| < 1.$$

$$|10| \geq |7| + |-1|, \quad |20| \geq |-10| + |6|, \quad |18| \geq |10| + |-7|,$$

$$|-0,64| \leq 1, \quad |0,46| < 1.$$

Следовательно, метод прогонки применим.

Далее воспользуемся формулами

$$\alpha_1 = \kappa_1, \quad \beta_1 = \mu_1.$$

$$\alpha_{j+1} = \frac{b_j}{c_j - \alpha_j a_j}, \quad \beta_{j+1} = \frac{a_j \beta_j + f_j}{c_j - \alpha_j a_j}, \quad j = 1, 2, \dots, n-1.$$

$$y_n = (\kappa_2 \beta_n + \mu_2) / (1 - \kappa_2 \alpha_n)$$

$$y_j = \alpha_{j+1} y_{j+1} + \beta_{j+1}, \quad j = n-1, n-2, \dots, 0,$$