

RUTOLAZA

Nº30 örtüklü tablet

Gastroenterologiya



Dermatologiya



Revmatologiya



Pulmonologiya



Kardiologiya



Cərrahiyyə



Endokrinologiya



Nefrologiya



R
U
T
O
L
A
Z
A

Onkologiya



Urologiya



Ginekologiya



Travmatologiya



Nevrologiya



Pediatrica



Oftalmologiya



Angiologiya



HƏR QIDA QƏBULU ZAMANI



Buraxılış forması: Nº30 örtüklü tablet
İstehsalçı: Tocura İlaç Sanayi və Ticarət A.Ş. Türkiyə



ETİBARLI SEÇİM

RUTOLAZA

Nº30 örtüklü tablet

TƏRKİBİ:

- Pankreatin (Pancreatin)....340 FIP U(155 mq)
- Lipaza (Lipase).....34 FIP U (10mq)
- Papain (Papain).....90 FIP U (15 mq)
- Amilaza (Amylase).....50 FIP U (10mq)
- Bromelain (Bromelain).....225 FIP U(45mq)
- Ximotripsin (Chymotripsin).....300 FIP U(0,75mq)
- Tripsin (Trypsin).....360 FIP U (12 mq)
- Rutin (Rutoside).....50 mq

Rutolaza: iltihab və ödeməleyhinə, fibrinolitik, lipolitik, immunmodulyator, hipolipidemik, antiaqreqant, fermentativ təsirə malik kombinə olunmuş preparatdır.

Pankreatin, Amilaz, Lipaza: heyvan mənşəli həzm fermentidir karbohidratların, yağların və zülalların parçalanmasında iştirak edərək onların nazik bağırsaqda tam sorulmasını təmin edir. Bu fermentlər mədəaltı vəzinin xəstəlikləri zamanı onun xarici sekresiya funksiyasının çatışmazlığını kompensasiya edərək həzm prosesini yaxşılaşdırır.

Amilaza: mürəkkəb karbohidratları, nişastanı sadə karbohidratlara-oligosaxaridlərə (dekstrinlərə və monosaxaridlərə) qədər parçalamaq xüsusiyyətinə malikdir.

Lipaza: Yağ molekullarını hidroliz edərək triqliseridlərə, qliserinə və yağ turşularına parçalamaqla, yağların həzm prosesində vacib rol oynayır, eyni zamanda yağda həll olan A, D, E, K vitaminlərinin mənimsənilməsində iştirak edir.

Papain: proteolitik aktivliyə malik bitki mənşəli fermentdir-zülalların parçalanmasında iştirak edir.

Bromelain: bitki mənşəli proteolitik fermentdir-zülal və yağların parçalanmasında iştirak edir. Bağırsağın funksional aktivliyini artırır, mübadilə məhsullarını və toksik maddələri orqanizmdən xaric edir.

Tripsin və Ximotripsin: Proteolitik aktivliyə malik enzimdir. Zülalları və peptidləri parçalayır. İltihab və ödem əleyhinə təsir göstərir, nekroza çevrilən toxumaları seçici parçalama xüsusiyyətlərinə malikdir. Yaraların, yanıqların, trombozların kompleks müalicəsində istifadə olunur.

Rutin: (Rutoside) Antioksidant xüsusiyyətə malikdir.

Rutolaza örtüklü tablet olduğuna görə tərkibindəki fermentlər nazik bağırsağın qələvi mühitində azad olur. Fermentativ aktivlik 30-40 dəqiqə ərzində qeyd olunur.

İstifadəsinə göstərişlər:

Qastroenterologiya:

Mədəaltı vəzinin xarici sekretor funksiyasının pozulması ilə müşayiət olunan patoloji halları: xroniki pankreatit, mukovidoz, xoralı kolit zamanı həzm yaxşılaşdırılması məqsədilə, hepatit, pankreatektomiya, qastroektomiyadan (mədənin tam və hissəvi rezeksiyası) sonrakı vəziyyət, mədəaltı vəzin xərcəngi, qarın boşluğu orqanlarının instrumental müayinəsinə hazırlıq mərhələsi.

Dermatologiya: atopik dermatit, çivə

Revmatologiya: birləşdirici toxumanın diffuz xəstəliyi, revmtoid artrit, reaktiv artrit, ankilozlaşdırıcı spondilit, osteoarroz və s.

Pulmonologiya: sinusit, bronxit, pnevmoniya

Kardiologiya: stenokardiya, miokard infarktlarının subkəskin fazası (qanın realoji xassələrini yaxşılaşdırmaq üçün)

Cərrahiyyə: əməliyyat sonrası ağırlaşmaların (iltihab, tromboz, ödem) profilaktikası və müalicəsi, posttravmatik və limfatik ödem, plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə

Endokrinologiya: diabetik angiopatiya, diabetik retinopatiya, autoimmun tireoidit

Nefrologiya: pielonefrit, qlomerulonefrit

Onkologiya: Rutolazanın qəbulu onkoloji xəstələrdə kimyəvi və ya şüa üsulu ilə aparılan müalicə zamanı, xəstənin həyat-tərzini yaxşılaşdırmaq və infeksiyon ağırlaşmaların profilaktikası üçün məsləhət görülür.

Ginekologiya: urogenital yolların xroniki cinsi infeksiyaları, adneksit, hestozlar, mastopatiyalar, hormonal müalicə ilə bağlı meydana çıxan əlavə təsirlərin intensivliyini azaltmaq məqsədilə

Urologiya: sistit, sistopielit, prostatit, cinsi yolla keçən infeksiyalar.

Travmatologiya: travmalar, sınıqlar, distorsiyalar, əzilmələr, göyərmələr xroniki posttravmatik proseslər, yumşaq toxumaların iltihabı, bag aparatının zədələnməsi, idman zamanı rast gəlinən travmalar.

Nevrologiya: dağınıq skleroz, osteoxondroz.

Angiologiya: tromboflebit, posttromboflebit xəstəliyinin müalicəsi və residiv flebitin, endarteritin, aşağı ətrafların obliterasiyaedici aterosklerozunun, limfoödemnin profilaktikası.

Profilaktika: mikrosirkulyasiyanın pozulmaları, post-stress pozğunluqlar. Hormonəvəzedici müalicə və hormonal kontrasepsiya zamanı meydana çıxan əlavə təsirlərin profilaktikası. Cərrahi müalicə zamanı meydana çıxan iltihabi ağırlaşmaların və fibrinoz membranların profilaktikası. Virus mənşəli infeksiyaların və onların ağırlaşmalarının profilaktikası.

İstifadə qaydası və dozası:

Xəstəliyin aktivliyindən və ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq, 1 tablet hər qida qəbulu zamanı (gündə 3 dəfə) daxilə qəbul edilir.

Müalicə müddəti: Xəstənin vəziyyətindən asılı olaraq bir neçə gündən bir neçə aya qədər davam edə bilər.