


AMINARTIN  
AMINARTIN  
AMINARTIN  
AMINARTIN

300 ml

Daxilə qəbul üçün məhlul



**Etibarlı müdafiə**



**AMINARTIN**

300 ml

Daxilə qəbul üçün məhlul

Hər 10 ml şərbətin tərkibi

L-Ornitin L-aspartat (LOLA) - 400 mq

Silymarin (silybium marianum seed ekstrakt) - 100 mq

#### Farmakoloji xüsusiyyətləri:

- Qaraciyər xəstəlikləri zamanı orqanizmdə ammonyakın səviyyəsini aşağı salmaqla detoksikasion təsir göstərir, prolin və poliaminlərin sintezində vacib rol oynayır
- Lipidlərin peroksidləşməsinin qarşısını alır, qaraciyər mikrosirkulyasiyasını yaxşılaşdırır. İltihab əleyhinə və antioksidant təsirlərə malikdir
- Qaraciyərin regenerasiyasını stimule edir və onu sərbəst radikalların təsirindən qoruyur
- Sirrozlu pasiyentlərdə qaraciyər ensefalopatiyasının inkişafını ləngidir, psixomotor funksiyalara müsbət təsir göstərir, həyat keyfiyyətini, psixi statusu, diqqət konsentrasiyasını və yuxunu yaxşılaşdırır, yorğunluq hissini azaldır
- İnsulin və somatotrop hormonun istehsalını stimule edir. Parenteral qidalanma zamanı zülal mübadiləsini yaxşılaşdırır. Astenik, dispeptik və ağrı sindromlarını azaldır, həmçinin, yüksəlmiş bədən kütləsini (steatoz və steatohepatit zamanı) azaldır

#### İstifadəsinə göstərişlər:

- Müxtəlif mənşəli hepatitlər (toksik, alkoqol, virus və dərman mənşəli)
- Presirrotik vəziyyətlər, qaraciyər sirrozu və fibrozu
- Qaraciyər ensefalopatiyası (latent və ya aşkar)
- Qaraciyərin piy distrofiyası, steatohepatit
- Dərman preparatlarının (antibiotik, vərəm, qıcolma, virus əleyhinə, sitostatik, trisiklik antidepressant və peroral kontraseptiv preparatların qəbulundan sonra yaranan) zədələyici təsirini azaltmaq məqsədilə
- Kimyaterapiya və şüa terapiyasının zədələyici təsirini azaltmaq məqsədilə
- Xroniki intoksikasiyalar (hepatotoksik maddələr, nitrat birləşmələri, alkaloidlər, ağır metal duzları, üzvi mənşəli həlledicilər, hallogen və s.)
- Alkoqolizm və alkoqol qəbulu zamanı qaraciyər zədələnmələri
- Qaraciyərin işemik zədələnməsi
- Müxtəlif somatik xəstəliklər zamanı qaraciyərin funksiyasının pozulması

#### İstifadə qaydası və dozası

**Böyüklər: 10 ml gündə 2 dəfə**

Günlük doza vəziyyətdən asılı olaraq artırıla bilər.  
Yeməkdən sonra qəbul edilir.

**Əks göstərişlər:** Məhsulun tərkibində olan hər hansı bir komponentə qarşı həssaslıq.

**Buraxılış forması:** Daxilə qəbul üçün məhlul 300 ml.  
15 ml ö.st.ile

**İstehsalçı:** Tocura İlaç Sənaye və Ticarət A.Ş. Türkiyə

