

# AMINARTIN

Hər 10 ml şərbətin tərkibi  
L-Ornitin L-aspartat (LOLA) - 400mq  
Silymarin (silybim marianum seed ekstrakt) - 100 mq



**İstifadə qaydası və dozası**  
**Böyüklər: 10 ml gündə 2 dəfə**  
Günlük doza vəziyyətdən asılı olaraq artırıla bilər.  
Yeməkdən sonra qəbul edilir.

**300 ml**  
Daxilə qəbul üçün məhlul




# LACTORAM

Symbiotik-GG 20 CAPSULES

Lactobacillus rhamnosus GG	6 milyard
Lactobacillus reuteri	6 milyard
Saccharomyces boulardii	2,5 milyard
Bifidobacterium bifidum	0,25 milyard
Lactobacillus acidophilus	0,3 milyard
Inulin	50 mq

**1 kapsul x 1 dəfə**  
**200 ml su ilə**  
**yemək zamanı qəbul edilir**





**01**  
**telefon**  
**070 217 45 67**

# IMPROL

15 ml-de D<sub>3</sub> (Cholecalciferol) 50000 BV

**İstifadə qaydası və dozası:**  
**Uşaqlarda:**  
**Profilaktik məqsədlə:** 0-1 yaşlı uşaqlara 3 damcı gündə 1 dəfə  
1-4 yaşlı uşaqlara 4-6 damcı gündə 1 dəfə  
**Müalicəvi məqsədlə:** D vitamini çatışmazlığının ağırliq dərəcəsinə asılı olaraq 8-36 damcı gündə 1 dəfə

**Böyüklerde:**  
**Profilaktik məqsədlə:** 400-1000 BV gündə 1 dəfə  
**Müalicəvi məqsədlə:** D vitamini qanda (<20 nq/ml) - 50000 BV həftədə 1 dəfə (8 həftə)  
D vitamini qanda (20-29 nq/ml) - 50000 BV həftədə 1 dəfə (4 həftə)  
D vitamini qanda (>30 nq/ml) - 6000 -14000 BV həftədə 1 dəfə




# RUTOLAZA

Örtüklü tablet N30

**İstifadə qaydası və dozası:**  
Tabletlər yeməkdən 30-40 dəqiqə əvvəl və ya yeməkdən 2 saat sonra qəbul edilir.  
**Böyüklər:** Xəstəliyin aktivliyindən və ağırliq dərəcəsinə asılı olaraq, gündə 3 dəfə 3 tabletdən 10 tabletdən qədər qəbul etmək lazımdır.  
**Uşaqlar:** 5-12 yaşlı uşaqlar üçün bədən kütləsinin hər 6 kq-na gündə 1 örtüklü tablet, 12 yaşdan yuxarı uşaqlara, böyüklerde olduğu kimi verilir. Doza və müalicə müddəti xəstəliyin ağırliq dərəcəsinə asılı olaraq, həkimlər tərəfindən müəyyən edilir.


