







Preparat	Tərkib	Farmakoloji xüsusiyyətlər	Dozalanma
AMINARTIN  300 ml, daxilə qəbul üçün məhlul	Hər 10 ml şərbətin tərkibi: L-Orniti L-aspartat (LOLA)-400 mq; Silymarin (silybim marianum seed ekstrakt)-100 mq.	Hepatoprotektor	Böyüklər: 10 ml gündə 2 dəfə Günlük doza vəziyyətdən asılı olaraq artırılı və ya azaldıla bilər. Yeməkdən sonra qəbul edilir.
LACTORAM  N20 kapsul	Lactobacillus rhamnosus GG - 6 milyard; Lactobacillus reuteri- 6 milyard; Saccharomyces boulardii- 2,5 milyard; Bifidobacterium bifidum- 0,25 milyard; Lactobasillus acidophilus- 0,3 milyard; İnulin-50 mq.	Symbiotik	1 kapsul x 1 dəfə 200 ml su ilə yemək zamanı qəbul edilir.
IMPROL  15 ml damcı	15 ml-nin tərkibində: Vitamin D ₃ (Cholecalciferol) - 50000 BV (1250 mkq) (1 ml - 25 damcı) 1 damcıda D ₃ vitamini (cholecalciferol)-133,3 BV. Köməkçi maddələr: Zeytun yağı (Olive oil)	D ₃ vitamini çatışmazlığı	Uşaqlarda: Profilaktik məqsədlə: 0-1 yaşlı uşaqlara 3 damcı gündə 1 dəfə; 1-4 yaşlı uşaqlara 4-6 damcı gündə 1 dəfə. Müalicəvi məqsədlə: D vitamini çatışmazlığının ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq 8-36 damcı gündə 1 dəfə. Böyüklərdə: Profilaktik məqsədlə: 400-1000 BV gündə 1 dəfə. Müalicəvi məqsədlə: D vitamini qanda (<20 nq/ml) - 50000 BV həftədə 1 dəfə (8 həftə); D vitamini qanda (20-29 nq/ml) - 50000 BV həftədə 1 dəfə (4 həftə); D vitamini qanda (>30 nq/ml) - 6000 - 14000 BV həftədə 1 dəfə
RUTOLAZA  N30 örtüklü tablet	Pankreatin (Pancreatin)- 340 FIP U (155 mq); Papain (Papain) -90 FIP U (15 mq); Bromelain (Bromelain) -225 FIP U (45mq); Tripsin (Trypsin) -360 FIP U (12 mq); Lipaza (Lipase) -34 FIP U (10mq); Amilaza (Amylase) -50 FIP U (10 mq); Ximotripsin (Chymotripsin)- 300 FIP U (0,75mq); Rutin (Rutoside)-50 mq	İltihab və ödeməleyhinə, fibrinolitik və lipolitik, immunmodulator, fermentativ təsire malikdir	Tabletlər yeməkdən 30-40 dəqiqə əvvəl və ya yeməkdən 2 saat sonra qəbul edilir. Uşaqlar: 5-12 yaşlı uşaqlar üçün bədən kütləsinin hər 6 kq-na gündə 1 örtüklü tablet, 12 yaşdan yuxarı uşaqlara, böyüklərdə olduğu kimi verilir. Doza və müalicə müddəti xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq, həkimlər tərəfindən müəyyən edilir. Böyüklər: Xəstəliyin aktivliyindən və ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq, gündə 3 dəfə 3 tabletdən 10 tabletdə qədər qəbul etmək lazımdır.