

# Математический анализ

Коченюк Анатолий

27 сентября 2020 г.



# Оглавление

---

## 0.1 Введение

Семёнова Ольга Львовна

o\_semenova@mail.ru

Литература:

1. Виноградов О.Л. Курс Математического анализа
2. Виноградов, Громов –||–
3. Фихтенгольц (курс)
4. Зорич (курс, двухтомник)
5. Кудрявцев (сборник задач, 1 том из трёх)
6. Виноградова, Олехник, Саровничий (1 том из двух)

## 0.2 Баллы

практика – 70/100

теория – 30/100 – 2-4 теста по теории (3 балла за присутствие на ~всех лекциях)

Если меньше 18/30 баллов, то всю теорию нужно будет пересдавать. Иначе можно воспользоваться этим как баллами за экзамен.

# Глава 1

## Множества, отображения, $\mathbb{R}$

### 1.1 Множества

”Множество” – неопределяемое слово. Синонимы: набор, совокупность, класс

Множество состоит из элементов.  $M = \{1, 3, 7, 9\}, \mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}, \mathbb{R}, \mathbb{R}_+$

способы описания:

- явное описание  $\{1, 2, 3\}$
- через некоторое свойство  $M = \{x : P(x)\}$  : – читается как ”таких что”. Тот же смысл имеет  $\{x : P(x)\}$ .  $P(x)$  обозначает какое-то свойство.  $M = \{x : xx - \text{человек и } x \text{ 2002 г.р.}\}$

Кванторы:

- $\forall$  – ”для любого”, любой, каждый, всякий ...
- $\exists$  – ”существует”

Пример:  $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \dots$

Для любого положительного эpsilon существует положительное число дельта, т.ч. ... Обозначения:

- $\iff$  – равносильно
- $\wedge$  – ”и”
- $\vee$  – ”или”
- $\square$  пусть
- $\triangleleft$  – допустим, рассмотрим

---

**Замечание.** Множество всех множеств не существует

$\neg$  – отрицания

$\neg\exists$  – не существует

$\emptyset$  – пустое множество

$x \in M \iff x$  – элемент множества  $M$

$A \subseteq B \iff (x \in A \implies x \in B)$

$B \supseteq A$  – то же самое

$\forall$  множества  $M \quad \emptyset \subseteq M$

$A = B \iff (x \in A \iff x \in B) \iff \begin{cases} A \subseteq B \\ B \subseteq A \end{cases}$

$A, B$  – множества

$A \cup B = \{x : (x \in A \vee x \in B)\}$

$A \cap B = \{x : (x \in A \wedge x \in B)\}$

$x \in A \cap B \iff \begin{cases} x \in A \\ x \in B \end{cases}$

$A \setminus B = \{x : x \in A, x \notin B\}$

$A \subset C$

$A^c = X \setminus A$  – дополнение  $A$  в  $X$

**Определение 1.**  $A, X_\alpha$  – множества,  $\forall \alpha \in A$

$\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$  – семейство множеств

$A$  – индексное множество

$\bigcup_{\alpha \in A} X_\alpha = \{x : \exists \alpha \in A \quad x \in X_\alpha\}$

$\bigcap_{\alpha \in A} X_\alpha = \{x : \forall \alpha \in A \quad x \in X_\alpha\}$

**Пример.**  $\{(x-1, x+1)\}_{x \in (0;1)}$

$\bigcup_{x \in (0;1)} (x-1, x+1) = (-1, 2), \quad \bigcap_{x \in (0;1)} (x-1, x+1) = (0; 1)$

---

**Определение 2** (Формула Де Моргана).  $A, B \subseteq X$

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

$\{A_i\}$  – семейство

$$\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c$$

$$\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcup_{i \in I} A_i^c$$

**Замечание.**  $A^{cc} = A$  – проверить-упражнение

*Доказательство.*  $x \in \left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c \iff x \notin \left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) \iff \forall i \in I, x \notin A_i \iff$   
 $\forall i \in I, x \in A_i^c \iff x \in \bigcap_{i \in I} A_i^c$

$$(\bigcap A_i)^c = (\bigcap A_i^{cc})^c = (\bigcup A_i^c)^{cc} = \bigcup A_i \quad \blacksquare$$

**Определение 3** (упорядоченная пара).  $A, B$

$(a, b)$  – упорядоченная пара,  $a \in A, b \in B$ . В этой паре важен порядок

$\{a, b\}$  – неупорядоченная пара (двухэлементное множество), если  $a \neq b$

$a, a = a$  (в множестве не различаются копии)

Пример: координаты точек плоскости.

$X_1, \dots, X_m \quad x_1 \in X_1 \dots x_m \in X_m \quad (x_1, \dots, x_m)$  – упорядоченная пара

**Определение 4** (Декартово произведение).  $X_1 \times \dots \times X_m = \{(x_1, \dots, x_m) : x_k \in X_k \quad k = 1 : m\}$

$$R^m = (R)^m$$

**Пример.**  $X = \{1, 2\}$

$$Y = \{3, 5\}$$

$$Z = \{0\}$$

$$X \times Y \times Z = \{(1, 3, 0), (2, 3, 0), (2, 3, 0), (2, 5, 0)\}$$

---

## 1.2 Отображения

формальное определение, которое не будет использовано или потребовано нигде (в том числе на экзамене)

**Определение 5.**  $X, Y$  – множества

если  $R \subset X \times Y$  и  $(x, y_1) \in R \vee (x, y_2) \in R \iff y_1 = y_2$

$R$  называется отображением или графиком

**Определение 6.** Отображение – это тройка  $(X, Y, f)$ , где  $X, Y$  – множества, а  $f$  – некое правило по которому каждому элементу  $x \in X$  сопоставляется некоторый единственный элемент  $y \in Y$

$f : X \rightarrow Y$  – синоним. читают ” $f$  действует из  $X$  в  $Y$ ”

$X$  – множество определения отображения

$Y$  – множество значений

$\{y \in Y : \exists x \in X f(x) = y\} \subset Y$  (т.е.  $Y$  – необязательно точное множество значений)

**Пример.**  $x \in \mathbb{R}, Y = \mathbb{R} \quad x \mapsto x^2$

если  $y = f(x)$ , то  $y$  называется образом элемента  $x$  при отображении  $f$

$A \subseteq X \quad f(A) = \{f(x) : x \in A\}$  – образ множества  $A$  под действием  $f$

$B \subseteq Y \quad f^{-1}(B) = \{x : f(x) \in B\}$

$f^{-1}(\{y\})$  – необязательно одноэлементное.

упражнения:

1.  $f(A \cup B), f(A) \cup f(B)$

2.  $f(A \cap B), f(A) \cap f(B) \quad y \in f(A \cap B) \implies \exists x \in A \cap B : f(x) = y. x \in A, x \in B, y \in f(A), y \in f(B) \implies y \in f(A) \cap f(B)$

$f(x) = \text{const} \quad f(A) \cap f(B) \neq \emptyset, f(A \cap B) = \emptyset$ , если  $A \cap B = \emptyset$

3.  $f^{-1}(A \cup B), f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$

4.  $f(A \cap B), f(A) \cap f(B)$



---

**Определение 7.** Если  $f : X \rightarrow Y, g : X_1 \rightarrow Y \quad X_1 \subseteq X$   
и  $\forall x \in X_1 \quad g(x) = f(x)$ , то  $g$  называется сужением  $f$  на  $X_1$   
Обозначение:  $g = f|_{X_1}$   
При этом  $f$  называется продолжением  $g$  с  $X_1$  на  $X$





Рис. 1.1: sinus

**Пример.**  $f(x) = \sin x \quad f|_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$

**Определение 8.** Если  $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$   
 $g \circ f : X \rightarrow Z$   
 $g \circ f(x) = g(f(x)) \forall x \in X$   
 $g \circ f$  называется композицией  $f$  и  $g$

**Пример.** Изобразить эскизы графиков функций для всех случаев

1.  $f(x) = \sin x, g(x) = x^2$
2.  $f(x) = x^2, g(x) = \sin x$
3.  $f(x) = g(x)$



построить  $f^{(2)}, f^{(3)}, f^{(4)}$  без формул

**Определение 9.** Пусть  $f : X \rightarrow Y$ ,  $f$  называется инъекцией, если

$$\begin{cases} f(x_1) = y \\ f(x_2) = y \end{cases} \implies x_1 = x_2$$

**Пример.**  $f(x) = kx + b$  – инъекция,  $k \neq 0$

$f(x) = \sin x$  – не инъекция

$f(x) \mid_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]}$  – инъекция

**Определение 10.**  $f : X \rightarrow Y$ ,  $f$  называется сюръекцией, если  $\forall y \in Y \quad \exists x \in X : f(x) = y$

**Пример.**  $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  – не сюръекция

$\sin : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$  – сюръекция

$y = kx + b, k \neq 0$  – сюръекцией

**Определение 11** (биективность).  $f : X \rightarrow Y$  – инъекция и сюръекция  $\implies f$  называется биекцией

**Пример.**  $y = kx + b, k \neq 0$  – биекция

**Определение 12.**  $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow X$   
 $g$  называется обратным к  $f$  отображением, если  $f(x) = y \iff x = g(y)$   
 Обозначается:  $g = f^{-1}$

**Замечание.** Обратимая функция должна быть биективной:

Инъективной – обратная иначе не будет функцией

---

Сюръективной – обратная не будет определена на всём  $Y$

**Замечание.**  $f^{-1}(A)$  – обычно прообраз  $A$  под действием  $f$ , а не образ обратной функции (которая может не существовать)

**Пример.**  $\arcsin = (\sin_{[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]})^{-1}$

$$\log_a(x) = (a^x)^{-1}$$

$$\sqrt{x} = (x^2 \mid_{[0, +\infty)}), \sqrt[3]{x} = (x^3)^{-1}$$

## 1.3 Вещественные числа

### 1.3.1 Аксиоматическое определение вещественных чисел

$(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$  – множество и две операции, и отношение порядка, удовлетворяющее следующим 16 аксиомам:

Аксиомы поля:

1.  $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a + b = b + a$  (коммутативность сложения)
2.  $\forall a, b, c \in \mathbb{R} \quad (a + b) + c = a + (b + c)$  (ассоциативность сложения)
3.  $\exists$  нейтральный элемент 0 по сложению  $\forall a \in \mathbb{R} \quad a + 0 = a$  (существование нейтрального элемента по сложению)
4. Существует обратный элемент по сложению.  $\forall a \in \mathbb{R} \exists (-a) \in \mathbb{R} : \quad a + (-a) = 0$
5.  $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a \cdot b = b \cdot a$  (коммутативность умножения)
6.  $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$  (ассоциативность умножения)
7.  $\exists 1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \forall a \in \mathbb{R} \quad a \cdot 1 = a$
8.  $\forall a \neq 0 \exists a^{-1} \in \mathbb{R} : a \cdot a^{-1} = 1$
9.  $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$  (дистрибутивность)

примеры:  $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}, \{0, 1\}$  ( $1 + 1 = 0$ , остальное как обычно)

Элементарные следствия:

- $\forall a \in K$  – поля, обратный по сложению единственный. Если  $b, b'$  – два обратных.  $b = b + (a + b') = (b + a) + b' = b'$
- обратный по умножению, нейтральные – все единственны

Аксиомы порядка:

1.  $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad a \leq b \vee b \leq a$

---


$$2. a \leq b, b \leq c \implies a \leq c \text{ (транзитивность)}$$

$$3. a \leq b, b \leq a \implies a = b$$

$$4. a \leq b, c \in \mathbb{R} \implies a + c \leq b + c$$

$$5. a \geq 0, b \geq 0, \text{ то } a \cdot b \geq 0$$

$$0 \cdot x + x \cdot x = (0 + x) \cdot x = x \cdot x \implies 0 \cdot x = 0$$

Упражнения:

$$1. -x = (-1) \cdot x$$

$$2. (-a)(-b) = a \cdot b$$

$$3. 1 \geq 0$$

**Определение 13.** Индуктивным множеством в упорядоченном поле  $(K, +, \cdot, \leq)$  называется множество  $N$ :

$$1. 1 \in N$$

$$2. \forall x \in N \implies x + 1 \in N$$

$\mathbb{N}$  – наименьшее индуктивное множество.  $\mathbb{N} = \bigcap_{N - \text{индуктивных}, N \subseteq \mathbb{R}} N$

**Замечание.**  $x > b \iff \begin{cases} x \geq b \\ x \neq b \end{cases}$

Аксиома Архимеда:  $\forall x, y \in \mathbb{R} : x > 0, y > 0 \exists n \in \mathbb{N} : nx > y$

Аксиома вложенных промежутков:

$$\forall \{[a_n, b_n]\}_{n \in \mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N} [a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n] \quad \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset$$

В аксиоме о вложенных промежутках предполагается, что  $\forall n \in \mathbb{N}, [a_n, b_n] \neq \emptyset \iff a_n \leq b_n$

$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$  – замкнутый отрезок, промежуток, сегмент, замкнутый промежуток

$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$  – интервал, открытый промежуток

$(a, b], [a, b)$  – полуоткрытый промежуток

$< a, b >$  – некоторый промежуток  $a \leq b, < a, b > \neq \emptyset$

**Замечание** (Расширенная вещественная прямая).  $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$

$$\forall a \in \mathbb{R} \quad a + (+\infty) = (+\infty) + a = +\infty$$

$$a + (-\infty) = (-\infty) + a = -\infty$$

---


$$(+\infty) + (+\infty) = +\infty$$

$$(-\infty) + (-\infty) = -\infty$$

$(+\infty) + (-\infty), (-\infty) + (+\infty)$  – не определены

$\forall a > 0$

- $(+\infty) \cdot a = a \cdot (+\infty) = +\infty$
- $(-\infty) \cdot a = a \cdot (-\infty) = -\infty$
- $\pm\infty \cdot (-1) = \mp\infty$
- $(+\infty) \cdot (+\infty) = (-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$
- $(+\infty) \cdot (-\infty) = (-\infty) \cdot (+\infty) = -\infty$
- $(\pm\infty) \cdot 0, 0 \cdot (\pm\infty)$  – не определены

$\forall a \in \mathbb{R}$

- $+\infty \geq a \geq -\infty$

$$[a, +\infty] = [a, +\infty) \cup \{+\infty\}$$

В “ $+\infty$ ” иногда  $+$  опускают, но подразумевают её, если рассматривается  $\overline{\mathbb{R}}$

## 1.4 Модуль

$$a \in \mathbb{R} \quad |a| = \begin{cases} a & , \text{если } a \geq 0 \\ -a & , \text{если } a < 0 \end{cases}$$

**Свойство 1.**  $b = |a| \iff \begin{cases} b \in \{a, -a\} \\ b \geq 0 \end{cases}$

Элементарные свойства модуля:

1.  $\forall a \in \mathbb{R} \quad |-a| = |a|$
2.  $\forall a \in \mathbb{R} \quad \pm a \leq |a|$
3.  $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad |a \cdot b| = |a| \cdot |b|$
4.  $\forall a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$
5.  $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad ||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$

**Замечание.**  $a - b := a + (-b)$

$$\frac{a}{b} := a \cdot b^{-1}, b \neq 0$$

---

**Замечание.**  $a \leq b \quad \forall c \in \mathbb{R} \quad a + c \leq b + c$

$$a \leq b \quad b \leq c \implies a \leq c$$

$$a \leq b, c \leq d \quad a + c \stackrel{?}{\leq} b + d$$

$$a + c \leq b + c \quad b + c \leq b + d \implies a + c \leq b + d$$

$$\text{Доказательство. } \forall a, b \in \mathbb{R} \quad ||a| - |b|| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$$

$$\pm a \leq |a|, \pm b \leq |b| \quad \pm(a + b) \leq |a| + |b| \text{ (аксиома порядка 4)}$$

$$\implies |a + b| \leq |a| + |b| \implies |a - b| \leq |a| + |-b| = |a| + |b|$$

$$|a| = |a - b + b| \leq |a - b| + |b|$$

$$|a| - |b| \leq |a - b| \quad |b| - |a| \leq |b - a| = |a - b|$$

$$||a| - |b|| = \pm(|a| - |b|) \leq |a - b|$$


■

**Замечание.**  $|+\infty| := +\infty \quad |-\infty| := +\infty$

## 1.5 Комплексные числа

$\mathbb{C}$  – обозначение для множества комплексных чисел

$$\mathbb{C} = \{(x, y) | x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$



Удобно представлять на плоскости.

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) := (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1x_2 - y_1y_2, x_1y_2 + x_2y_1)$$

**Замечание.**  $\mathbb{C}$  – поле

аксиомы для сложения очевидны.

$$0 = (0, 0)$$

$$1 = (1, 0)$$

$$-(x, y) = (-x, -y)$$

$$(x, y) \cdot (1, 0) = (x, y) \forall x, y \in \mathbb{R}$$

$$i = (0, 1)$$

$$i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$$


---

$\mathbb{R} \leftrightarrow \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$  (именно такие пары, потому что так сохраняются операции

$F : \mathbb{R} \rightarrow \{(x, 0)\}$   $F$  сохраняет  $+$  и сохраняет  $\cdot$ .

$$(x_1, 0) + (x_2, 0) = (x_1 + x_2, 0)$$

$$(x_1, 0) \cdot (x_2, 0) = (x_1 x_2, 0)$$



Оси: вещественная( $x$ ) и мнимая( $y$ )

$$(0, y)^2 = (-y^2, 0) \forall y \in \mathbb{R}$$

$(x, y) = x + iy$   $i = (0, 1)$  – мнимая единица. Алгебраическая форма записи комплексных чисел.

$z = x + iy$   $x$  – вещественная часть  $z$ ,  $y$  – мнимая часть  $z$

$Re z = x$ ,  $Im z = y$  иногда встречается  $rp, ip$  – real/imaginary part

**Замечание** (Комплексное сопряжение).  $z = x + iy$   $\bar{z} = x - iy$  – отражённое от оси  $x$ , если смотреть на плоскость.

$$Re z = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad Im z = \frac{z - \bar{z}}{2i} \text{ – вещественные числа!}$$

**Замечание** (Модуль и аргумент).  $|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$(z \cdot \bar{z} = (x + iy) \cdot (x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 + y^2)$$

$$r = |z|$$

Аргумент – угол (ориентированный) между осью  $Ox$  и  $\vec{Oz}$

Аргументов много  $Arg z, z \neq 0$  – совокупность всех аргументов

Если  $\varphi_0 \in Arg(z)$ , то  $Arg z = \{\varphi_0 + 2\pi \cdot k, k \in \mathbb{Z}\}$

$\begin{cases} \varphi_0 \in Arg z \\ \varphi_0 \in (-\pi, \pi] \end{cases} \implies \varphi_0$  Называется главным значением аргумента  $\varphi_0 = arg(z)$

$z = (x, y) = (r, \varphi)$ ,  $r$  – длина радиус-вектора,  $\varphi$  – аргумент.

$(r, \varphi)$  – полярные координаты, совмещённые с прямоугольными

**Замечание.**  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

$$x = r \cos \varphi$$

---


$$y = r \cos \varphi$$

$$x > 0 \quad \operatorname{arg} z = \operatorname{arctg} \frac{y}{x} = \arcsin \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$y > 0 \quad \operatorname{arg} z = \arccos \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$y < 0 \quad \operatorname{arg} z = -\arccos \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\begin{cases} x < 0 \\ y > 0 \end{cases} \quad \operatorname{arg} z = \operatorname{arctg} \frac{y}{x} + \pi$$

остальное – упражнение

Изобразить кривую заданную в полярных координатах

1.  $r = 3$

2.  $r = \varphi$  – спираль Архимеда

3.  $r = e^\varphi$

4.  $r = \frac{1}{\cos \varphi}$

5.  $r = \frac{2}{\sin \varphi}$

6.  $r = \frac{3}{\cos \varphi + \sin \varphi}$

7.  $r = 1 + \cos \varphi$

$(0, 0)$  – полюс

$r(\varphi) \uparrow$  – удаление от полюса

$z = x + iy = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$  – в скобках точка на единичной окружности с аргументом таким же, что и у  $z$

Это называется тригонометрической формой записи числа.

$$-\frac{1}{2}(\cos \varphi_0, \sin \varphi_0) = \frac{1}{2} \cdot (\cos(\varphi_0 + \pi) + i \sin(\varphi_0 + \pi))$$

$$e^{i\varphi} := \cos \varphi + i \sin \varphi \quad \varphi \in \mathbb{R}$$

$r \cdot e^{i\varphi}$  – экспоненциальная (показательная) форма числа

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} \quad \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$$

Если  $z_1 = r_1 \cdot e^{i\varphi_1}$ ,  $z_2 = r_2 \cdot e^{i\varphi_2}$ , то

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 \cdot e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)} \quad (\text{см. курс алгебра})$$

$n \in \mathbb{N} \quad z^n = r^n \cdot (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$  – формула Муавра



## 1.6 Дополнение к разделу “Действия над множествами”

**Утверждение 1.**  $\square B - \forall$  множество,  $\{A_i\}_{i \in I} - \forall$  семейство множеств

$$B \cap \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) = \bigcup_{i \in I} (B \cap A_i)$$

$$\begin{aligned} \text{Доказательство. } x \in B \cap \left( \bigcup_{i \in I} A_i \right) &\iff \begin{cases} x \in B \\ x \in \bigcup_{i \in I} A_i \end{cases} \iff \begin{cases} x \in B \\ \exists i : x \in A_i \end{cases} \iff \\ \exists i : \begin{cases} x \in B \\ x \in A_i \end{cases} &\iff \exists i : x \in B \cap A_i \iff x \in \bigcup_{i \in I} (B \cap A_i) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

## 1.7 Принцип математической индукции

$P_n$  - утверждение, зависящее от  $n$

$$\text{Если } \begin{cases} P_1 - \text{верно} \\ P_n \rightarrow P_{n+1} \end{cases} \implies \forall n \in \mathbb{N} \quad P_n - \text{верно}$$

$$\{n : P_n - \text{верно}\} - \text{индуктивно} \implies \mathbb{N} \subseteq \{n : P_n - \text{верно}\}$$

Первый шаг (проверка  $P_1$ ) называется базой индукции, а второй – переходом

**Пример.**  $2^n \geq n^2 \quad \forall n \geq 4, n \in \mathbb{N}$

$$P_4 \quad 2^4 \geq 4^2 \quad 16 \geq 16 - \text{верно}$$

$$\square P_n - \text{верно}$$

$$P_{n+1} \quad 2^{n+1} \geq (n+1)^2$$

$$2^{n+1} = 2^n \cdot 2 \geq n^2 \cdot 2 \stackrel{?}{\geq} (n+1)^2 \iff \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \leq 2$$

$$\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \leq 1 + \frac{1}{4}$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \leq \left(1 + \frac{1}{4}\right)^2 = \frac{25}{16} \leq 2$$

---

**Определение 14.**  $\forall n \in \mathbb{N} \quad n! := 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$

$0! := 1$  – соглашение

$(n+k)! = n! \cdot (n+1) \cdot \dots \cdot (n+k)$

$n!! = n \cdot (n-2) \cdot \dots$  (заканчивается либо 1, либо 2)

$n$  – чётно,  $n!! = 2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot n$

$n$  – нечётно,  $n!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot n$

**Определение 15** (биномиальный коэффициент).  $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$  – биномиальный коэффициент, число сочетаний из  $n$  по  $k$

$$\binom{n}{k}$$

Элементарные свойства биномиальных коэффициентов:

1.  $C_n^k = C_n^{n-k}$

2.  $C_n^0 = C_n^n = 1$

3.  $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$

4.  $C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k$

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} = \frac{n!}{k!(n+1-k)!} \cdot (n+1-k+k) = C_{n+1}^k$$

$$1$$

$$1 \quad 1$$

$$1 \quad 2 \quad 1$$

$$1 \quad 3 \quad 3 \quad 1$$

$$1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1$$

**Утверждение 2.**  $\forall a, b \in \mathbb{C} \quad \forall n \in \mathbb{Z}_+ \quad (a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$  – бином Ньютона

**Замечание.**  $\sum_{k=1}^N a_k := a_1 + a_2 + \dots + a_N$

$$\sum_{k=m}^{m+p} a_k := a_m + a_{m+1} + \dots + a_{m+p}$$

$$\prod_{k=m}^{m+p} a_k := a_m \cdot a_{m+1} \cdot \dots \cdot a_{m+p}$$

**Замечание.**  $x^0 := 1 \forall x \in \mathbb{C}$  – определили функцию

*Доказательство бинома по индукции.* База:  $n = 1$   $(a+b)^1 = \sum_{k=0}^1 C_1^k a^k b^{1-k} = C_1^0 a^0 b^1 + C_1^1 a^1 b^0 = a + b$

Переход: Пусть верно для  $n$ . Докажем для  $n + 1$

$$\begin{aligned} (a+b)^{n+1} &= (a+b)^n (a+b) = \left( \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} \right) \cdot (a+b) = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{k+1} b^{n-k} + \\ &+ \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k+1} = \sum_{(j=k+1)}^{n+1} C_n^{j-1} a^j b^{n+1-j} + \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n+1-k} = \sum_{k=j}^{n+1} C_n^{k-1} a^k b^{n+1-k} + \\ &+ \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n+1-k} = C_n^0 a^{n+1} b^0 + \sum_{k=1}^n (C_n^{k-1} a^k b^{n+1-k} + C_n^k a^k b^{n+1-k}) + C_n^n a^0 b^{n+1} = \\ &= C_{n+1}^{n+1} a^{n+1} b^0 + \sum_{k=1}^n C_{n+1}^k a^{n+1} b^{n+1-k} + C_{n+1}^0 a^0 b^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k a^k b^{n+1-k} \end{aligned}$$

$$(a+b)^{n+1} = (a+b)^n (a+b) = \left( \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} \right) \cdot (a+b)$$

что и требовалось доказать ■

## 1.8 Метрические пространства

**Определение 16.**  $\square$   $X$  – любое множество, а  $\rho : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$

Тогда пара  $(X, \rho)$  называется метрическим пространством, если функция  $\rho$  удовлетворяет аксиомам метрики:

1.  $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$  (невыврожденность)
2.  $\rho(x, y) = \rho(y, x)$  (симметричность)
3.  $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) \forall x, y, z \in X$  (неравенство треугольника)

Тогда  $\rho$  называется метрикой или расстоянием на  $X$ .

**Пример.** 1.  $(X, \rho_D)$  – метрическое пространство

$$\rho_D(x, y) = \begin{cases} 0 & , \text{если } x = y \\ 1 & , \text{если } x \neq y \end{cases}$$

2.  $X = \mathbb{R}, \rho(x, y) = |x - y|$

$$x - y = a, y - z = b \quad \rho(x, z) = |a - b| \leq |a| + |b| = \rho(x, y) + \rho(y, z)$$

Обычная или Евклидова метрика

$$\sim 2 \quad X = \mathbb{C} \quad \rho(z, w) = |z - w| \quad (\text{аксиома 3 будет проверена позже})$$

$$\sim 2 \quad X = \mathbb{R}^n, x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \quad \rho(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2}$$

$$v = (v_1, \dots, v_n) \quad \|v\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n v_k^2} \text{ – евклидова норма вектора } v$$

3.  $\sqsupset (X, \rho)$  – метрическое пространство

$$\sqsupset X_1 \subseteq X \quad \rho_1 = \rho|_{X_1 \times X_1}$$

$(X_1, \rho_1)$  – есть метрическое пространство, а  $\rho_1$  называется индуцированной метрикой.

4.  $X$  – множество станций метрополитена г. Санкт-Петербурга. Пусть между соседними станциями расстояние – 2 минуты.  $\rho(u, v) = \min$  длин путей из  $u$  в  $v$

$\rho$  – метрика

**Определение 17.** Открытый шар с центром в точке  $a$  радиусом  $R$  в метрическом пространстве  $(X, \rho)$  :

$$B_R(a) = \{x \in X : \rho(x, a) < R\}$$

$$B_R[a] = \{x \in X : \rho(x, a) \leq R\}$$

**Пример.** 1.  $(0 \vee 1) \quad B_R(a) = \begin{cases} \{a\} & , \text{если } R \leq 1 \\ X & , \text{если } R > 1 \end{cases}$

2.  $(a - R, a + R)$

3. круг (без окружности)

4.  $n$ -мерный шар

$$\text{в } \mathbb{R}^n \quad \|v\|_1 = \sum_{k=1}^n |v_k| \quad \|v\|_\infty = \max_{k=1:n} |v_k|$$

**Определение 18.**  $E \subseteq \mathbb{R}, \begin{cases} M \in E \\ \forall x \in E \quad M \geq x \end{cases} \implies M := \max E$

$$\rho(x, y) = \|x - y\|$$

$$\rho_1(x, y) = \|x - y\|_1 \quad \rho_\infty(x, y) = \|x - y\|_\infty$$

Упражнение: Проверить, что  $\rho_1, \rho_\infty$  – метрики, нарисовать шар в  $\mathbb{R}^2$  относительно  $\rho_1, \rho_\infty$

**Определение 19.**  $\sqsupset (X, \rho)$  – метрическое пространство

$E \subseteq X, E$  Называется ограниченным, если

$$\exists a \in X, \exists R > 0 : \quad E \subseteq B_R(a)$$

**Замечание.** Эквивалентное определение: те же слова, но  $B_R[a]$

**Определение 20.**  $\square E \subseteq \mathbb{R}$   $E$  называется ограниченным сверху, если

$$\exists m \in \mathbb{R} : \forall x \in E \quad x \leq m.$$

При этом такое число  $m$  называется мажорантой

Говорят:  $m$  мажорирует  $E$

Аналогичное определение для ограниченности снизу. Соответствующее  $m$  называется минорантой

**Утверждение 3.**  $\square E \subseteq \mathbb{R}$

$$E - \text{ограничено} \iff \begin{cases} E - \text{ограничено сверху} \\ E - \text{ограничено снизу} \end{cases}.$$

*Доказательство.*  $\implies$  По условию  $\exists a : E \subseteq (a - R, a + R)$

$M := a + R$  – мажоранта  $\implies E$  ограничено сверху. снизу – аналогично

$$\iff E - \text{ограничено сверху} \implies \exists M \in \mathbb{R} : \forall x \in E \quad x \leq M$$

$$\dots \exists m \in \mathbb{R} : \forall x \in E \quad x \geq m$$

$$-x \leq -m \leq |m| \implies |x| = \max\{x, -x\} \leq \max\{|M|, |m|\} = R$$

$$\implies x \in B_R[0]. \text{ Т.к. это верно } \forall x \in E, \text{ то } E \subseteq B_R[0] \quad \blacksquare$$

**Замечание.** Если  $E \subseteq \mathbb{R}$ , то

$$E - \text{ограничено} \iff \exists R : \forall x \in E \quad |x| \leq R.$$

**Определение 21.**  $E \subseteq \mathbb{R}, M \in E$ , тогда

$$M = \max E \iff \forall x \in E \quad x \leq M.$$

$\min E$  аналогично

**Утверждение 4.**  $\forall E \subseteq \mathbb{R} : E - \text{конечно и } E \neq \emptyset \implies \max E, \min E$

**Определение 22.**  $E$  конечно, если  $\exists m \in \mathbb{N}$  и  $\exists$  биекция  $\varphi : E \rightarrow \{1, 2, \dots, m\}$

---

*доказательство Утверждения.* По индукции по числу элементов в  $E$

База:  $m = 1 \quad E = \{x\} \quad \max E = \min E = x$

Переход:  $m \rightarrow m + 1$

Индукционное предположение:  $\forall$  конечное множество из  $M$  элементов имеет  $\max$  и  $\min$

Пусть  $E$  содержит  $m + 1$  элементов

$$E = \{x_1, \dots, x_m, x_{m+1}\} = \tilde{E} \cup \{x_{m+1}\}$$

$$M = \max\{\max \tilde{E}, x_{m+1}\}$$

$$\begin{cases} M \in \tilde{E} & \subseteq E \\ M = x_{m+1} & \in E \end{cases} \implies M \in E$$

$$\begin{cases} M \geq x_{m+1} \\ M \geq x \forall x \in \tilde{E} \end{cases} \implies M \geq x \forall x \in E, \text{ т.о. } M = \max E \quad \blacksquare$$

**Следствие 1.**  $\sqsubset E \subseteq \mathbb{Z}, E$  – ограничено сверху (снизу).  
Тогда  $\exists \max(\min)E$

*Доказательство.* По условию существует  $M \in R : \forall x \in E \quad x \leq M, \tilde{\sqsupset} M \geq M$

$$\sqsubset n \in E \quad \triangleleft \tilde{E} = \{x \in E : n \leq x \leq \tilde{M}\}$$

В  $\tilde{E}$  не более  $\tilde{M} - n + 1$  элементов, оно конечно  $\implies$  (по утверждению)  
 $\exists \max \tilde{E} = C$

$$\forall x \in E^x < n \vee x \geq n$$

$$x < n \quad n \in \tilde{E} \implies n \leq C \implies x \leq C$$

$$x \geq n \quad x \in \tilde{E} \implies x \leq C \quad \blacksquare$$

**Следствие 2.**  $\sqsubset E \subseteq \mathbb{N} \quad E \neq \emptyset$  Тогда  $\exists \min E$   
(вытекает из следствия 1, т.к.  $\mathbb{N}$  ограничено снизу)

$[x]$  – целая часть числа.  $[x] = \max\{k \in \mathbb{Z} : k \leq x\}$  (Существует по следствию 1)

$$[x] \leq x < [x] + 1$$

$$x - 1 < [x] \leq x$$

**Утверждение 5.**  $\mathbb{Q}$  плотно в  $\mathbb{R}$

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, a < b \quad \exists c \in \mathbb{Q} \cap (a, b)$$

*Доказательство.*  $b - a > 0 \implies \frac{1}{b-a} > 0$

$$\exists N \in \mathbb{N} : N > \frac{1}{b-a} \iff b - a > \frac{1}{N}$$

$$c = \frac{\lfloor Na \rfloor + 1}{N} \in \mathbb{Q}$$

$$\begin{aligned} Na - 1 < \lfloor Na \rfloor \leq Na &\implies a = \frac{Na}{N} < c \leq \frac{Na+1}{N} = a + \frac{1}{N} < a + b - a = b \\ \implies c &\in (a, b) \end{aligned}$$

■

## 1.9 Равномощные множества

**Определение 23.**  $\sqsubset A, B$  – множества.

$A \sim B$  равномощны, если  $\exists$  биекция между  $A$  и  $B$

**Пример.** 1.  $(a, b), a < b \sim (0, 1)$

$$f(x) = a + (b - a) \cdot x, x \in (0, 1)$$

2.  $\forall (a, b)$  и  $(c, d)$  равномощны

$$2. a < b \implies (a, b) \sim [a, b] \sim [a, b]$$

$$3. \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \sim \mathbb{R} \quad (\text{tg})$$

**Замечание.** (равномощность)  $\sim$  – отношение эквивалентности.

$$1. X \sim X \quad id(x) \equiv x \text{ – тождественное отображение } id_X$$

$$2. X \sim Y \implies Y \sim X$$

$$3. X \sim Y \quad Y \sim Z \implies X \sim Z$$

**Определение 24.** Множество, равномощное  $\mathbb{N}$  называется счётным

**Пример.** •  $\{1, 4, 9, 16, \dots\}$  – счётно.  $f(x) = x^2$

•  $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4\}$  – считаем их натуральными числами в таком порядке

$$\bullet \{m, m+1, m+2, \dots\}, m \in \mathbb{R} \quad \varphi(x) = m + x - 1$$




Рис. 1.2: circ

**Теорема 1.** Любое бесконечное множество содержит счётное подмножество

*Доказательство.*  $\square$   $X$  – бесконечное множество.  $\implies \exists a_1 \in X \quad X \setminus \{a_1\} \neq \emptyset$  (Иначе  $X = \{a_1\}$ !!!)  $\implies \exists a_2 \in X \setminus \{a_1\} \quad a_2 \neq a_1$

Так можно продолжать для любого  $n$ .  $X \setminus \{a_1, \dots, a_n\} \neq \emptyset$  (иначе  $X$  конечно)  $\implies \exists a_{n+1} \in X \setminus \{a_1, \dots, a_n\}, \quad a_{n+1} \notin \{a_1, \dots, a_n\}$

$\forall n \in \mathbb{N} \quad \varphi : n \rightarrow a_n \quad A = \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \quad \varphi$  – инъекция по построению.  $A$  – счётное ■

**Определение 25.** Если  $X$  – конечно  $\vee X$  – счётно, то  $X$  называется не более чем счётным (нбчс).

**Замечание** (уточнение понятие конечного).  $X$  конечно  $\iff \begin{cases} X \sim \{1, \dots, n\} \\ X = \emptyset \end{cases}$

**Теорема 2.**  $\forall$  счётного  $E$ , если  $X \subseteq E$ ,  $X$  – бесконечно, то  $X$  – счётно.

**Замечание.** Любое подмножество счётного не более чем счётно.

*Доказательство.*  $E$  – счётно по условию  $E = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \dots\}$



В данном наборе есть элементы из  $X$ . Пронумеруем их в порядке возникновения в наборе (\*). ■

**Теорема 3.** Произведение счётных множеств счётно.

$A, B$  – счётны  $\implies A \times B$  – счётно

*Доказательство.* Если  $A = B = \mathbb{N}$  счётно

$$\begin{bmatrix} (1,1) & (1,2) & (1,3) & \dots \\ (2,1) & (2,2) & (2,3) & \dots \\ (3,1) & (3,2) & (3,3) & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{bmatrix} \text{ – нумеруем по диагоналям}$$

$$A \times B = \{(a_k, b_j)\}_{k,j \in \mathbb{N}} \quad l \rightarrow (k, j) \quad = \{(k, j)_l\}_{l \in \mathbb{N}} \quad \blacksquare$$

**Замечание.** Любое конечное произведение  $\underbrace{\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}}_m = (\mathbb{N}^m) \sim \mathbb{N}$  не более чем счётно

**Теорема 4.** Объединение счётного количества счётных множеств счётно.

$\{\{A_j\}_{j \in J} : J \text{ – не более чем счётно } \forall j \in J \ A_j \text{ не более чем счётно}\}$

$\bigcup_{j \in J} A_j$  – не более чем счётно

Не умаляя общности (н.у.о.)  $J = \mathbb{N} \vee J = \{1, 2, \dots, n\}$

Элементы  $A_1, A_2, \dots$  (счётных!) множеств можно занумеровать.

$$A_1 : \quad a_{11}, a_{12} \dots$$

$$A_2 : \quad a_{21}, a_{22} \dots$$

$$A_3 : \quad a_{31}, a_{32} \dots$$

Перенумеруем по диагоналям лишь те, который встречаем в первый раз

**Следствие 3.** 1.  $\mathbb{Q}$  счётно.  $\mathbb{Q} = \bigcup_{N \in \mathbb{N}} \mathbb{Q}_N \quad \mathbb{Q}_N = \{\frac{p}{n}\}_{p \in \mathbb{Z}}$

2.  $A = \{x : \exists \text{ многочлен с целыми коэффициенты } P(\cdot) : P(x) = 0\}$

$$\mathbb{P}_n = \{p(x) = a_0 + \dots + a_n x^n : a_0, \dots, a_n \in \mathbb{Z}\} \quad \mathbb{P}_n \leftrightarrow \mathbb{Z}^{n+1}$$

$$A_n = \{x : \exists p \in \mathbb{P}_n : p(x) = 0\} \quad A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

**Задача 1.**  $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \dots$  – несчётно

**Теорема 5.** Сегмент несчётен ( $\forall a, b : a < b \quad [a, b]$  – не является счётным)

*Доказательство.* Доказательство от противного.

$\square [a, b]$  – счётен  $\implies [a, b] = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$

$\triangleleft$  три замкнутые “трети”  $\Delta = b - a \quad [a, a + \frac{\Delta}{3}], [a + \frac{\Delta}{3}, a + \frac{2\Delta}{3}], [a + \frac{2\Delta}{3}, b]$

$x_1 \notin$  одной из третей. Эту треть назовём  $I_1$ . Повторим действие для  $I_1$  и  $x_2$

$I_2 \subseteq I_1 \subseteq I_0, x_1 \notin I_1, x_2 \notin I_2$

$I_n \subseteq I_{n-1} \subseteq \dots \subseteq I_2 \quad x_n \notin I_n$

По аксиоме №16  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n \neq \emptyset \quad \square x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n \implies c \in [a, b] \implies \exists n : c = x_n \notin I_n \implies c \notin \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n !!!$

Т.о.  $[a, b]$  – несчётно ■

**Следствие 4.** несчётные:  $\mathbb{R}, (a, b), \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$   
 $a < b$

$X \sim [0, 1]$ , то говорят, что  $X$  – мощности континуум (мощности  $\mathbb{C}$ )

**Задача 2.** 1.  $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \sim \mathbb{R}$

2.  $X$  – множество, то  $X \not\sim 2^X \quad 2^X = \{A : A \subseteq X\}$

$X = \emptyset \quad 2^X = \{\emptyset\}$

$X = \{a\} \quad 2^X = \{\emptyset, \{a\}\}$

3.  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \sim [0, 1]$

**Определение 26.**  $\square X$  – любое множество. Отображение из  $\mathbb{N}$  в  $X$  называется последовательностью в  $X$

вместо  $f(n), n \in \mathbb{N} \quad f : \mathbb{N} \rightarrow X$  используют  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  или  $(x_n)_{n=1}^{\infty} \quad n \rightarrow x_n \in X$

## 1.10 Предел числовой последовательности

**Определение 27.**  $\square \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  последовательность вещественных чисел.  $x_+ \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_+ \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \quad |x_n - x_+| < \varepsilon.$$

В метрическом пространстве  $(X, \rho)$  шар  $B_R(a)$  называется также  $R$ -окрестностью точки  $a$

**Определение 28** (Определение предела на языке окрестностей).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_* \iff \forall \text{ окрестности } U \text{ точки } x_* \quad \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N \quad x_n \in U$$

**Пример.**  $x_n = \frac{1}{n} \forall n \in \mathbb{N} \quad x_* = 0$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \quad \left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \quad n > \frac{1}{\varepsilon} \quad N := \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$$

**Замечание.** Определение предела на “языке окрестностей” справедливо в случае последовательностей в метрическом пространстве

$$x_n \rightarrow x_* \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N : \forall n > N \quad \rho(x_n, x_*) < \varepsilon$$

**Утверждение 6.**  $\square x_n = c \quad \forall n \in \mathbb{N}, c \in X, X$  – метрическое пространство  $\implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$

*Доказательство.*  $x_* = c \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad \rho(x_n, x_*) = 0 < \varepsilon \forall \varepsilon > 0$

$N = 1$  ■

**Замечание.**  $\square \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  и  $\{y_n\}_{n=1}^{\infty}$  – последовательности в метрическом пространстве  $X$  и  $\exists m \in \mathbb{N} \quad x_n = y_n \forall n \geq m$ . Тогда  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  и  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$  совпадают (если существует один, то существует другой и равны при существовании)

**Утверждение 7** (единственность предела).  $\square (X, \rho), \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq X, y, z \in X$

Если  $x_n \rightarrow y$  и  $x_n \rightarrow z$ , то  $y = z$

*Доказательство.* Если  $y \neq z$ , то  $\rho(y, z) = \Delta > 0 \quad \varepsilon = \frac{\Delta}{2}$

Т.к.  $x_n \rightarrow y, x_n \rightarrow z$ , то  $\exists N_1, N_2 :$

$$\forall n > N_1 \quad \rho(x_n, y) < \varepsilon$$

---


$$\forall n > N_2 \quad \rho(x_n, z) < \varepsilon$$

$$\forall n \geq \max\{N_1, N_2\} \quad \begin{cases} \rho(x_n, y) < \varepsilon \\ \rho(x_n, z) < \varepsilon \end{cases} \implies \Delta = \rho(y, z) \leq \rho(y, x_n) + \rho(x_n, z) < 2\varepsilon = \Delta \implies \Delta < \Delta !!! \quad \blacksquare$$

**Пример.**  $x_n = (-1)^{-1} \forall n \in \mathbb{N} \not\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n-1}$

Если бы  $\exists x_* = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n-1}$ , то для  $\varepsilon = 1 \exists N$

$$n = 2N \quad |(-1)^{n-1} - x_*| = |-1 - x_*| < 1$$

$$n = 2N + 1 \quad |(-1)^{n-1} - x_*| = |1 - x_*| < 1$$

$$2 = |1 - (-1)| \leq |1 - x_* + x_* - (-1)| \leq |1 - x_*| + |x_* - (-1)| < 2$$