

Дискретная математика

Коченюк Анатолий

27 сентября 2020 г.

0.1 Введение

Связаться:

- stankev@gmail.com Собирать культуру общения: указывать Фамилию, Имя
- Телеграм @andrewzta (для немедленного ответа. Если нет, оно утонет).
- +79219034426 (для катастрофических ситуаций, ожидается, что звонить никто не будет) (ни в коем случае не писать смс)

Обращаться можно по методическим вопросам. Если проблема группы – пишет староста.

Не писать по учебно-методическим проблемам (общежитие, медосмотр, армия ..) для этого есть зам. декана Харченко (легко найти контакты в ису)

Про отчётность будет на первой практике.

Лекции есть в ютубе andrewzta

Глава 1

1 курс

1.1 Фундамент

Множество – неопределяемое понятие. Множество состоит из элементов.
 $a \in A$ а-маленькое принадлежит множеству А-большое

$$A = \{2, 3, 9\}$$

$$A = \{n \mid n \text{ чётно}, n \in \mathbb{N}\} - \text{фильтр}$$

$A, B :$

- $A \cup B = \{a \mid a \in A \text{ или } a \in B\}$
- $A \cap B = \{a \mid a \in A \text{ и } a \in B\}$
- $A \setminus B = \{a \mid a \in A \text{ и } a \notin B\}$
- $\overline{A} = \{a \mid a \notin A\}$??? U – универсум
 $\overline{A} = U \setminus A$
 $A \setminus B = A \cap \overline{B}$
- $A \triangle B = A \oplus B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

Замечание. Если множество – любой набор чего-угодно возникает парадокс Рассела

$$A = \{a \mid a - \text{множество}, a \notin a\}$$

Вопрос лежит ли в себе A ?

Определение 1 (Пара). A, B – множества. Мы можем рассмотреть множество пар, где первый элемент из A , а второй из B

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$$

$$A \times A = A^2$$

$$(A \times B) \times C = \{(x, y) | x \in A \times B, y \in C\} = \{((a, b), y) | a \in A, b \in B, y \in C\}$$

$$A \times (B \times C) = \{(a, (y, z)) | a \in A, y \in B, z \in C\}$$

$$A \times B \times C = \{(a, b, c) | a \in A, b \in B, c \in C\}$$

Для простоты, здесь и далее эта операция будет считаться ассоциативной и первые две строчки будут давать то же, что третья – множество троек.

$$A \times A \times A = A^3 \quad A^n = \begin{cases} A & , n = 1 \\ A \times A^{n-1} & , n > 1 \end{cases}$$

$$A^0 = \{\emptyset\} = \{\varepsilon\} - \text{пустая последовательность.}$$

Пример. $A = 2, 3, 9 \rightarrow A \times A = \{(2, 2), (2, 3), (2, 9), (3, 2), (3, 3), \dots\}$

Замечание. У множества есть элемента и для любого элемента из универсума, он либо входит (1 раз) либо не входит.

Определение 2. Функция – отображение, которое каждому элементу из одного множества ставит в соответствие единственный элемент из другого множества

$$f : A \rightarrow B$$

График $\{(x, f(x))\}$.

Формально будем отождествлять функцию и её график.

$$f \subset A \times B \quad \forall a \in A \exists! b \in B \quad (a, b) \in f$$

Замечание. Не путайте принадлежность и включение

$$a \in A$$

$$A, B, \forall a \text{ (если } a \in A, \text{ то } a \in B) \quad A \subset B$$

$$D_4 = \{n | n \text{ кратно } 4\}$$

$$E = \{n | n \text{ чётно}\}$$

$$D_4 \subset E$$

$$\{2, 3, 9\} \subset \{2, 3, 4, \dots, 9\}$$

$$A \subset A$$

$$\emptyset \subset A$$

$$A \subset U$$

Замечание. Не обязательно все b попадают в график.

$sqr : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ – только квадраты чисел

Определение 3. $\forall b \in B \exists a \in A : b = f(a)$ – сюръекция

Определение 4. $\forall a \in A \forall b \in B \quad a \neq b \implies f(a) \neq f(b)$

Замечание. Принцип Дирихле – нет инъекции из большего в меньшее множества. Если кроликов больше, чем клеток, то какому-то кролику не хватит клетки

Определение 5. Если f – инъекция и сюръекция, то f – называется биекцией

Если между двумя конечными множествами есть биекция, то у них равное количество элементов.

Определение 6. Два множества называется равномоощными, если между ними есть дикция

B^A – множество функций из A в B

$$|A| = a, |B| = b \quad |A \times B| = a \cdot b \quad |B^A| = b^a$$

$|A^\emptyset| = 1$ эфемерная функция, которой ничего не передать

$$\emptyset^A = \emptyset, A \neq \emptyset$$

$$\emptyset^\emptyset = 1$$

Определение 7. $R \subset A \times B$ – отношение (бинарное)

Пример. $A = B = \mathbb{N} \quad R = \{(a, b) | a < b\} \quad R = <$

$$a : b \quad 6 : 2 \quad 6 \not: 5$$

A = люди, B = собаки, $R = \{(a, b) | a - \text{хозяин} b\}$

Рассмотрим 5 классов отношение на квадрате множества:

1. рефлексивные $\forall a \quad aRa$

$RC(R)$ – рефлексивное замыкание, включаем все пары (a, a)

2. антирефлексивные $\forall a \neg aRa$

3. симметричные $aRb \implies bRa$

4. антисимметричные $aRb, a \neq b \implies \neg bRa$

или aRb и $bRa \implies a = b$

5. транзитивность $aRb, bRc \implies aRc$

Определение 8. 1+3+5 – рефлексивные, симметричные и транзитивные – называются отношениями эквивалентности.

Теорема 1. R – отношение эквивалентности на X , то элементы X можно разбить на классы эквивалентности так, что:

a и b в одном классе $\implies aRb$ и a и b в разных классах $\implies \neg aRb$

множество таких классов обозначается X/R

$N/\equiv_3 =$

$\{\{1, 4, 7, 10, \dots\}$
 $\{2, 5, 8, 11, \dots\}$
 $\{3, 6, 9, 12, \dots\}\}$
 $.$

Замечание. Отношение равномощности – отношение эквивалентности.

Классы эквивалентности – порядки. Для конечного случая обозначаются числами

Определение 9. 1+4+5 – рефлексивные, антисимметричные и транзитивные – частичные порядки

Множество, на котором введён частичный порядок, то оно называется частично упорядоченным. (ч.у.м – частично упорядоченное множество, poset – partially organised set)

$R \subset X \times X$

$X, Y, Z \quad R : X \times Y \quad S : Y \times Z$

Определение 10. Композиция отношений:

$$T = R \circ S \quad xTy \iff \exists z : xRz \text{ и } zSy$$

т.е. есть z , через который можно пройти, чтобы попасть в y из x

Замечание. $R \subseteq X \times X \quad S \subseteq X \times X$

$$R \circ S \subseteq X \times X$$

$R \circ R \subseteq X \times X$ – пройти два раза по стрелкам

$$R^3 = R \circ R^2 = R^2 \circ R \text{ – пути длины ровно } 3$$

$S \circ T \circ U$ – идём по стрелке из S в T , а потом в U

Определение 11. Транзитивное замыкание.

$$R^+ = \bigcup_{k=1}^{\infty} R^k$$

$R^0 = \{(x, x) | x \in X\}$ – они не включаются по дефолту в R^+

$R^* = \bigcup_{k=0}^{\infty} R^k = R^+ \cup R^0$ – если между двумя вершинами существует какой-либо путь

Замечание. Транзитивное замыкание – транзитивно

$$\text{Пусть } xR^+y \implies xR^iy$$

$$\text{Пусть } yR^+z \implies yR^jz$$

$$\implies x(R^i \circ R^j)z \implies xR^kz$$

Замечание. $\forall T : T \text{ – транзитивно. } T \subset R \implies T^+ \subset R$

Доказательство. По индукции:

База: $R^1 \subset T$ – дано

Переход: $R^i \subset T \implies R^{i+1} \subset T$

$xR^{i+1}y \implies x(R \circ R^i)y \implies \exists z : xRz \& zR^iy \implies xRz \& zTy \implies xTy$ (по транзитивности T) ■

1.2 Булевы функции

\emptyset – пустое множество. С функциями из/в него всё достаточно грустно.

$\{unit\}$

void – ничего, константная функция

$$\mathbb{B} = \{0, 1\}$$

$f : A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n \rightarrow B$ – функция от нескольких аргументов. Из одного, но декартового произведения

Булева функция: $f : \mathbb{B}^n \rightarrow B$

$n = 0$ – ноль аргументов $\mathbb{B}^0 = \{\emptyset\}$

$\emptyset, 1$

$n = 1$

Таблица 1.1: n=1

x	\emptyset	id	\neg	1
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Замечание. Подобные таблицы называются таблицами истинности функций

$n = 2$

Таблица 1.2: n=2

x	y	\emptyset	\wedge	\nrightarrow	P_1	\neq	P_2	\oplus	\vee	\downarrow	$=$	$\neg P_2$	\leftarrow	$\neg P_1$	\rightarrow	\uparrow	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

С помощью стрелки Пирса (\downarrow) и штриха Шеффера (\uparrow) можно выразить любую другую: $\neg x = x \downarrow x$

1.3 Задания булевых функций

Самый простой способ – таблица истинности

\oplus_n – 2^n значений. глупо их все отдельно описывать

1. Задание функции формулой.

Определим базисные функции, систему связок

например: $\wedge, \vee, \neg, \oplus$

$$x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \dots$$

$\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ – базисные.

строка – формула. $f_i(x_1, \dots, x_k)$ – формула

Определение 12. Дерево разбора формулы. Если у функции аргументность – k , то у ноды будет ровно k сыновей

\overline{F} – функции, которые записываются формулами, используя F (замыкание F)

Теорема 2 (Теорема о стандартном базисе). $\overline{\{\wedge, \vee, \neg\}} = \mathbb{B}$

Доказательство. Рассмотрим таблицу истинности функции f . Она принимает n аргументов и в ней 2^n строк

Пусть $f \neq 0$. Рассмотрим строчки, в которых единицы.

По аргументам запишем с не – аргументы, которые 0, и без не – те, которые 1

$\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3 \wedge \neg x_4 \wedge x^5 = 1$ на ровно одном наборе элементов. А теперь возьмём "или" по всем строкам, в которых 1

Одна такая строка называется термом.

Такая форма называется совершенной дизъюнктивной нормальной формой



Лемма 1. Любая функция, кроме тождественного 0 – есть СДНФ

$x \vee \neg x$ – тождественный ноль

Напоминание о способах задания функций:

$F \quad x_1, x_2, \dots, x_n f \in F$

$or(and(x, not(y)), or(0, z))$. Такие формы называются формулами. По формуле можно построить дерево разбора.

\wedge, \vee, \neg

СДНФ – дизъюнкция термов, где каждый терм – конъюнкция литералов. Совершенная – в каждом терме есть все переменные по одному разу

Лемма 2. $\sqsupset F$ – некоторое множество. $\overline{F} = \mathbb{B}F$

$\sqsupset G$ – некоторое множество функций $\forall f \in F \quad f \in \overline{G}$

Тогда с помощью G можно выразить любую функцию $\overline{G} = \mathbb{B}F$

Доказательство. $G \rightarrow F \rightarrow \forall \implies G \rightarrow \forall$ – то, что нужно доказать

фиксируем функцию $h \in \mathbb{BF}$. Она каким-то деревом разбора выражается через функции $f \in F$. Каждая функция f выражается через $g \in \overline{G}$, тогда подставим выражения функций f через g в узлах дерева и получим выражение функции h через \overline{G} , значит любая функция выражается через $\overline{G} \implies \overline{G} = \mathbb{BF}$ ■

Пример. $\{\oplus, \wedge, 1\}$

$x \wedge y = x \wedge y$ $\neg x = x \oplus 1$ – такая запись называется полиномом жегалкина

$$x \vee y = (x \wedge y) \oplus x \oplus y$$

$x \wedge y = xy \oplus y \oplus x - \wedge$ опускают

$$(x \oplus y)(y \oplus z) = xy \oplus y \oplus xz \oplus yz$$

$$(x \oplus 1)(y \oplus 1) = xy \oplus x \oplus y \oplus 1$$

$a \wedge a = a$ – идемпотентность

Теорема 3. Любая булева функция (кроме \emptyset) имеет каноничный полином, причём единственный (с точностью до коммутативности и ассоциативности)

Доказательство. булевых функций от n аргументов – 2^{2^n}

Мономов – 2^n . Каждый из них мы можем взять или не взять \implies всего $2^{2^n} - 1$, -1 из случая, где мы рассматриваем пустую сумму.

Есть инъекция из булевых функций в полиному Жегалкина. Это инъекция между равномошными множествами \implies это биекция. ■

1.4 Линейный функции

Полиному Жегалкина, в которых нету \wedge

$$x \oplus y \quad x \oplus y \oplus 1$$

Определение 13. Функция называется линейной, если её канонический полином Жегалкина не содержит \wedge

Утверждение 1. Если F содержит только линейные функции, то и \overline{F} содержит только линейные функции

Доказательство. $x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$

$x_7 \oplus x_8 = (x_1 \oplus x_2 \oplus x_3) \dots$ Заменяем и получаем всё ещё сумму переменных или $\mathbb{1}$

Если формально, строим дерево, заменяем узлы на линейные функции, заменяем повторы, раскрываем скобки (пользуемся ассоциативностью \oplus) и получаем линейную функцию. ■

Утверждение 2. Если F содержит только функции, сохраняющие 0, то и \bar{F} тоже
аналогично для 1

Определение 14. Функция f называется монотонной \iff для двух наборов x_1, x_2, \dots, x_n y_1, y_2, \dots, y_n , что $x_i \leq y_i$ $0 < 1$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq f(y_1, y_2, \dots, y_n).$$

Утверждение 3. Из монотонных функций не выразить немонотонную

Доказательство. Доказывается индукцией по дереву разбора. Увеличили аргумента, увеличился уровень выше, выше и корень тоже ■

Определение 15. Функция f называется самодвойственной, если
 $f(x_1, \dots, x_n) = \neg f(\neg x_1, \dots, \neg x_n)$

Утверждение 4. Из самодвойственных функций тоже не выйти. Также деревом разбор

Классы Поста:

1. F_0 – сохраняющие 0
2. F_1 – сохраняющее 1
3. F_l – линейные
4. F_m – монотонные
5. F_s – самодвойственные

Лемма 3. $F \subseteq F_i, i \in \{0, 1, l, m, s\} \implies \overline{F} \subseteq F_i$

Следствие 1. \overline{F} – не полно

Теорема 4 (критерий Поста). F – полное $\iff F \not\subseteq F_i$ для всех $i \in \{0, 1, l, m, s\}$

Доказательство. \implies Если нет, то все функции лежат внутри этого класса. Не будет включена \uparrow например, не лежащая ни в одном классе Поста

$$\iff f_0 \notin F_0, f_1 \notin F_1, f_l \notin F_l, f_m \notin F_m, f_s \notin F_s$$

$$a(x)f_0(x, x, \dots, x)$$

$$a(0) = 1$$

$$\text{a } a(1) = 1 \implies a(x) = 1$$

$$\text{b } a(1) = 0 \implies a(x) = \neg x$$

$$b(x) = f_1(x, x, \dots, x) \quad b(1) = 0$$

$$1. \quad b(1) = 0 \implies b(x) = 0$$

$$2. \quad b(1) = 1 \implies b(x) = \neg x$$

$$1\text{a } 1 \ 0$$

$$1\text{b } 0, \neg$$

$$2\text{a } 1, \neg$$

$$2\text{b } \neg, x$$

$$1\text{a } 1, 0 \quad f_m(x_1, \dots, x_n) > f_m(y_1, \dots, y_n) \quad x_i \leq y_i \quad \text{Значит первое} - 1, \text{ а второе} - 9$$

$$f_m(x_1, \dots, x_n)$$

$$f_m(y_1, \dots, x_n)$$

$$f_m(y_1, \dots, x_n)$$

$$\vdots$$

$$f_m(y_1, \dots, y_n)$$

В какой-то момент единица сменилась нулём на соседних строках

$$f(y_1, \dots, y_{i-1}, x_i, \dots, x_n) = 1$$

$$f(y_1, \dots, y_{i-1}, y_i, \dots, x_n) = 0$$

$$x_i \leq y_i \quad x_i \neq y_i \implies x_i = 0, y_i = 1$$

$c(z) = f_m(y_1, \dots, y_{i-1}, z, x_{i+1}, \dots, x_n)$ здесь вместо x и y подставлены константы

$$c(z) = \neg z$$

$$2b) f_s \quad x_1, x_2, \dots, x_n : f_s(x_1, x_2, \dots, x_n) = \neg f(\neg x_1, \dots, \neg x_n) = t$$

$$d(z) = f_s(z^{x_1}, z^{x_2}, \dots, z^{x_n}) \quad x^y = \begin{cases} x & , y = 1 \\ \neg x & , y = 0 \end{cases}$$

$$d(0) = t, d(1) = t$$

$$\begin{cases} t = 1 \implies d(t) = 1 \\ t = 0 \implies d(t) = 0 \end{cases}$$

Итак мы получили $1, 0, \neg$

Воспользуемся нелинейной функцией: f_l среди нелинейных членов в полиноме Жегалкина выберем тот, в котором меньше всего переменных. Не умаляя общности скажем, что он выглядит как $xu_{i_1} \dots u_{i_k} \quad k + 2 \geq 2$

$h(x, y) = f_l(x, y, 1, 1, \dots, 1, 0, 0, \dots, 0)$ Вместо u_k подставляем 1 , а вместо остальных 0

$h(x, y) = xy[\oplus x][\oplus y][\oplus 1]$ – восемь вариантов.

Если есть $\oplus 1$, напомним \neg

$$xy[\oplus x][\oplus y]$$

$$xy = x \wedge y$$

$$xy \oplus x \oplus y = x \vee y$$

$$xy \oplus x \quad h(x, \neg y) = x(y \oplus 1) \oplus x = xy$$

$$xy \oplus y \quad h(\neg x, y) = (x \oplus 1)y \oplus y = xy$$

■