Analisi 2

Ede Boanini

25 aprile 2026

Indice

1 Equazioni differenziali lineari **3**
1.1 EDO di I ordine . . . 3
1.1.1 EDO di I ordine omogenee . . . 3
1.1.2 EDO di I ordine non omogenee . . . 3
1.2 EDO di II ordine . . . 3
1.2.1 EDO di II ordine omogenee . . . 3
1.2.2 EDO di II ordine non omogenee . . . 3
1.2.3 Metodo di somiglianza: $f(x)$ polinomio . . . 3
1.2.4 Metodo di somiglianza: $f(x)$ esponenziale . . . 6
1.2.5 Metodo di somiglianza: $f(x)$ è sin o cos . . . 9

2 Equazioni differenziali non lineari **9**
2.1 EDO di I ordine . . . 9
2.1.1 A variabili separabili . . . 9
2.2 EDO di II ordine . . . 9
2.2.1 A variabili separabili . . . 9

3 Proprietà Vettoriali **10**
3.1 Vettori & Proprietà . . . 10
3.1.1 Norma di un vettore . . . 10
3.1.2 Formula di Carnot . . . 10
3.1.3 Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz . . . 11
3.1.4 Disuguaglianza triangolare . . . 11

4 Elementi di Topologia in $\mathbb{R}^n$ **13**
4.1 Concetti Fondamentali . . . 13
4.1.1 Distanza Euclidea . . . 13
4.1.2 Spazio Metrico . . . 14
4.1.3 Palla Aperta / Intorno Sferico . . . 14
4.1.4 Punto interno, esterno, di frontiera, di accumulazione . . . 15
4.1.5 Insieme limitato, aperto, chiuso . . . 17

5 Limiti di funzioni in più variabili **18**
5.1 Definizioni e proprietà . . . 18
5.1.1 Definizione di Limite . . . 18
5.1.2 Importanza del punto di accumulazione nei limiti . . . 18
5.1.3 Properietà dei Limiti . . . 18
5.1.4 Limiti in $\mathbb{R}^2$ - Coordinate Polari . . . 18
5.1.5 Continuità per funzioni in più variabili . . . 18

6 Ripasso Funzioni **20**
6.1 Funzioni Classiche . . . 20
6.2 Funzioni Trigonometriche . . . 20
6.2.1 Funzioni Trigonometriche Classiche . . . 20
6.2.2 Funzioni Goniometriche Inverse . . . 20
6.3 Funzioni Iperboliche . . . 20
6.3.1 Funzioni Iperboliche Classiche . . . 20
6.3.2 Funzioni Iperboliche Inverse . . . 20

7 Calcolo differenziale per funzioni in più variabili **21**
7.1 Teoremi Fondamentali del Calcolo Differenziale in $\mathbb{R}$ . . . 21
7.2 Derivate Direzioniali e Parziali . . . 21
7.2.1 Derivata Direzionale . . . 21
7.2.2 Derivata Parziale . . . 21
7.2.3 Vettore Gradiente . . . 21
7.3 Differenziabilità . . . 21
7.3.1 Definizione Differenziale . . . 21
7.3.2 Teoremi Differenziabilità . . . 21
7.3.3 Derivabilità vs Differenziabilità . . . 22
7.3.4 Teorema di Schwarz . . . 22
7.4 Formula di Taylor . . . 22
7.5 Altro . . . 22
7.5.1 Curva Regolare . . . 22
7.5.2 Regola della catena . . . 22
7.5.3 Massimo e Minimo . . . 22

8 Rappresentazione di Funzioni in $\mathbb{R}^2$ **24**
8.1 Dominio . . . 24
8.2 Grafico . . . 24
8.3 Curve di Livello . . . 24
8.4 Insiemi di Livello . . . 24

9 Calcolo integrale per funzioni in più variabili **25**

1 Equazioni differenziali lineari

1.1 EDO di I ordine

$$y' = 3e^x$$

1.1.1 EDO di I ordine omogenee

osservazione: EDO lineare del I ordine omogenea è una equazione a variabili separabili (quella a var separabili è una tecnica per risolvere le EDO non lineari)

1.1.2 EDO di I ordine non omogenee

1.2 EDO di II ordine

$$2y'' + 5y = e^x$$

1.2.1 EDO di II ordine omogenee

1.2.2 EDO di II ordine non omogenee

1.2.3 Metodo di somiglianza: $f(x)$ polinomio

Utile per trovare la soluzione particolare y_p delle EDO di II ordine non omogenee.

$$ay'' + by' + cy = f(x)$$

$f(x)$ è un polinomio di grado n:

Caso 1: $c \neq 0$

$c \neq 0$

$$y'' + 2y' - 8y = x^2 + 3x + 1$$

Qui $f(x) = x^2 + 3x + 1$ che è un polinomio con

- $a = 1$
- $b = 2$
- $c = -8$

$c \neq 0$ quindi devo cercare polinomio di grado n (che corrisponde al grado del polinomio a destra dell'uguale), quindi $n = 2$:

1. Scrivo polinomio di grado $n = 2$ generico:

   $$\alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

   Questa sarà la forma della soluzione particolare y_p
2. Devo trovare chi sono α, β, γ, come faccio? Calcolo derivata prima e seconda della soluzione particolare: $y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$

   - Calcolo derivata prima:

     $$y_p' = 2\alpha x + \beta$$
   - Calcolo derivata seconda:

     $$y_p'' = 2\alpha$$
3. Sostituisco y_p, y_p', y_p'' trovati in $y'' + 2y' - 8y$:
   Ho:

   $$y'' + 2y' - 8y = x^2 + 3x + 1$$

Sostituisco $y_p = y, y_p' = y', y_p'' = y''$

$$(2\alpha) + 2(2\alpha x + \beta) - 8(\alpha x^2 + \beta x + \gamma) = x^2 + 3x + 1$$

Ora sviluppo i calcoli per trovare α, β, γ:

$$\begin{aligned}(2\alpha) + 2(2\alpha x + \beta) - 8(\alpha x^2 + \beta x + \gamma) &= x^2 + 3x + 1\\ 2\alpha + 4\alpha x + 2\beta - 8\alpha x^2 - 8\beta x - 8\gamma &= x^2 + 3x + 1\\ x^2(-8\alpha) + x(4\alpha - 8\beta) + 2\alpha + 2\beta - 8\gamma &= x^2 + 3x + 1\end{aligned}$$

Metto a sistema:
$x^2(-8\alpha)+x(4\alpha - 8\beta) + 2\alpha + 2\beta - 8\gamma = x^2 + 3x + 1$

$$\begin{cases}-8\alpha = 1\\ 4\alpha - 8\beta = 3\\ 2\alpha + 2\beta - 8\gamma = 1\end{cases}$$

Risolvo il sistema e ottengo:

$$\begin{cases}\alpha = -\frac{1}{8}\\ \beta = -\frac{7}{16}\\ \gamma = -\frac{17}{64}\end{cases}$$

4. La soluzione particolare $y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ dopo aver trovato α, β, γ sarà:

$$\begin{aligned}y_p &= \alpha x^2 + \beta x + \gamma\\ &= -\frac{1}{8}x^2 - \frac{7}{16}x - \frac{17}{64}\end{aligned}$$

Caso 2: c uguale a zero

$c = 0, \quad b \neq 0$

$$y'' + 7y' = x + 3$$

$c = 0$ quindi devo cercare polinomio di grado $n + 1$, poichè il grado di $x + 3$ è 1, allora $n + 1 = 1 + 1 = 2$, quindi $n = 2$:

1. Scrivo polinomio di grado $n = 2$ generico:

$$y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$$

2. Calcolo derivata prima e seconda
   - $y_p' = 2\alpha x + \beta$
   - $y_p'' = 2\alpha$
3. Sostituisco nella EDO originale e trovo α, β, γ:
   Sostituisco y_p, y_p', y_p'' trovati in $y'' + 7y'$:

$$\begin{gathered}y'' + 7y' = x + 3\\ (2\alpha) + 7(2\alpha x + \beta) = x + 3\\ 2\alpha + 14\alpha x + 7\beta = x + 3\\ x(14\alpha) + 2\alpha + 7\beta = x + 3\end{gathered}$$

   Metto a sistema:

$$\begin{cases}14\alpha = 1\\ 2\alpha + 7\beta = 3\end{cases}$$

   Risolvo il sistema e ottengo:

$$\begin{cases}\alpha = \frac{1}{14}\\ \beta = \frac{20}{49}\end{cases}$$

4. Ottengo la soluzione particolare:
   La soluzione particolare $y_p = \alpha x^2 + \beta x + \gamma$ dopo aver trovato α, β, γ sarà:

$$\begin{aligned} y_p &= \alpha x^2 + \beta x + \gamma \\ &= \frac{1}{14}x^2 + \frac{20}{49}x - 0 \\ &= \frac{1}{14}x^2 + \frac{20}{49}x \end{aligned}$$

Caso 3

$c, b = 0$

$$y'' = x^2 + 4x - 7$$

$c, b = 0$ quindi devo cercare un polinomio di grado $n + 2$, poichè il grado di $x^2 + 4x - 7$ è 2, allora $n + 2 = 2 + 2 = 4$.

Ho due metodi:

- Integrare due volte, oppure
- Trovare il polinomio generico di grado $n = 4$:

$$\alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \delta x + \epsilon$$

Primo metodo: Integrare due volte

Qui non trovo la soluzione particolare ma trovo la soluzione generale della EDO:

$$\begin{aligned} \int (x^2 + 4x - 7)dx &= \int x^2 dx + \int 4x dx - \int 7 dx \\ &= \frac{x^3}{3} + 2x^2 - 7x + c_1 \end{aligned}$$

Integro di nuovo:

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{x^3}{3} + 2x^2 - 7x + c_1 \right) dx &= \int \frac{x^3}{3} dx + \int 2x^2 dx - \int 7x dx + \int c_1 dx \\ &= \frac{x^4}{12} + \frac{2x^3}{3} - \frac{7x^2}{2} + c_1 x + c_2 \end{aligned}$$

Soluzione generale della EDO:

$$\frac{x^4}{12} + \frac{2x^3}{3} - \frac{7x^2}{2} + c_1 x + c_2$$

Secondo metodo: metodo di somiglianza

Qui trovo solo la soluzione particolare:

1. Scrivo polinomio di grado $n = 4$ generico:

$$y_p = \alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \delta x + \epsilon$$

2. Calcolo derivata seconda del polinomio generico:
   - $y_p' = 4\alpha x^3 + 3\beta x^2 + 2\gamma x + \delta$
   - $y_p'' = 12\alpha x^2 + 6\beta x + 2\gamma$
3. Sostituisco la derivata seconda trovata nella EDO e trovo $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$:

$$y'' = x^2 + 4x - 7$$

   diventa:

$$(12\alpha x^2 + 6\beta x + 2\gamma) = x^2 + 4x - 7$$

$$x^2(12\alpha) + x(6\beta) + 2\gamma = x^2 + 4x - 7$$

Metto a sistema:

$$\begin{cases} 12\alpha = 1 \\ 6\beta = 4 \\ 2\gamma = -7 \end{cases}$$

Risolvo il sistema e ottengo:

$$\begin{cases} \alpha = \frac{1}{12} \\ \beta = \frac{2}{3} \\ \gamma = -\frac{7}{2} \end{cases}$$

4. Ottengo la soluzione particolare: La soluzione particolare $y_p = \alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \delta x + \epsilon$ dopo aver trovato $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon$ sarà:

$$\begin{aligned} y_p &= \alpha x^4 + \beta x^3 + \gamma x^2 + \delta x + \epsilon \\ &= \frac{1}{12}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 0x + 0 \\ &= \frac{1}{12}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{7}{2}x^2 \end{aligned}$$

1.2.4 Metodo di somiglianza: $f(x)$ esponenziale

Utile per trovare la soluzione particolare y_p delle EDO di II ordine non omogenee.

$$ay'' + by' + cy = f(x)$$

$f(x)$ è un esponenziale

Caso 1: α non è soluzione dell'eq. caratteristica

$f(x) = c \cdot e^{\alpha x}$ e α non è soluzione dell'equazione caratteristica.

$$y'' + 7y' + 12y = 5e^{2x}$$

In questo caso abbiamo che $c = 5$ e $\alpha = 2$.

1. Trovo soluzioni dell'omogenea associata (ponendo $f(x) = 0$):

$$y'' + 7y' + 12y = 0$$

Quindi:

$$\lambda^2 + 7\lambda + 12 = 0$$
$$\Delta = b^2 - 4ac = 49 - 4(12) = 49 - 48 = 1$$
$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 \pm 1}{2} =$$

$$x_1 = -3$$
$$x_2 = -4$$

2. α fa parte delle soluzioni dell'equazione caratteristica?
No, perchè ho ottenuto $x_1 = -3, x_2 = -4$. Quindi adesso cerco soluzione particolare nella forma:

$$y_p = k \cdot e^{\alpha x}$$

(a) Calcolo derivata prima e seconda di $y_p = k \cdot e^{2x}$:

- $y_p' = 2ke^{2x}$

- $y_p'' = 4ke^{2x}$

(b) Sostituisco le derivate nella EDO:

$$y'' + 7y' + 12y = 5e^{2x}$$

diventa:

$$(4ke^{2x}) + 7(2ke^{2x}) + 12(k \cdot e^{2x}) = 5e^{2x}$$
$$ke^{2x}\,(4 + (7 \cdot 2) + 12) = 5e^{2x}$$
$$30ke^{2x} = 5e^{2x}$$

Ricavo k:

$$k = \frac{5e^{2x}}{30e^{2x}} = \frac{5}{30} \cdot \frac{e^{2x}}{e^{2x}} = \frac{1}{6} \cdot (e^{2x-2x}) = \frac{1}{6} \cdot e^0 = \frac{1}{6}$$

(c) La soluzione particolare $y_p = k \cdot e^{\alpha x}$ diventa:

$$y_p = \frac{1}{6}e^{2x}$$

Quindi la soluzione della EDO sarà $y = y_O + y_p$, ovvero:

$$y = \left(c_1 e^{-3x} + c_2 e^{-4x}\right) + \frac{1}{6}e^{2x}$$

Caso 2: α è soluzione dell'eq. caratteristica

$f(x) = c \cdot e^{\alpha x}$ e α è soluzione dell'equazione caratteristica.

$$3y'' - 20y' - 7y = 4e^{7x}$$

In questo caso abbiamo che $c = 4$ e $\alpha = 7$.

1. Trovo soluzioni dell'omogenea associata (ponendo $f(x) = 0$):

$$3y'' - 20y' - 7y = 0$$

Quindi:

$$3\lambda^2 - 20\lambda - 7 = 0$$
$$\Delta = b^2 - 4ac = 400 - 4(3)(-7) = 400 + 84 = 484$$
$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{20 \pm \sqrt{484}}{6} = \frac{-20 \pm 22}{6} =$$

$$x_1 = -\frac{1}{3}$$
$$x_2 = 7$$

2. α fa parte delle soluzioni dell'equazione caratteristica?
Sì, perchè ho ottenuto $x_1 = -\frac{1}{3}, x_2 = 7$. Quindi adesso cerco soluzione particolare nella forma:

$$y_p = kx \cdot e^{\alpha x}$$

(a) Calcolo derivata prima e seconda di $y_p = kx \cdot e^{7x}$:

- $$\begin{aligned} y_p' &= \left(f' \cdot g + f \cdot g'\right) \\ &= \left((kx)' \cdot e^{7x} + kx \cdot (e^{7x})'\right) \\ &= ke^{7x} + 7kxe^{7x} \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned} y_p'' &= (ke^{7x})' + (7kxe^{7x})' \\ &= 7ke^{7x} + \left((7kx)' \cdot e^{7x} + 7kx \cdot (e^{7x})'\right) \\ &= 7ke^{7x} + \left(7ke^{7x} + 49kxe^{7x}\right) \\ &= 14ke^{7x} + 49kxe^{7x} \end{aligned}$$

(b) Sostituisco le derivate nella EDO e trovo k:

$$3y'' - 20y' - 7y = 4e^{7x}$$

diventa:

$$\begin{gathered} 3(14ke^{7x} + 49kxe^{7x}) - 20(ke^{7x} + 7kxe^{7x}) - 7(kx \cdot e^{7x}) = 4e^{7x} \\ 42ke^{7x} + 147kxe^{7x} - 20ke^{7x} - 140kxe^{7x} - 7kxe^{7x} = 4e^{7x} \\ ke^{7x}(42 + 147x - 20 - 140x - 7x) = 4e^{7x} \\ ke^{7x}(22) = 4e^{7x} \end{gathered}$$

Ricavo k:

$$\begin{gathered} 22ke^{7x} = 4e^{7x} \\ k = \frac{4e^{7x}}{22e^{7x}} = \frac{4}{22} = \frac{2}{11} \end{gathered}$$

(c) La soluzione particolare $y_p = kx \cdot e^{\alpha x}$ diventa:

$$y_p = \frac{2}{11} xe^{7x}$$

Quindi la soluzione della EDO sarà $y = y_O + y_p$, ovvero:

$$y = \left(c_1 e^{-\frac{1}{3}x} + c_2 e^{7x}\right) + \frac{2}{11} xe^{7x}$$

Caso 3

$f(x) = c \cdot e^{\alpha x}$ e
$\alpha = \lambda_1 = \lambda_2$ è uguale ad entrambe le soluzioni dell'equazione caratteristica.

$$y'' - 12y' + 36y = 3e^{6x}$$

In questo caso abbiamo che $c = 3$ e $\alpha = 6$.

1. Trovo soluzioni dell'omogenea associata (ponendo $f(x) = 0$):

$$y'' - 12y' + 36y = 0$$

Quindi:

$$\begin{gathered} \lambda^2 - 12\lambda + 36 = 0 \\ \Delta = b^2 - 4ac = 144 - 144 = 0 \\ \lambda_1, \lambda_2 = \frac{-b \pm 0}{2a} = \frac{12}{2} = 6 \end{gathered}$$

Quindi ho due soluzioni coincidenti.

2. Quando le soluzioni dell'equazione caratteristica coincidono e sono uguali ad α, allora cerco soluzione particolare nella forma:

$$y_p = kx^2 \cdot e^{\alpha x}$$

(a) Calcolo derivata prima e seconda di $y_p = kx^2 \cdot e^{6x}$:

- $$\begin{aligned} y_p' &= \left(f' \cdot g + f \cdot g'\right) \\ &= \left((kx^2)' \cdot e^{6x} + kx^2 \cdot (e^{6x})'\right) \\ &= 2kxe^{6x} + 6kx^2e^{6x} \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} y_p'' &= \left(f' \cdot g + f \cdot g'\right) \\ &= \left((2kx)' \cdot e^{6x} + 2kx \cdot (e^{6x})'\right) + \left((6kx^2)' \cdot e^{6x} + 6kx^2 \cdot (e^{6x})'\right) \\ &= \left(2ke^{6x} + 12kxe^{6x}\right) + \left(12kxe^{6x} + 36kx^2e^{6x}\right) \\ &= 36kx^2e^{6x} + 24kxe^{6x} + 2ke^{6x} \end{aligned}$$

(b) Sostiuisco le derivate nella EDO iniziale e ricavo k:

$$y'' - 12y' + 36y = 3e^{6x}$$

diventa:

$$(36kx^2e^{6x} + 24kxe^{6x} + 2ke^{6x}) - 12(2kxe^{6x} + 6kx^2e^{6x}) + 36(kx^2e^{6x}) = 3e^{6x}$$

$$36kx^2e^{6x} + 24kxe^{6x} + 2ke^{6x} - 24kxe^{6x} - 72kx^2e^{6x} + 36kx^2e^{6x} = 3e^{6x}$$

$$2ke^{6x} = 3e^{6x}$$

$$k = \frac{3e^{6x}}{2e^{6x}} = \frac{3}{2}$$

(c) La soluzione particolare $y_p = kx^2e^{\alpha x}$ diventa:

$$y_p = \frac{3}{2}x^2e^{6x}$$

La soluzione della EDO $y = y_O + y_p$ è:

$$y = \left(c_1e^{6x} + c_2xe^{6x}\right) + \frac{3}{2}x^2e^{6x}$$

1.2.5 Metodo di somiglianza: $f(x)$ è sin o cos

Utile per trovare la soluzione particolare y_p delle EDO di II ordine non omogenee.

$$ay'' + by' + cy = f(x)$$

$f(x)$ è $\sin(x)$ o $\cos(x)$

2 Equazioni differenziali non lineari

2.1 EDO di I ordine

2.1.1 A variabili separabili

2.2 EDO di II ordine

2.2.1 A variabili separabili

3 Proprietà Vettoriali

3.1 Vettori & Proprietà

Definizione : Vettore

l vettore $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ è una n-upla:

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

3.1.1 Norma di un vettore

Definizione : Norma di un vettore

Sia $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ un vettore. Indico la norma/lunghezza di un vettore come la radice quadrata del prodotto scalare del vettore $\vec{x}$ per se stesso o equivalentemente, la radice quadrata della somma dei suoi componenti al quadrato, il numero reale non negativo:

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i)^2}$$

3.1.2 Formula di Carnot

Teorema : Formula di Carnot

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. La norma al quadrato della somma dei due vettori equivale alle loro norme al quadrato più due volte il loro prodotto scalare [a]:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

Dimostrazione. Sapendo che $\|\vec{x}\| = \sqrt{\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle}$, allora:

$$\begin{aligned}
\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 &= \left(\sqrt{\langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y} \rangle}\right)^2 \\
&= \langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y} \rangle \\
&\text{sviluppo prodotto scalare } \langle \text{arg1}, \text{arg2} \rangle \\
&= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle \\
&\text{dato che } \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle \text{ (simmetria) allora,} \\
&= \|\vec{x}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \|\vec{y}\|^2 \\
&= \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle
\end{aligned}$$

□

[a] Un pò come $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

3.1.3 Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz

Teorema : Disuguaglianza di Cauchy-Schwartz p.56

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. Il valore assoluto del prodotto scalare è minore o uguale $\leq$ al prodotto delle norme dei due vettori:

$$|\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle| \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|$$

Dimostrazione. pagina 112 del libro in prestito □

3.1.4 Disuguaglianza triangolare

Teorema : Disuguaglianza triangolare p.58

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. La norma della somma dei due vettori è minore o uguale $\leq$ alla somma delle loro norme:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$$

e se:

$$\|\vec{x} + \vec{y}\| = \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\| \text{ vuol dire che } \vec{y} = 0 \vee \vec{x} = \lambda \cdot \vec{y} \text{ con } \lambda \geq 0$$

Dimostrazione. Questo teorema usa la formula di Carnot e Chauchy-Schwartz per la dimostrazione.

considero

$\|\vec{x}+\vec{y}\|$

elevo al quadrato

$(\|\vec{x}+\vec{y}\|)^2$

$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2$

so che $\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \overset{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle$ quindi:

$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \overset{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle$

so che: $\|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle \leq \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2|\langle\vec{x},\vec{y}\rangle|$

perchè ovviamente $\forall z \in \mathbb{R}$ vale sempre che $z \leq |z|$, quindi:

$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \overset{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle \leq \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2|\langle\vec{x},\vec{y}\rangle|$

so che per Cauchy-Schwarz vale che: $|\langle\vec{x},\vec{y}\rangle| \leq \|\vec{x}\|\,\|\vec{y}\|$ quindi:

$$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \overset{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle \leq \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2|\langle\vec{x},\vec{y}\rangle| \overset{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|$$

dato che:

$$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \overset{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle \leq \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2|\langle\vec{x},\vec{y}\rangle| \leq \underbrace{\|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|}_{=(\|\vec{x}\|+\|\vec{y}\|)^2}$$

quindi:

$$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \overset{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle \leq \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2|\langle\vec{x},\vec{y}\rangle| \leq (\|\vec{x}\|+\|\vec{y}\|)^2$$

$$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \overset{\text{Carnot}}{=} \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2\langle\vec{x},\vec{y}\rangle \leq \|\vec{x}\|^2+\|\vec{y}\|^2+2|\langle\vec{x},\vec{y}\rangle| \leq (\|\vec{x}\|+\|\vec{y}\|)^2$$

prendo ora le parti in rosso:

$\|\vec{x}+\vec{y}\|^2 \leq (\|\vec{x}\|+\|\vec{y}\|)^2$

imposto radici per rimuovere le potenze di 2:

$\sqrt{\|\vec{x}+\vec{y}\|^2} \leq \sqrt{(\|\vec{x}\|+\|\vec{y}\|)^2}$

$\|\vec{x}+\vec{y}\| \leq (\|\vec{x}\|+\|\vec{y}\|)$

$\|\vec{x}+\vec{y}\| \leq \|\vec{x}\|+\|\vec{y}\|$

$\square$

Vale sempre:

$$x \leq |x| \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

ovvio che qualunque sia il valore di x, il suo valore assoluto sarà sempre uguale o maggiore. Per esempio: se $x=-3$, allora $-3<|-3|$ perchè diventa $-3<3$ ed è vero. Oppure, se $x=3$, allora $3=|3|$ perchè $3=3$ ed è comunque vero.

4 Elementi di Topologia in $\mathbb{R}^n$

4.1 Concetti Fondamentali

4.1.1 Distanza Euclidea

Definizione : Distanza euclidea

Siano $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ due vettori. La distanza euclidea tra $\vec{x}$ e $\vec{y}$ è il numero reale non negativo definito dalla norma della loro differenza:

$$d(\vec{x}, \vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\| = \sqrt{\langle \vec{x} - \vec{y}, \vec{x} - \vec{y} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2}$$

Proprietà:

1. $d(\vec{x}, \vec{y}) \geq 0, \quad d(\vec{x}, \vec{y}) \in \mathbb{R}$
2. $d(\vec{x}, \vec{y}) = 0 \iff \vec{x} = \vec{y}$
3. $d(\vec{x}, \vec{y}) = d(\vec{y}, \vec{x})$ (simmetria)
4. $d(\vec{x}, \vec{y}) \leq d(\vec{x}, \vec{z}) + d(\vec{z}, \vec{y})$ (disugualianza triangolare)

   La distanza diretta tra $\vec{x}, \vec{y}$ è minore o uguale al percorso che passa per un punto intermedio $\vec{z}$.

La distanza euclidea è semplicemente un numero reale positivo che indica quanto sono distanti due punti nello spazio. Per esempio, siano due punti A, B in $\mathbb{R}^3$ con le seguenti coordinate cartesiane:

$$A(x_A, y_A, z_A), \quad B(x_B, y_B, z_B)$$



Allora la distanza tra i due punti A, B è la seguente

$$d(A, B) = d(\vec{OA}, \vec{OB}) = \|\vec{OB} - \vec{OA}\| = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

4.1.2 Spazio Metrico

Definizione : Spazio Metrico

Sia X un insieme qualsiasi. X viene definito spazio metrico quando in esso viene introdotta una funzione distanza.

Uno spazio metrico è una coppia (X, d) dove:

- X è un insieme
- d è una funzione distanza che associa a ogni coppia di punti di X un numero reale non negativo che rappresenta la distanza tra i punti

Un esempio può essere lo **spazio euclideo** definito come:

$$(\mathbb{R}^n, d) \quad \text{con } d = \text{distanza euclidea}$$

Lo spazio metrico è un qualunque insieme nel quale viene definita una distanza, anche detta metrica.

4.1.3 Palla Aperta / Intorno Sferico

Definizione : Palla aperta / Intorno Sferico

- Sia $\vec{x_0} \in \mathbb{R}^n$ fissato
- Sia il raggio $r > 0$ dove $r \in \mathbb{R}$

Si definisce palla aperta o intorno sferico di centro $\vec{x_0}$ e raggio r, l'insieme:

$$B(\vec{x_0}, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid d(\vec{x}, \vec{x_0}) < r\}$$

Esempi sugli intorni sferici:

- In $\mathbb{R}$ gli intorni sferici di x_0 non sono altro che intervalli aperti $(x_0 - r, x_0 + r)$
- In $\mathbb{R}^2$ gli intorni sferici di (x_0, y_0) sono dischi (non "cerchi"[1]) centrati in (x_0, y_0), privi di circonferenza
- In $\mathbb{R}^3$ gli intorni sferici di (x_0, y_0, z_0) sono sfere piene [2] centrate in (x_0, y_0, z_0) prive di bordo



[1] perchè con "cerchi" si intende la circonferenza (il bordo), mentre disco è l'interno.

[2] Sfera piena = interno senza il bordo (come il disco per $\mathbb{R}^2$); Sfera = solo il bordo (come il cerchio per $\mathbb{R}^2$).

4.1.4 Punto interno, esterno, di frontiera, di accumulazione

Definizione : Punto interno in $\mathbb{R}$

Un punto interno di un insieme è un punto per il quale esiste almeno un intorno interamente contenuto nell'insieme.

Sia $x_0 \in A \subseteq \mathbb{R}$ (punto appartenente all'insieme A), si dice che x_0 è un punto interno ad A se esiste un intorno di centro x_0 e raggio r completamente contenuto in A:

$$\exists r > 0 \mid B(x_0, r) \subset A$$

Definizione : Punto interno in $\mathbb{R}^n$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{x_0} \in \mathbb{R}^n$ si dice interno ad A se $\exists$ un intorno sferico di centro $\vec{x_0}$ e raggio[a] $r \in \mathbb{R}^+$ completamente contenuto in A:

$$\exists r > 0 \mid B(\vec{x_0}, r) \subset A$$

[a] $r \in \mathbb{R}, r > 0$. Il raggio è numero reale positivo, non un vettore come $\vec{x_0}$

Un punto interno ad A deve necessariamente appartenere all'insieme.

Definizione : Punto esterno in $\mathbb{R}$

Un punto esterno ad un insieme è un punto per il quale esiste almeno un intorno interamente contenuto nel complementare dell'insieme.

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$, si dice che x_0 è un punto esterno ad $A \subseteq \mathbb{R}$ se esiste un intorno di centro x_0 e raggio r completamente contenuto nel complementare di A:

$$\exists r > 0 \mid B(x_0, r) \subset \overline{A}$$

Definizione : Punto esterno in $\mathbb{R}^n$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{x_0} \in \mathbb{R}^n$ si dice esterno ad A se $\exists$ un intorno sferico di centro $\vec{x_0}$ e raggio[a] $r \in \mathbb{R}^+$ completamente contenuto in $\overline{A}$[b]:

$$\exists r > 0 \mid B(\vec{x_0}, r) \subset \overline{A}$$

[a] $r \in \mathbb{R}, r > 0$. Il raggio è numero reale positivo, non un vettore come $\vec{x_0}$
[b] complementare di A

Un punto esterno ad A non appartenere all'insieme.

Definizione : Punti di frontiera in $\mathbb{R}$

Un punto di frontiera (bordo) di un insieme è un punto il cui ogni intorno contiene almeno un punto dell'insieme e del suo complementare.

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$, si dice che x_0 è un punto di frontiera di $A \subseteq \mathbb{R}$ se ogni intorno di centro x_0 e raggio r contiene almeno un punto di A e allo stesso tempo, almeno un punto di $\overline{A}$:

$$\forall r > 0, \quad \exists y_1 \in A, \quad \exists y_2 \in \overline{A} \quad \text{t.c.} \quad y_1, y_2 \in B(x_0, r)$$

Definizione : Punti di frontiera in $\mathbb{R}^n$

Sia $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Un punto $\vec{x_0} \in \mathbb{R}^n$ si dice di frontiera per A se ogni intorno sferico di centro $\vec{x_0}$ e raggio[a] $r \in \mathbb{R}^+$ contiene almeno un punto di A e un punto di $\overline{A}$:

$$\forall r > 0, \quad \exists \vec{y_1} \in A, \quad \exists \vec{y_2} \in \overline{A} \quad \text{t.c.} \quad \vec{y_1}, \vec{y_2} \in B(\vec{x_0}, r)$$

[a] $r \in \mathbb{R}, r > 0$. Il raggio è numero reale positivo, non un vettore come $\vec{x_0}$

Un punto di frontiera per A può appartenere o non appartenere all'insieme.



Definizione : Punto di accumulazione

Un punto $\vec{x_0}$ si dice di accumulazione per $A \subseteq \mathbb{R}^n$ se in ogni intorno di $\vec{x_0}$ esiste un punto di A diverso da $\vec{x_0}$:

$$\forall r > 0 \quad B(\vec{x_0}, r) \cap (A \setminus \{\vec{x_0}\}) \neq \emptyset$$

Un punto di accumulazione per A può appartenere o non appartenere ad A.



4.1.5 Insieme limitato, aperto, chiuso

Definizione : Insieme limitato

Definisco l'insieme $A \subseteq \mathbb{R}^n$ limitato se $\exists$ una palla aperta di centro $\vec{x_0} \in \mathbb{R}^n$ e raggio $r > 0$ in cui A ne risulta interamente contenuto:

$$A \subset B(\vec{x_0}, r)$$

Definizione : Insieme aperto

Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice aperto se ogni $x \in A$ è un punto interno[a]:

$$\forall x \in A, \quad \exists r > 0 \mid B(x_0, r) \subset A$$

[a] per ogni punto appartenente ad A esiste un intorno completamente contenuto nell'insieme (ne basta trovare uno per ogni punto).

Definizione : Insieme chiuso

Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice chiuso se $\overline{A}$ è aperto:

$$A \text{ chiuso se} \quad \forall x \in \overline{A}, \quad \exists r > 0 \mid B(x_0, r) \subset \overline{A}$$

Esempi di insiemi aperti e chiusi:

- **In $\mathbb{R}$:**
  - Aperto: $(0, 1)$
  - Chiuso: $[0, 1]$
- **In $\mathbb{R}^2$:**
  - Aperti:
    $$\left\{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\right\}, \quad \left\{(x, y) \mid x^2 + y^2 > 1\right\}, \quad \{(x, y) \mid x \neq 1 \wedge y \neq 0\}$$
  - Chiusi:
    $$\left\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\right\}, \quad \left\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \geq 1\right\}, \quad \left\{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\right\}$$
  - Né aperto né chiuso:
    $$\left\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1 \wedge x > 0\right\}$$

Complementare: se un insieme è aperto, il suo complementare è chiuso e viceversa:

$$\mathbb{R}^n \text{ aperto} \implies \emptyset \text{ chiuso}, \qquad \mathbb{R}^n \text{ chiuso} \implies \emptyset \text{ aperto}$$

5 Limiti di funzioni in più variabili

5.1 Definizioni e proprietà

5.1.1 Definizione di Limite

Definizione : Limite

p.100 analisi 2 libro in prestito

5.1.2 Importanza del punto di accumulazione nei limiti

5.1.3 Properietà dei Limiti

Teorema : Esistenza ed Unicità p.69

p.144 analisi 1 libro in prestito

Definizione : Forme Indeterminate

p.156 analisi 1 libro in prestito

Teorema : Teorema del confronto p.77

p.147 analisi 1 libro in prestito

5.1.4 Limiti in $\mathbb{R}^2$ - Coordinate Polari

p.189 analisi 1 libro in prestito

Definizione : Uniformemente rispetto a θ p.76

Sia

5.1.5 Continuità per funzioni in più variabili

Definizione : Continuità in $\mathbb{R}$

p.199 analisi 1 libro in prestito

Definizione : Continuità p.74

Sia

Definizione : Discontinuità in $\mathbb{R}$

p.202 analisi 1 libro in prestito

Definizione : Come dire se è una funzione continua o no?

p.204 -osservazione 1.1 analisi 1 libro in prestito

6 Ripasso Funzioni

6.1 Funzioni Classiche

6.2 Funzioni Trigonometriche

6.2.1 Funzioni Trigonometriche Classiche

p.224 analisi 1 libro in prestito

6.2.2 Funzioni Goniometriche Inverse

6.3 Funzioni Iperboliche

6.3.1 Funzioni Iperboliche Classiche

p.227 analisi 1 libro in prestito

6.3.2 Funzioni Iperboliche Inverse

7 Calcolo differenziale per funzioni in più variabili

7.1 Teoremi Fondamentali del Calcolo Differenziale in $\mathbb{R}$

p.261 analisi 1 libro in prestito

7.2 Derivate Direzioniali e Parziali

p.313 del libro analisi 1 in prestito

7.2.1 Derivata Direzionale

Teorema : Derivata Direzionale p.112

Sia

7.2.2 Derivata Parziale

7.2.3 Vettore Gradiente

p.315 del libro analisi 1 in prestito

Teorema : Definizione di Derivabilità con il vettore gradiente p.111

Sia

7.3 Differenziabilità

7.3.1 Definizione Differenziale

p.317 del libro analisi 1 in prestito

Teorema : Definizione di Differenzibilità p.115

Sia

7.3.2 Teoremi Differenziabilità

p.318 del libro analisi 1 in prestito
teorema 1.1, teorema 1.2

Teorema : Differenziabilità $\implies$ Continuità p.121

teorema 1.1 pagina 318 libro analisi 1 in prestito

Teorema : Teorema del differenziale totale p.122

teorema 1.2 pagina 320 libro analisi 1 in prestito

7.3.3 Derivabilità vs Differenziabilità

7.3.4 Teorema di Schwarz

Steorema 1.3 pagina 323 libro analisi 1 in prestito

Teorema : Teorema di Schwartz p.132

Sia

7.4 Formula di Taylor

p.328 libro analisi 1 in prestito

Teorema : Formula di Taylor con resto di Lagrange p.140

Sia

7.5 Altro

7.5.1 Curva Regolare

Teorema : Curva regolare p.103

Sia

7.5.2 Regola della catena

Teorema : Regola della catena p.124

Sia

Teorema : Proprietà del differenziale p.125

Sia

Teorema : Derivazione della funzione composta p.128

Sia

7.5.3 Massimo e Minimo

Teorema : Massimo e minimo locale p.143

Sia

Teorema : Massimo e minimo globale p.143

Sia

Teorema : Teorema di Fermat per funzioni in più variabili p.144

Sia

Teorema : Punti critici p.145

Sia

Teorema : Punti di sella p.145

Sia

Teorema : Test dell'Hessiana p.148

Sia

Teorema : Weierstrass p.151

Sia

Teorema : Moltiplicatori di Lagrange p.158

Sia

8 Rappresentazione di Funzioni in $\mathbb{R}^2$

8.1 Dominio

8.2 Grafico

8.3 Curve di Livello

p.365 libro analisi 1 in prestito

8.4 Insiemi di Livello

p.95 libro analisi 2 in prestito

9 Calcolo integrale per funzioni in più variabili

Teorema : Funzione integrabile secondo Riemann p.165

Sia

Teorema : Funzioni continue p.165

Sia

Teorema : Funzioni continue p.165

Sia

Teorema : Regione y-semplice p.172

Sia

Teorema : Regione x-semplice p.172

Sia

Teorema : Formula di Riduzione p.173

Sia

Teorema : Proprietà additività domini di integrazione p.173

Sia