

Statistica

Ede Boanini

29 maggio 2026

Indice


1	Introduzione	4
1.1	Classificazione delle Variabili	4
1.2	Distribuzioni di Frequenza	4
1.2.1	Tipi di Frequenza	5
2	Statistica Descrittiva	6
2.1	Diagrammi a barre vs Istogrammi	6
2.2	Media	7
2.3	Moda	7
2.4	Mediana	7
2.5	Quartili	8
2.6	Campo di Variazione / Range	9
2.7	Differenza Interquartile	9
2.8	Varianza	9
2.9	Deviazione standard	9
2.10	Coefficiente di variazione	9
3	Calcolo Combinatorio	10
3.1	Permutazioni Semplici	10
3.2	Permutazioni con Ripetizione	10
3.3	Disposizioni Semplici	11
3.4	Disposizioni con Ripetizione	12
3.5	Combinazioni	12
4	Probabilità	14
4.1	Operazione insiemi	14
4.2	Proprietà operazione tra eventi	14
4.3	Tipi di eventi	14
4.3.1	Eventi compatibili	14
4.3.2	Eventi incompatibili	14
4.3.3	Eventi complementari	14
4.4	Definizione	15

4.5	Assiomi	15
4.5.1	Conseguenze degli assiomi	15
4.6	Probabilità Totale	15
5	Probabilità Condizionata e Indipendenza	21
5.1	Probabilità Condizionata	21
5.2	Probabilità Congiunta / Composta	22
5.3	Eventi Indipendenti & Eventi Dipendenti	25
5.3.1	Come capire se due eventi sono dipendenti o indipendenti	26
5.3.2	Non confondere eventi indipendenti con eventi incompatibili	26
5.4	Fattorizzazione di un evento	27
5.5	Teorema della Probabilità Assoluta	29
5.6	Formula di Bayes	31
6	Variabili Aleatorie	36
6.1	Funzione di massa	36
6.2	Funzione di densità	37
6.3	Funzione di ripartizione	38
6.3.1	Funzione di ripartizione per variabile aleatoria discreta . .	38
6.3.2	Funzione di ripartizione per variabile aleatoria continua .	40
6.4	Valore atteso	41
6.4.1	Valore atteso di una variabile aleatoria discreta	41
6.4.2	Valore atteso di una variabile aleatoria continua	44
6.5	Varianza di una variabile aleatoria	44
6.6	Deviazione standard di una variabile aleatoria	46
6.7	Distribuzione di probabilità congiunta	47
6.7.1	Distribuzione di probabilità congiunta di variabili aleato- rie discrete	47
6.7.2	Distribuzione di probabilità congiunta di variabili aleato- rie continue	48
6.7.3	Funzione di ripartizione congiunta di variabili aleatorie . .	49
6.8	Funzioni di massa / densità di probabilità condizionate	49
6.8.1	Funzione di massa di probabilità condizionate	49
6.8.2	Funzione di densità di probabilità condizionate	50
6.9	Variabili aleatorie indipendenti	50
6.9.1	Variabili aleatorie discrete indipendenti	51
6.9.2	Variabili aleatorie continue indipendenti	51
6.10	Variabili aleatorie identicamente distribuite (i.d)	51
6.11	Variabili aleatorie indipendenti identicamente distribuite (i.i.d) .	52
7	Famiglie Parametriche	53
7.1	Distribuzioni per variabili discrete	53
7.1.1	Distribuzione di Bernoulli	53
7.1.2	Distribuzione Binomiale	54
7.1.3	Distribuzione di Poisson	56
7.2	Distribuzioni per variabili continue	58

7.2.1	Distribuzione Uniforme	58
7.2.2	Distribuzione Normale	59
7.2.3	Distribuzione Normale Standard	61
7.2.4	Proprietà di $\phi(\cdot)$	62
8	Inferenza Statistica	65
8.1	Distribuzione χ^2	68
8.2	Distribuzione T –Student	70
8.3	Teorema del Limite Centrale	74
8.4	Stima Puntuale	75
8.4.1	Funzione di Verosomiglianza	75
8.4.2	Funzione di Log-Verosomiglianza	75
8.4.3	Metodo della Massima Verosomiglianza	75
8.4.4	Metodi per valutare gli stimatori	81
8.5	Stima Intervallare	84
8.5.1	Come costruire gli intervalli di confidenza per n piccolo: Media	84
8.5.2	Come costruire gli intervalli di confidenza per n piccolo: Varianza	87
8.5.3	Come costruire gli intervalli di confidenza per n grande: Media	89
8.6	Verifica delle Ipotesi	92
8.6.1	Sistema di ipotesi	92
8.6.2	Errori del Test	94
8.6.3	Passi da seguire nella verifica delle ipotesi	94
8.6.4	p –value	96
8.6.5	Test di ipotesi sulla media di una popolazione normale con varianza nota	98
8.6.6	Test di ipotesi sulla media di una popolazione normale con varianza non nota	101
8.6.7	Test di ipotesi sulla media di una popolazione qualsiasi nel caso di grandi campioni	104
8.6.8	Test di ipotesi sulla varianza di una popolazione normale	106

1 Introduzione

1.1 Classificazione delle Variabili



Differenza tra ordinali e nominali:

- **Ordinali:** categorie che hanno un ordine, puoi solo dire se un valore è minore o maggiore rispetto ad un altro.
 - *Livello di istruzione:* $elementare < media < \dots$
 - *Grado di soddisfazione:* $nulla < basso < medio < \dots$
 - *Classifica di una gara:* $quinto < quarto < \dots$
 - *Matricola:* $17345 < 17346 < \dots$
- **Nominali:** categorie che non hanno un ordine.
 - *Colore occhi:* $blu, verdi, marroni, \dots$
 - *Genere:* M, F
 - *Marche auto:* $Toyota, Ford, \dots$
 - *Nazionalità:* $Giapponese, Italiano, \dots$

1.2 Distribuzioni di Frequenza

È una tabella che contiene modalità e frequenze.

Modalità di X (x_i)	Frequenze assolute f_i
x_1	f_1
x_2	f_2
$\dots$	$\dots$
x_n	f_n
	N

1.2.1 Tipi di Frequenza

1. **Frequenza assoluta:** numero di ripetizioni di una certa modalità (es: quanti studenti hanno preso 28 all'esame)

$$freq_{assoluta} = f_i$$

2. **Frequenza relativa:**

$$freq_{relativa} = \frac{f_i}{N}$$

3. **Frequenza percentuale:**

$$freq_{\%} = \frac{f_i}{N} \cdot 100$$

oppure

$$freq_{\%} = freq_{relativa} \cdot 100$$

4. **Frequenza cumulata:** somma progressiva delle frequenze assolute o relative.

$$freq_{cumulataAssoluta} = \sum_{i=1}^n f_i$$
$$freq_{cumulataRelativa} = \sum_{i=1}^n \frac{f_i}{N} = \sum_{i=1}^n freq_{relativa_i}$$

5. **Frequenza cumulata percentuale:**


$$freq_{cumulataAssoluta\%} = \sum_{i=1}^n f_i \cdot 100$$
$$freq_{cumulataRelativa\%} = \sum_{i=1}^n \frac{f_i}{N} \cdot 100 = \sum_{i=1}^n freq_{relativa_i} \cdot 100$$

2 Statistica Descrittiva

2.1 Diagrammi a barre vs Istogrammi

Definizione 2.1 (Diagrammi a barre). Descrivono la distribuzione di frequenza di una o più variabili qualitative (categoriche). Le barre devono avere tutte la stessa base ed essere equi-spaziate (lasciare un pò di spazio tra una barra e l'altra).

- altezza barre: frequenza




Definizione 2.2 (Istogrammi). Descrivono la distribuzione di frequenza di una o più variabili quantitative. Ogni barra rappresenta una classe e la sua frequenza.

- altezza barre: densità di frequenza

$$densita_{freq} = \frac{\text{Frequenza}}{\text{Ampiezza classe}}$$

- base barre: ampiezza delle classi



Osservazione: Definire k classi di uguale ampiezza

$$\text{Ampiezza classe} = \frac{\max - \min}{k}$$

I dati sulla statura di 48 adulti vanno da un minimo di 160 a 180 cm. Come fare k classi di uguale ampiezza?

1. Scelgo k (es: $k = 5$)
2. Uso formula $\text{Ampiezza classe} = \frac{\max - \min}{k}$ (es: $\text{Ampiezza classe} = \frac{180-160}{5} = 4$)

cm); quindi ogni classe avrà ampiezza 4.

3. Gli estremi inferiore della classe sono (contando ampiezza 4):

- 160
- 164
- 168
- 172
- 176

Conclusione: le $k = 5$ classi di ugual ampiezza sono:

[160, 164), [164, 168), [168, 172), [172, 176), [176, 180]

2.2 Media

Qual è il centro dei dati? **valore tipico** attorno a cui si concentrano i dati.

f_i indica la frequenza assoluta.

- **Formula della media per distribuzione di frequenze:** (variabili discrete)

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i \cdot f_i)}{N} = \sum_{i=1}^n (x_i \cdot freq_{relativa_i})$$

- **Formula della media per distribuzione di frequenze:** (variabili continue)

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n (m_i \cdot f_i)}{N} = \sum_{i=1}^n (m_i \cdot freq_{relativa_i})$$

dove a, b estremi dell'intervallo e $m_i = \frac{a+b}{2}$ il valore centrale della classe.

2.3 Moda

Qual è il centro dei dati? **valore tipico** attorno a cui si concentrano i dati.

La Moda è il valore che si ripete più spesso nei dati.

- **Formula della moda per distribuzione di frequenze:** (variabili discrete)

$$Moda = x_i \text{ con maggior frequenza}$$

- **Formula della media per distribuzione di frequenze:** (variabili continue)

$$Moda = \frac{a+b}{2}$$

Esempio Moda

Per esempio, per l'esame di analisi 2 ci sono stati tanti studenti che hanno preso tra il 20 e il 25 (classe), allora [20-25] è la classe modale. Pertanto, nel nostro esempio $Moda = \frac{20+25}{2} = 22.5$

2.4 Mediana

Qual è il centro dei dati? **valore tipico** attorno a cui si concentrano i dati.

La Mediana è il valore che è più grande (o uguale) della prima metà dei dati e allo stesso tempo, più piccolo (o uguale) della seconda metà dei dati.

È il valore che sta in mezzo a dati ordinati; quindi per poter stimare la Me è necessario ordinare i dati:

- **Formula della mediana per distribuzione di frequenze:** (variabili discrete)

1. Ordina i dati
2. Trova indice i :
 - se N pari: $i_1 = \frac{N}{2}$, $i_2 = \frac{N}{2} + 1$
 - se N dispari: $i = \frac{N}{2}$
3. La mediana è il valore associato all'indice trovato ($i = x_i$):
 - Se ho due indici i_1, i_2 , allora $Me = \frac{x_1 + x_2}{2}$
 - Se ho un solo indice i , allora $Me = x_i$

- **Formula della mediana per distribuzione di frequenze:** (variabili continue)

1. Calcola frequenza cumulata di ogni classe

$$freq_{cumulataAssoluta} = \sum_{i=1}^n f_i$$

2. Trova indice i :
 - se N pari: $i_1 = \frac{N}{2}$, $i_2 = \frac{N}{2} + 1$
 - se N dispari: $i = \frac{N}{2}$
3. Osserva i in che classe cade (vedi frequenza cumulata), allora $Me = classe$.
Oppure, se abbiamo due indici i_1, i_2 con valori x_1, x_2 , allora $Me = \frac{x_1 + x_2}{2}$

2.5 Quartili

Il p -esimo percentile è il valore che ha $\%p$ dei dati sotto/dietro di sé.

- Q_1 = 25-esimo percentile
(25% dei dati sotto questo valore)
- Q_2 = 50-esimo percentile = Mediana
(50% dei dati sotto questo valore)
- Q_3 = 75-esimo percentile
(75% dei dati sotto questo valore)

Divido la distribuzione in 4 parti uguali, per questo si chiamano "quartili".

- **Come trovare il Q_k per distribuzione di frequenze:** (variabili discrete)

1. Ordina i dati
2. Trova indice: $i = \frac{N+1}{4} \cdot k$
3. Q_k è il valore associato all'indice:
 - Se $i \in \mathbb{N}$, allora $Q_k = x_i$
 - Se $i \in \mathbb{Q}$, allora $Q_k = \frac{\text{somma dei valori associati}}{2}$

Esempio: se $i = 6.75$ allora $i_1 = 6, i_2 = 7$, e i valori associati a $i_1 = 20, i_2 = 25$, allora $Q_k = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{20 + 25}{2} = 22.5$

- **Come trovare il Q_k per distribuzione di frequenze:** (variabili continue)

1. Calcola frequenza cumulata di ogni classe

$$freq_{cumulataAssoluta} = \sum_{i=1}^n f_i$$

2. Trova indice: $i = \frac{N+1}{4} \cdot k$

3. Osserva i in che classe cade (vedi frequenza cumulata)

4. Allora avremo:

$$Q_k = L + \frac{i - f_{cumulata}}{f_i} \cdot h$$

dove:

- L : estremo inferiore della classe attuale (dell'indice)
- i : indice
- $f_{cumulata}$: frequenza cumulata classe precedente
- f_i : frequenza assoluta classe attuale
- h : ampiezza classe attuale

2.6 Campo di Variazione / Range

Distanza tra min e max.

$$Range = max - min$$

2.7 Differenza Interquartile

Si usano i quartili per capire la variabilità centrale.

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

2.8 Varianza

Quanto sono variabili i dati? i dati sono **vicini o molto sparsi**.

Quanto i dati si allontanano dalla loro media (μ oppure $\bar{x}$).

- **Formula varianza per distribuzione di frequenze:** (variabili discrete)

- Varianza della popolazione (P):

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{N}$$

- Varianza campionaria ($C \subseteq P$):

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}$$

2.9 Deviazione standard

Quanto sono variabili i dati? i dati sono **vicini o molto sparsi**.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

dove σ^2 è la varianza.

2.10 Coefficiente di variazione

Si calcola quando $\mu, \bar{x}, \sigma$ sono positivi e si esprime in percentuale.

$$CV = \frac{\sigma}{\mu} \quad \text{oppure} \quad CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$$

3 Calcolo Combinatorio

Ordine conta: $abc \neq cba$ vuol dire "2 modi diversi di ordinare gli elementi".

Ordine non conta: $abc = cba$ vuol dire "c'è solo 1 modo per ordinare gli elementi".

Trucco:

- **Permutazioni:** uso tutti gli n oggetti. Ordine conta
- **Disposizioni:** non uso tutti gli n oggetti ma solo r oggetti scelti dall'insieme dove $r < n$. Ordine conta
- **Combinazioni:** si parla di gruppi di k elementi. Ordine non conta

	Ordine conta?	Oggetti usati
Permutazioni	✓	Uso tutti gli n oggetti
Disposizioni	✓	Uso r oggetti su n
Combinazioni	✗	Uso gruppi di k oggetti su n

3.1 Permutazioni Semplici

Una permutazione semplice è un modo di ordinare in successione oggetti distinti (qui non esistono oggetti uguali tra loro, sono tutti distinti).

Teorema

Il **numero di permutazioni** di n oggetti distinti è il numero di modi diversi per ordinare tali oggetti.

$$P_n = n!$$

Esempio

Se ho 10 libri, allora avrò:

$$P_{10} = 10! = 3628800 \text{ modi diversi di ordinare 10 libri}$$

3.2 Permutazioni con Ripetizione

Una permutazione con ripetizione è un modo di ordinare oggetti tra cui alcuni uguali tra loro.

Teorema

Il **numero di permutazioni** di n oggetti alcuni uguali tra loro è il numero di modi diversi per ordinare tali oggetti.

$$P_{\text{numero di scatole}}^{\text{numero tot di oggetti}} = P_n^r = \frac{n!}{r_1! r_2! \cdots r_k!}$$

Devo pensarlo così:

1. Dividi gli oggetti distinti come se fossero scatole distinte, senza ripetizione (k = conta quante scatole sono)

2. Inserisci ogni oggetto nella corrispettiva scatola
(r = conta quanti oggetti ha ogni scatola)

Esempio

Se io ho la parola STATISTICA, ho $n = 10$ allora:

1. Dividi gli oggetti distinti come se fossero scatole distinte
(k = conta quante scatole sono)
S, T, A, I, C quindi $k = 5$ scatole
2. Inserisci ogni ripetizione nella corrispettiva scatola
(r = conta quanti oggetti ha ogni scatola)
 - scatola S: la parola ha 2 "S" ripetute, quindi $r_1 = 2$
STATISTICA
 - scatola T: la parola ha 3 "T" ripetute, quindi $r_2 = 3$
STATISTICA
 - scatola A: la parola ha 2 "A" ripetute, quindi $r_3 = 2$
STATISTICA
 - scatola I: la parola ha 2 "I" ripetute, quindi $r_4 = 2$
STATISTICA
 - scatola C: la parola ha 1 "C" ripetuta, quindi $r_5 = 1$
STATISTICA

Quindi:

$$P_{10}^5 = \frac{10!}{r_1!r_2!r_3!r_4!r_5!} = \frac{10!}{2!3!2!2!1!} = 75600 \text{ modi diversi di ordinare la parola}$$

3.3 Disposizioni Semplici

Nel caso delle disposizioni, non uso tutti gli n oggetti (come nelle permutazioni) ma solo un sottoinsieme scelto k di n dove $k \leq n$.

Teorema

Il **numero di disposizioni** di oggetti scelti k tra n oggetti totali distinti è il numero di modi diversi per ordinare k oggetti.

$$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

1. Scelgo k oggetti tra n oggetti totali
2. $D_{n,k}$ è il numero di modi diversi per ordinare k oggetti

Esempio

In quanti modi diversi posso sistemare su una libreria 7 libri scelti da un insieme di 20 libri?

$$D_{20,7} = \frac{20!}{(20-7)!} = 390700800$$

3.4 Disposizioni con Ripetizione

Nel caso delle disposizioni con ripetizione, non uso tutti gli n oggetti (come nelle permutazioni) ma solo un sottoinsieme scelto k di n dove $k \leq n$.

Teorema

Il **numero di disposizioni con ripetizione** di oggetti scelti k tra n oggetti totali distinti è il numero di modi diversi per ordinare k oggetti in cui alcuni possono ripetersi nella stessa sequenza.

$$D_{n,k}^R = n^k$$

Esempio

Quante password di 5 caratteri si possono creare con un alfabeto di 26 lettere?

1. Scelgo $k = 5$ sottoinsieme di $n = 26$
2. Alcune lettere possono ripetersi nella stessa sequenza

$$D_{26,5}^R = 26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 26 \cdot 26 = 26^5 = 11881376$$

3.5 Combinazioni

Nel caso delle combinazioni, si parla di gruppi il cui numero corrisponde esattamente a quanti oggetti k ho scelto da n . La scelta k corrisponde solo al numero da cui è formato ogni gruppo.

Ovvero, se io scelgo 10 oggetti su 20, allora ogni gruppo dovrà avere esattamente 10 oggetti. L'ordine non conta perchè l'importante è la presenza dell'oggetto all'interno del gruppo, che sia primo o ultimo non cambia niente.

La domanda è: quanti modi diversi ho di formare questi gruppi?

Teorema

Il **numero di combinazioni** è il numero di modi diversi per formare gruppi di k elementi ($k \leq n$).

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

1. Scelgo un numero k dove $k \leq n$
2. Ogni gruppo dovrà avere esattamente k oggetti
3. Quanti modi diversi ho di formare questi gruppi che contengono esattamente k oggetti?

Esempio

Ho 3 frutti diversi ma la io voglio fare merenda solo con 2. Quante tipe di merende posso creare con 2 frutti?

1. Scelgo $k = 2$ dove $2 < 3$
2. Ogni gruppo avrà esattamente 2 frutti

$$C_{3,2} = \binom{3}{2} = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{2!1!} = \frac{6}{2} = 3$$

Ho 3 modi diversi di formare gruppi di 2 frutti, quindi ho 3 tipi di merende diverse.

Esempio

Voglio giocare a basket e devo formare 2 gruppi di persone per la partita. So che ogni squadra deve avere esattamente 5 giocatori. Le persone che si son presentate come candidate sono 40. Quanti modi diversi ho per formare una squadra? e per formarne due? sapendo che la persona non può essere contemporaneamente scelta in entrambe?

1. Scelgo $k = 5$ dove $5 < 40$
2. Ogni gruppo avrà esattamente 5 persone

$$C_{40,5} = \binom{40}{5} = \frac{40!}{5!(40-5)!} = 657708 \text{ modi diversi per formare una sola squadra}$$

Ho 657708 modi diversi di formare gruppi di 5 persone, quindi posso scegliere 1 tra 657708 da mandare in campo.

3. Se invece voglio formare due squadre (sapendo che la stessa persona non può essere in entrambe) ? quante scelte avrei?

$$\text{Prima squadra: } C_{40,5} = \binom{40}{5} = \frac{40!}{5!(40-5)!} = 657708$$

Dato che le persone non possono ripetersi, se io ho formato la prima squadra, avrò per la seconda 35-5 persone ancora disponibili (perchè 5 le ho già scelte nella 1ª squadra):

$$\text{Seconda squadra: } C_{35,5} = \binom{35}{5} = \frac{35!}{5!(35-5)!} = 324632$$

Quindi i diversi modi per formare le due squadre saranno in totale $657708 \cdot 324632 = 213846580000$

4 Probabilità

4.1 Operazione insiemi

$$\begin{aligned}A_1 \cup A_2 &= \{\omega \mid \omega \in A_1 \vee \omega \in A_2\} \\A_1 \cap A_2 &= \{\omega \mid \omega \in A_1 \wedge \omega \in A_2\} \\A_1 - A_2 &= \{\omega \mid \omega \in A_1 \wedge \omega \notin A_2\} \\\overline{A} &= \{\omega \mid \omega \notin A\}\end{aligned}$$

4.2 Proprietà operazione tra eventi

Siano A_1, A_2, A_3 tre eventi.

- **Proprietà commutativa:** l'ordine non cambia il risultato

$$E_1 \cup E_2 = E_2 \cup E_1$$

$$E_1 \cap E_2 = E_2 \cap E_1$$

- **Proprietà associativa:**

$$(E_1 \cup E_2) \cup E_3 = E_1 \cup (E_2 \cup E_3)$$

$$(E_1 \cap E_2) \cap E_3 = E_1 \cap (E_2 \cap E_3)$$

- **Proprietà distributiva:**

$$(E_1 \cup E_2) \cap E_3 = (E_1 \cap E_3) \cup (E_2 \cap E_3)$$

$$(E_1 \cap E_2) \cup E_3 = (E_1 \cup E_3) \cap (E_2 \cup E_3)$$

- **Leggi di De Morgan:**

$$\overline{E_1 \cap E_2} = \overline{E_1} \cup \overline{E_2}$$

$$\overline{E_1 \cup E_2} = \overline{E_1} \cap \overline{E_2}$$

4.3 Tipi di eventi

4.3.1 Eventi compatibili

Due eventi che possono verificarsi congiuntamente.

$$A_1, A_2 \text{ compatibili} \iff A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$$

4.3.2 Eventi incompatibili

Due eventi che non possono verificarsi congiuntamente.

$$A_1, A_2 \text{ incompatibili} \iff A_1 \cap A_2 = \emptyset$$

4.3.3 Eventi complementari

Due eventi che non possono verificarsi congiuntamente e tale che uno dei due si verifica di sicuro.

$$A_1, A_2 \text{ complementari} \iff \begin{cases} A_1 \cap A_2 = \emptyset \\ A_1 \cup A_2 = \Omega \end{cases}$$

4.4 Definizione

Sia A un evento e Ω lo spazio campionario. Definisco $P(A)$ la probabilità che si verifichi A dove $0 \leq P(A) \leq 1$:

$$P(A) = \frac{\text{numero di casi favorevoli}}{\text{numero di casi possibili}}$$

4.5 Assiomi

1. **Primo assioma:** la probabilità di un evento A è un numero reale non negativo
2. **Secondo assioma:** la probabilità dell'intero spazio campionario è uguale a 1
$$P(\Omega) = 1$$
3. **Terzo assioma:** Se A_1, A_2 sono eventi **incompatibili**, allora la probabilità dell'unione dei due eventi è la somma delle loro probabilità

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2)$$

4.5.1 Conseguenze degli assiomi

1. **Probabilità del complementare di un evento:**

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

oppure:

$$P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

2. **Probabilità dell'evento impossibile:**

$$P(\emptyset) = 0$$

3. **Proprietà di monoticità:** Se B è un evento incluso in un evento A , allora la probabilità di B è minore o uguale alla probabilità di A

$$B \subseteq A \implies P(B) \leq P(A)$$

4. **Probabilità dell'unione di eventi incompatibili:** la probabilità dell'unione di eventi incompatibili è la somma delle loro probabilità

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

4.6 Probabilità Totale

Teorema : Teorema delle probabilità totali a 2 eventi

Siano A_1, A_2 due eventi, la probabilità dell'unione dei due eventi è uguale alla somma delle due probabilità meno la loro intersezione:

$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$$

Vuol dire: "probabilità che si verifichi almeno uno dei due eventi"

- Se i due eventi sono incompatibili $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ allora,
$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) + P(A_2) - \emptyset = P(A_1) + P(A_2)$$

(assioma 3)
- Se i due eventi sono compatibili $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$ allora,
$$P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$$

(resta uguale)

Teorema : Teorema delle probabilità totali a k eventi

Siano k eventi, la probabilità dell'unione di k eventi è uguale a:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = & \sum_{i=1}^k P(A_i) + \\ & - \sum_{1 \leq i < j \leq k} P(A_i \cap A_j) + \\ & + \sum_{1 \leq i < j < r \leq k} P(A_i \cap A_j \cap A_r) + \\ & - \sum_{1 \leq i < j < r < s \leq k} P(A_i \cap A_j \cap A_r \cap A_s) + \\ & \dots \\ & + (-1)^{k+1} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4 \cap \dots \cap A_k) = \end{aligned}$$

Ovvero:

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = & \text{somma delle probabilità dei singoli eventi} + \\ & - [\text{somma dell'intersezioni degli eventi presi 2 a 2}] + \\ & + [\text{somma dell'intersezioni degli eventi presi 3 a 3}] + \\ & - [\text{somma dell'intersezioni degli eventi presi 4 a 4}] + \\ & \dots \\ & + / - [\text{somma dell'intersezioni degli eventi presi } k \text{ a } k] \end{aligned}$$

Vuol dire: "probabilità che si verifichi almeno uno tra i k eventi"

Esercizio

Una segretaria distratta prepara 3 lettere e 3 buste da inviare a 5 persone diverse e mette le lettere nelle buste a caso.

Qual è la probabilità che almeno una delle 3 lettere sia inserita nella busta corrispondente?

1. Descrivi a parole quanto richiesto nell'esercizio:
 E =almeno una delle tre lettere è inserita nella busta corrispondente
2. Suddividi l'evento:
 - (a) E_1 =la lettera 1 è nella busta 1
 - (b) E_2 =la lettera 2 è nella busta 2
 - (c) E_3 =la lettera 3 è nella busta 3
 - (d) Quindi, l'evento E =almeno una delle tre lettere è inserita nella busta corrispondente diventa:
 $E = E_1 \cup E_2 \cup E_3$
 - (e) Qual è la probabilità che si verifichi $E = E_1 \cup E_2 \cup E_3$?
Infatti qui si calcola la probabilità che almeno uno si verifichi.

Dunque applico la formula di probabilità totale per 3 eventi:

$$\begin{aligned} P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = & [P(E_1) + P(E_2) + P(E_3)] + \\ & - [P(E_1 \cap E_2) + P(E_1 \cap E_3) + P(E_2 \cap E_3)] \\ & + [P(E_1 \cap E_2 \cap E_3)] = \end{aligned}$$

- $P(E_1) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{?}{3!} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

Casi favorevoli che accada $P(E_1)$:

- 123
- 132
- ~~213~~
- ~~231~~
- ~~312~~
- ~~321~~

2 casi favorevoli.

- $P(E_2) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{1}{3}$

Casi favorevoli che accada $P(E_2)$: uguale a $P(E_1)$

- $P(E_3) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{1}{3}$

Casi favorevoli che accada $P(E_3)$: uguale a $P(E_1)$

- $P(E_1 \cap E_2) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{?}{3!} = \frac{1}{6}$

Casi favorevoli che accada $P(E_1 \cap E_2)$, ovvero che la lettera 1 sia in prima posizione e allo stesso tempo 2 sia alla seconda posizione:

- 123
- ~~132~~
- ~~213~~
- ~~231~~
- ~~312~~
- ~~321~~

1 caso favorevole.

- $P(E_1 \cap E_3) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \text{uguale a } P(E_1 \cap E_2) = \frac{1}{6}$

- $P(E_2 \cap E_3) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \text{uguale a } P(E_1 \cap E_2) = \frac{1}{6}$

- $P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{?}{3!} = \frac{1}{6}$

Casi favorevoli che accada $P(E_1 \cap E_2 \cap E_3)$, ovvero che allora stesso tempo la lettera 1 sia in prima posizione, la 2 in seconda posizione e la 3 in terza posizione:

- 123
- ~~132~~
- ~~213~~
- ~~231~~
- ~~312~~
- ~~321~~

1 caso favorevole.

Pertanto la formula:

$$\begin{aligned}
 P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) &= [P(E_1) + P(E_2) + P(E_3)] + \\
 &\quad - [P(E_1 \cap E_2) + P(E_1 \cap E_3) + P(E_2 \cap E_3)] \\
 &\quad + [P(E_1 \cap E_2 \cap E_3)] =
 \end{aligned}$$

Sostituendo con i valori trovati, diventa:

$$P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right] + \\ - \left[\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right] + \left[\frac{1}{6} \right] = \frac{2}{3} = 0.67 \quad \text{Risposta corretta}$$

Oppure posso utilizzare la negazione $P(E) = 1 - P(\overline{E})$:

- E = almeno una delle tre lettere è inserita nella busta corrispondente
- $\overline{E}$ = nessuna delle tre lettere è inserita nella busta corrispondente

Usando la negazione: $\overline{E}$ = nessuna delle tre lettere è inserita nella busta corrispondente

- $\overline{E_1}$ = la lettera 1 non è nella busta 1
- $\overline{E_2}$ = la lettera 2 non è nella busta 2
- $\overline{E_3}$ = la lettera 3 non è nella busta 3

e quindi se voglio che accadano tutti gli eventi insieme allora sarebbe intersezione e non unione (probabilità congiunta):

$\overline{E}$ = nessuna delle tre lettere è inserita nella busta corrispondente $\implies \overline{E} = \overline{E_1} \cap \overline{E_2} \cap \overline{E_3}$
quindi uso la formula della probabilità congiunta per 3 eventi:

$$P(\overline{E}) = P(\overline{E_1} \cap \overline{E_2} \cap \overline{E_3}) = \\ = P(\overline{E_1}) \cdot P(\overline{E_2} \mid \overline{E_1}) \cdot P(\overline{E_3} \mid \overline{E_1} \cap \overline{E_2}) \\ = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\bullet P(\overline{E_1}) = \frac{\text{numero casi favorevoli}}{\text{numero casi possibili}} = \frac{4}{3!} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Uso tutti gli elementi, ordine conta, ripetizioni no $\implies$ permutazioni semplici $n!$

Quindi, casi possibili $3! = 6$, ovvero 6 possibili modi di ordinare gli elementi:

- 123
- 132
- 213
- 231
- 312
- 321

1. casi favorevoli che accade $P(\overline{E})$, ovvero tutte le combinazioni in cui 1 non è nella prima posizione:

- ~~123~~
- ~~132~~
- 213
- 231
- 312
- 321

Ci sono 4 combinazioni favorevoli

$$\bullet P(\overline{E_2} \mid \overline{E_1}) = \frac{\overline{E_2} \cap \overline{E_1}}{P(\overline{E_1})} = \frac{?}{\frac{2}{3}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2}{3}} = \frac{3}{4}$$

tutte e due le buste non vanno nelle buste corrispondenti:

$$P(\overline{E_2} \cap \overline{E_1}) = \frac{\text{numero casi favorevoli}}{\text{numero casi possibili}} = \frac{?}{3!} = \frac{3}{3!} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

casi favorevoli che accade $P(\overline{E})$, ovvero tutte le combinazioni in cui 1, 2 non sono nella corrispettiva posizione:

- ~~123~~
- ~~132~~
- 213
- 231
- 312
- ~~321~~

Ci sono 3 combinazioni favorevoli

$$\bullet P(\overline{E_3} \mid \overline{E_1} \cap \overline{E_2}) = \frac{P(\overline{E_3} \cap \overline{E_1} \cap \overline{E_2})}{P(\overline{E_1} \cap \overline{E_2})} = \frac{?}{\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$$

tutte e tre le buste non vanno nelle buste corrispondenti:

$$P(\overline{E_3} \cap \overline{E_1} \cap \overline{E_2}) = \frac{\text{numero casi favorevoli}}{\text{numero casi possibili}} = \frac{?}{3!} = \frac{2}{3!} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

casi favorevoli che accada $P(\overline{E_3} \cap \overline{E_1} \cap \overline{E_2})$, ovvero tutte le combinazioni in cui 1, 2, 3 non sono nella corrispettiva posizione:

- ~~123~~
- ~~132~~
- ~~213~~
- 231
- 312
- ~~321~~

Ci sono 2 combinazioni favorevoli

Pertanto:

$$P(E) = 1 - P(\overline{E}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} = 0.67 \quad \text{Risposta corretta}$$

Oppure un modo più veloce sempre con la negazione $P(E) = 1 - P(\overline{E})$:

$\overline{E}$ = nessuna delle tre lettere è inserita nella busta corrispondente

- $\overline{E_1}$ = la lettera 1 non è nella busta 1
- $\overline{E_2}$ = la lettera 2 non è nella busta 2
- $\overline{E_3}$ = la lettera 3 non è nella busta 3

Voglio calcolare $P(\overline{E}) = P(\overline{E_1} \cap \overline{E_2} \cap \overline{E_3})$ e poi fare $P(E) = 1 - P(\overline{E})$, quindi:

1. Elenco tutti i possibili modi di ordinare le buste:

- 123
- 132
- 213
- 231
- 312
- 321

2. Tengo fissato un ordine (lettera 1 - busta 1 - prima posizione; lettera 2 - busta 2 - seconda posizione; lettera 3 - busta 3 - terza posizione)

3. Elimino i casi in cui 1 è nella prima posizione $\wedge$ 2 è nella seconda posizione $\wedge$ 3 è nella terza posizione:

- ~~123~~ - elimino perchè 1 è nella prima posizione, 2 nella seconda, 3 nella terza
- ~~132~~ - elimino perchè 1 è nella prima posizione
- ~~213~~ - elimino perchè 3 è nella terza posizione

- 231
- 312
- ~~321~~ - elimino perchè 2 è nella seconda posizione

Mi rimangono 2 casi favorevoli.

4. Pertanto, $P(\overline{E}) = P(\overline{E_1} \cap \overline{E_2} \cap \overline{E_3}) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{2}{3!} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

5. Alla fine:

$$P(E) = 1 - P(\overline{E}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} = 0.67 \quad \text{Risposta corretta}$$

5 Probabilità Condizionata e Indipendenza

5.1 Probabilità Condizionata

Teorema

Si definisce probabilità condizionata la **probabilità che si verifichi un evento E sapendo che si è già verificato l'evento B** : "probabilità di E dato B ."

$$P(E \mid B) = \frac{P(E \cap B)}{P(B)}$$

Inoltre, si ricavano le seguenti formule:

$$P(E \cap B) = P(E \mid B) \cdot P(B)$$

e:

$$P(B) = \frac{P(E \cap B)}{P(E \mid B)}$$

Prima osservazione:

$$\begin{aligned} P(E \cup A \mid B) &= \frac{P((E \cup A) \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{P((E \cap B) \cup (A \cap B))}{P(B)} \\ &= \text{per teorema delle probabilità totali}^1 \\ &= \frac{P(E \cap B) + P(A \cap B) - P(E \cap B \cap A)}{P(B)} \end{aligned}$$

Seconda osservazione:

$$P(E \cap A \mid B) = \frac{P(E \cap A \cap B)}{P(B)}$$

Terza osservazione:

$$\begin{aligned} P(\overline{E} \mid B) &= 1 - P(E \mid B) \\ P(E \mid B) &= 1 - P(\overline{E} \mid B) \end{aligned}$$

¹ $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$

Osservazione:

$$P(E | \bar{B}) = \frac{P(E \cap \bar{B})}{P(\bar{B})} =$$

per l'assioma 3

$$= \frac{P(E \cap \bar{B})}{1 - P(B)} =$$

sapendo che $P(E \cap \bar{B}) = P(E | \bar{B}) \cdot P(\bar{B})$ e che,

le due probabilità sono non nulle $P(E), P(\bar{B}) \neq 0$,

allora posso usare $P(E \cap \bar{B}) = P(\bar{B} | E) \cdot P(E)$

poichè il risultato di $P(E \cap \bar{B})$ rimane invariato. Quindi:

$$= \frac{P(\bar{B} | E) \cdot P(E)}{1 - P(B)} =$$

$$= \frac{P(\bar{B} | E) \cdot P(E)}{1 - P(B)} =$$

per l'assioma 3

$$= \frac{(1 - P(B | E)) \cdot P(E)}{1 - P(B)} =$$

5.2 Probabilità Congiunta / Composta

La probabilità congiunta è la probabilità che due o più eventi si verifichino insieme (accadano entrambi), ossia che si verifichi l'intersezione degli eventi.

Teorema : Legge delle probabilità composte per 2 eventi

Si definisce probabilità congiunta la **probabilità che si verifichino entrambi gli eventi**:

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_2 | A_1) \cdot P(A_1) \text{ con } P(A_1) \neq 0$$

Oppure:

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1 | A_2) \cdot P(A_2) \text{ con } P(A_2) \neq 0$$

Se entrambe sono non nulle, $P(A_1) \wedge P(A_2) \neq 0$, allora posso usare una delle due formule, il risultato rimane invariato:

Posso usare questa:

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_2 | A_1) \cdot P(A_1)$$

Oppure questa:

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_1 | A_2) \cdot P(A_2)$$

Prima osservazione: $P(A_1) \neq 0$

$$P(A_1 \cap A_2) = P(A_2 | A_1) \cdot P(A_1)$$

$$= \frac{P(A_2 \cap A_1)}{P(A_1)} \cdot P(A_1)$$

$$= P(A_2 \cap A_1) \text{ giusto, intersezione è simmetrica, } P(A_1 \cap A_2) = P(A_2 \cap A_1)$$

Seconda osservazione: $P(A_2) \neq 0$

$$P(A_2 \cap A_1) = P(A_1 | A_2) \cdot P(A_2)$$

$$= \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_2)} \cdot P(A_2)$$

$$= P(A_1 \cap A_2) \text{ giusto, intersezione è simmetrica, } P(A_1 \cap A_2) = P(A_2 \cap A_1)$$

Teorema : Legge delle probabilità composte per k eventi

Generalizzato a k eventi, questa formula vale solo se gli eventi su cui condizioniamo^a sono maggiori di zero $P(X) > 0$:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k) = \prod_{i=1}^k P\left(A_i \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} A_j\right)$$

Ovvero:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdot \\ \cdot P(A_4 | A_1 \cap A_2 \cap A_3) \cdots P(A_k | A_1 \cap \dots \cap A_{k-1})$$

^aeventi su cui condizioniamo sono quelli in rosso, dopo la sbarra: $P(A_1 | \textcolor{red}{X})$

Esercizio

Un cliente di un'azienda acquista 3 pc da un lotto di 50 pc di cui 4 sono difettosi. Qual è la probabilità che tutti i 3 pc acquistati siano difettosi?

Ricordo che: intersezione = $\cap = \wedge = AND$

1. Descrivi a parole quanto richiesto in un evento:
 E = tutti i pc acquistati sono difettosi
2. Suddividi l'evento:
 - (a) E_1 = primo pc difettoso
 - (b) E_2 = secondo pc difettoso
 - (c) E_3 = terzo pc difettoso
3. Quindi, l'evento E = tutti i pc acquistati sono difettosi diventa:
 $E = E_1 \cap E_2 \cap E_3$
4. Qual è la probabilità che si verifichi $E = E_1 \cap E_2 \cap E_3$? Infatti qui si calcola la probabilità che si verifichino tutti gli eventi insieme

Dunque applico formula della probabilità congiunta/composta:

$$P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = P(E_1) \cdot P(E_2 | E_1) \cdot (E_3 | E_1 \cap E_2)$$

$$P(E_1) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{4}{50}$$

$$P(E_2 | E_1) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{3}{49}$$

$$P(E_3 | E_1 \cap E_2) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{2}{48}$$

Dunque:

$$P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = \frac{4}{50} \cdot \frac{3}{49} \cdot \frac{2}{48} = 0.0002 = 0.02\%$$

Esercizio

Se invece fosse stato: Qual è la probabilità che **almeno uno dei pc fosse difettoso**?
Non avrei utilizzato probabilità congiunta ma teorema delle probabilità totali (unione).
Ricordo che: l'unione $= \cup = \vee = OR$

1. Descrivo a parole quanto richiesto in un evento:
 E = almeno un pc acquistato è difettoso
2. Suddividi l'evento:
 - (a) E_1 = primo pc difettoso
 - (b) E_2 = secondo pc difettoso
 - (c) E_3 = terzo pc difettoso
3. Quindi, l'evento E = almeno un pc acquistato è difettoso, diventa:
 $E = E_1 \cup E_2 \cup E_3$
4. Qual è la probabilità che si verifichi $E = E_1 \cup E_2 \cup E_3$?

Dunque, ho due approcci:

- **Uso formula delle probabilità totali a $k = 3$ eventi:**

$$\begin{aligned} P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) &= [P(E_1) + P(E_2) + P(E_3)] + \\ &\quad - [P(E_1 \cap E_2) + P(E_1 \cap E_3) + P(E_2 \cap E_3)] + \\ &\quad + [P(E_1 \cap E_2 \cap E_3)] = \end{aligned}$$

quindi:

- $P(E_1) = ?$
- $P(E_2) = ?$
- $P(E_3) = ?$
- $P(E_1 \cap E_2) = ?$
- $P(E_1 \cap E_3) = ?$
- $P(E_2 \cap E_3) = ?$
- $P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = ?$

$$\begin{aligned} P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) &= [P(E_1) + P(E_2) + P(E_3)] + \\ &\quad - [P(E_1 \cap E_2) + P(E_1 \cap E_3) + P(E_2 \cap E_3)] + \\ &\quad + [P(E_1 \cap E_2 \cap E_3)] = \end{aligned}$$

Se avessi tutti i dati, sarebbe facile, ma dato che non li ho è meglio il secondo approccio.

- **Uso negazione dell'evento:**

La negazione di "almeno uno dei pc è difettoso" è "nessuno dei pc è difettoso".
Quindi posso usare la seguente formula:

$$P(E) = 1 - P(\bar{E})$$

1. Descrivi a parole l'evento contrario:
 $\bar{E}$ = nessuno dei pc è difettoso
2. Suddividi l'evento:
 - (a) E_1 = primo pc funzionante
 - (b) E_2 = secondo pc funzionante
 - (c) E_3 = terzo pc funzionante

3. Quindi, l'evento $\overline{E}$ =nessuno dei pc è difettoso diventa:
 $\overline{E} = E_1 \cap E_2 \cap E_3$
4. Qual è la probabilità che si verifichi $\overline{E} = E_1 \cap E_2 \cap E_3$? Applico probabilità congiunta/composta:

$$P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = P(E_1) \cdot P(E_2 | E_1) \cdot (E_3 | E_1 \cap E_2)$$

$$P(E_1) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{46}{50}$$

$$P(E_2 | E_1) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{45}{49}$$

$$P(E_3 | E_1 \cap E_2) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{44}{48}$$

Dunque:

$$P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = \frac{46}{50} \cdot \frac{45}{49} \cdot \frac{44}{48} = 0.774$$

Quindi:

$$P(E) = 1 - P(\overline{E}) = 1 - 0.774 = 0.226 = 22.6\%$$

Pertanto, la probabilità che almeno uno dei pc sia difettoso è $P(E) = 0.226$

5.3 Eventi Indipendenti & Eventi Dipendenti

Teorema : Probabilità dell'intersezione di 2 eventi indipendenti

Siano E_1, E_2 due eventi **indipendenti**.

La probabilità della loro intersezione è uguale al prodotto delle singole probabilità:

$$P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2)$$

La probabilità che si verifichi uno non modifica la probabilità dell'altro.

Teorema : Indipendenza debole di k eventi

Siano k eventi. $E_1, E_2, \dots, E_k$ sono **indipendenti due a due** se, presa l'intersezione di tutti gli eventi due a due, sono tutti indipendenti:

$$P(E_i \cap E_j) = P(E_i) \cdot P(E_j) \quad \forall i < j$$

Ovvero:

Considero E_1, E_2, E_3 . Essi sono indipendenti due a due se valgono tutte le uguaglianze:

- $P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2)$
- $P(E_1 \cap E_3) = P(E_1) \cdot P(E_3)$
- $P(E_2 \cap E_3) = P(E_2) \cdot P(E_3)$

Teorema : Indipendenza forte di k eventi

Siano k eventi. $E_1, E_2, \dots, E_k$ sono **reciprocamente indipendenti** se, presa

l'intersezione di tutti gli eventi due a due, sono tutti indipendenti:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^k E_i\right) = \prod_{j=1}^k P(E_j)$$

Ovvero:

Considero E_1, E_2, E_3 . Essi sono reciprocamente indipendenti se valgono tutte le uguaglianze:

- $P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2)$
- $P(E_1 \cap E_3) = P(E_1) \cdot P(E_3)$
- $P(E_2 \cap E_3) = P(E_2) \cdot P(E_3)$
- $P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = P(E_1) \cdot P(E_2) \cdot P(E_3)$

5.3.1 Come capire se due eventi sono dipendenti o indipendenti

Basta verificare questa uguaglianza:

$$P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2)$$

1. Calcolo la probabilità a sinistra dell'uguale: $\underbrace{P(A \cap B)}_{\text{questa}} = P(E_1) \cdot P(E_2)$

Secondo la formula classica:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A) = x$$

2. Calcolo la probabilità a destra dell'uguale: $P(A \cap B) = \underbrace{P(E_1) \cdot P(E_2)}_{\text{questa}}$

$$P(E_1) \cdot P(E_2) = y$$

3. Se:

- $x = y \implies$ gli eventi E_1, E_2 sono indipendenti
- $x \neq y \implies$ gli eventi E_1, E_2 sono dipendenti

5.3.2 Non confondere eventi indipendenti con eventi incompatibili

Ricorda che:

- **Eventi incompatibili:** eventi che non possono verificarsi contemporaneamente $E \cap F = \emptyset$ e ciò vuol dire che $P(E \cap F) = 0$.

Lancio un dado, qual è probabilità che esca 1 e 6 allo stesso tempo?

- E = esce 1
- F = esce 6

È facile capire che è impossibile che il dado mostri due facce allo stesso tempo, quindi $E \cap F = \emptyset$.

Inoltre, $P(E \cap F) = 0$ perchè $E \cap F = \emptyset$ e quindi $P(E \cap F) = P(\emptyset) = 0$

- **Eventi indipendenti:** eventi che possono verificarsi insieme ma la probabilità di uno non cambia la probabilità dell'altro.

Lancio un dado e una moneta, qual è probabilità che esca 1 e testa allo stesso tempo?

- E = esce 1
- F = esce testa

È facile capire che il verificarsi di E non influenza il verificarsi di F , quindi $E \cap F \neq \emptyset$.

^a $\emptyset$: evento impossibile

5.4 Fattorizzazione di un evento

Formula probabilità condizionata:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

posso modificarla algebricamente e ottenere:

$$P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

Osservazione:

Siano A, B due eventi, vale sempre:

$$A = A \cap (B \cup \overline{B}) \implies A = (A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})$$

B e $\overline{B}$ sono incompatibili, non possono capitare insieme:

- B = ho passato Statistica
- $\overline{B}$ = non ho passato Statistica

è ovvio che non possono accadere insieme, l'hai passata oppure no.

Quindi, B e $\overline{B}$ sono incompatibili:

$$B \cap \overline{B} = \emptyset$$

Pertanto, **se B e $\overline{B}$ sono incompatibili anche gli eventi $(A \cap B)$ e $(A \cap \overline{B})$ lo sono.**

Teorema : Fattorizzazione di un evento

La fattorizzazione di un evento si scrive come:

$$P(A \cap B) = P(A | B) \cdot P(B)$$

Quindi:

$$\begin{aligned} P(A) &= \text{per l'osservazione fatta} = P((A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})) = \\ &= (P(A \cap B) \cup P(A \cap \overline{B})) = \text{formula fattorizzazione evento} = (P(A | B) \cdot P(B)) \cup (P(A | \overline{B}) \cdot P(\overline{B})) = \\ &= {}^2 \text{per il 4}^{\text{o}} \text{ assioma} = (P(A | B) \cdot P(B)) + (P(A | \overline{B}) \cdot P(\overline{B})) \end{aligned}$$

²dato che gli eventi $(A \cap B)$ e $(A \cap \overline{B})$ sono incompatibili ricordando il 4^o assioma:

Probabilità dell'unione di eventi incompatibili: la probabilità dell'unione di eventi incompatibili è la somma delle loro probabilità

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Esercizio

Siano due eventi:

- M = avere una certa malattia
- T = il risultato del test è positivo

Siano i seguenti dati

- $P(M) = 0.01$
Probabilità di avere una certa malattia
- $P(T | M) = 0.9$
Probabilità che il test sia positivo quando ho già una certa malattia
- $P(\bar{T} | \bar{M}) = 0.98$
Probabilità che il test sia negativo quando so di non avere una certa malattia

Qual è la probabilità che il test sia positivo? $P(T) = ?$

Ricordo dall'osservazione che:

$$T = (T \cap M) \cup (T \cap \bar{M})$$

Dato che $M, \bar{M}$ sono incompatibili, anche $T \cap M$ e $T \cap \bar{M}$ lo sono. Quindi:

$$\begin{aligned} P(T) &= P((T \cap M) \cup (T \cap \bar{M})) \\ &= (P(T \cap M) \cup P(T \cap \bar{M})) \\ &= \text{per l'assioma 4} \\ &= P(T \cap M) + P(T \cap \bar{M}) \\ &= \text{per la formula di fattorizzazione} \\ &= P(T | M) \cdot P(M) + P(T | \bar{M}) \cdot P(\bar{M}) \\ &= 0.9 \cdot 0.01 + 0.02 \cdot 0.99 \\ &= 0.009 + 0.0198 = 0.0288 \quad \text{Risposta corretta} \end{aligned}$$

Mi manca trovare:

- $P(T | \bar{M}) = ?$

Ricordo che $P(E) = 1 - P(\bar{E})$, di conseguenza:

$$P(T | \bar{M}) = 1 - P(\bar{T} | \bar{M}) = 1 - 0.98 = 0.02$$

- $P(\bar{M}) = ?$

Ricordo che $P(\bar{E}) = 1 - P(E)$, di conseguenza:

$$P(\bar{M}) = 1 - P(M) = 1 - 0.01 = 0.99$$

5.5 Teorema della Probabilità Assoluta

Questo teorema vale se e solo se:

- Nessuno degli eventi è l'evento impossibile

$$E_i \neq \emptyset \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

- Tutti gli eventi sono due a due incompatibili

$$E_i \cap E_j = \emptyset \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad i \neq j$$

- L'unione degli eventi corrisponde allo spazio campionario ("l'unione contiene tutti gli esiti possibili"), ovvero gli eventi formano una partizione di Ω

$$\bigcup_i E_i = \Omega$$

Nell'esempio di un dado, $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$:

- E_1 = esce 1
- E_2 = esce 2
- E_3 = esce 3
- E_4 = esce 4
- E_5 = esce 5
- E_6 = esce 6

$$\bigcup_i E_i = \Omega \implies E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_4 \cup E_5 \cup E_6 = \Omega \implies 1 \cup 2 \cup 3 \cup 4 \cup 5 \cup 6 = \Omega$$

Teorema : Teorema della Probabilità Assoluta per 2 eventi

Questa è valida solo quando ho 2 eventi nello spazio campionario.

Siano E_1, E_2 due eventi:

- con probabilità non nulle $P(E_1), P(E_2) \neq 0$
- incompatibili
- partizioni di Ω

La formula della probabilità assoluta se voglio calcolare $P(E_1)$:

$$\begin{aligned} P(E_1) &= P(E_1 | E_2) \cdot P(E_2) + P(E_1 | \overline{E_2}) \cdot P(\overline{E_2}) = \\ &\text{ma } E_1, E_2 \text{ incompatibili, quindi } P(E_1 | E_2) = 0 \\ &= P(E_1 | \overline{E_2}) \cdot P(\overline{E_2}) = \end{aligned}$$

oppure se voglio calcolare $P(E_2)$:

$$\begin{aligned} P(E_2) &= P(E_2 | E_1) \cdot P(E_1) + P(E_2 | \overline{E_1}) \cdot P(\overline{E_1}) = \\ &\text{ma } E_2, E_1 \text{ incompatibili, quindi } P(E_2 | E_1) = 0 \\ &= P(E_2 | \overline{E_1}) \cdot P(\overline{E_1}) = \end{aligned}$$

Teorema : Teorema della Probabilità Assoluta per k eventi

Siano $E_1, \dots, E_k$ eventi:

- con probabilità non nulle
- incompatibili
- partizioni di Ω

Sia E un qualsiasi tra gli k eventi, allora la sua probabilità è uguale a:

$$P(E) = \sum_i^k P(E | E_i) \cdot P(E_i)$$

Ovvero:

$$P(E) = P(E | E_1) \cdot P(E_1) + P(E | E_2) \cdot P(E_2) + \dots + P(E | E_k) \cdot P(E_k)$$

Esercizio

In data 29/10/2025 un'azienda acquista microchip da 3 fornitori.

- I microchip del fornitore 1 hanno il 10% di probabilità di essere difettosi
- I microchip del fornitore 2 hanno il 5% di probabilità di essere difettosi
- I microchip del fornitore 3 hanno il 2% di probabilità di essere difettosi

Supponendo che

- il 20% della fornitura proviene dal fornitore 1
- il 35% della fornitura proviene dal fornitore 2
- il 45% della fornitura proviene dal fornitore 3

Se un microchip viene selezionato a caso tra quelli acquistati in tale data qual è la probabilità che sia difettoso? $P(E) = ?$

1. Definisco cosa mi sta chiedendo:

Qual è la probabilità che un microchip pescato a caso tra quelli acquistati sia difettoso?

E = il microchip è difettoso

2. Dato che i microchip provengono da fornitori diversi, suddivido gli eventi:

- E_1 = il microchip proviene dal fornitore 1
- E_2 = il microchip proviene dal fornitore 2
- E_3 = il microchip proviene dal fornitore 3

Ripondo alle seguenti domande:

- Gli eventi sono eventi impossibili? No
Perchè:
 - $P(E_1) = 0.20$
 - $P(E_2) = 0.35$
 - $P(E_3) = 0.45$
- Gli eventi sono incompatibili? Sì
Perchè è impossibile che il microchip pescato provenga da due fornitori diversi
- L'unione degli eventi E_1, E_2, E_3 è uguale a Ω ? Sì

Quindi uso la formula della probabilità assoluta $P(E) = \sum_i^k P(E | E_i) \cdot P(E_i)$

$$\begin{aligned} P(E) &= P(E | E_1) \cdot P(E_1) + \\ &\quad + P(E | E_2) \cdot P(E_2) \\ &\quad + P(E | E_3) \cdot P(E_3) = \end{aligned}$$

Dove:

- $P(E | E_1) = 0.10$
Probabilità che il microchip sia difettoso dato che proviene dal fornitore 1

- $P(E | E_2) = 0.05$
Probabilità che il microchip sia difettoso dato che proviene dal fornitore 2
- $P(E | E_3) = 0.02$
Probabilità che il microchip sia difettoso dato che proviene dal fornitore 3

Quindi:

$$P(E) = (0.10 \cdot 0.20) + (0.05 \cdot 0.35) + (0.02 \cdot 0.45) = 0.0465 \quad \text{Risposta corretta}$$

5.6 Formula di Bayes

Questo teorema vale se e solo se:

- Nessuno degli eventi è l'evento impossibile

$$E_i \neq \emptyset \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

- Tutti gli eventi sono due a due incompatibili

$$E_i \cap E_j = \emptyset \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad i \neq j$$

- L'unione degli eventi corrisponde allo spazio campionario ("l'unione contiene tutti gli esiti possibili"), ovvero gli eventi formano una partizione di Ω

$$\bigcup_i E_i = \Omega$$

Teorema : Teorema di Bayes a 2 eventi

Siano E_1, E_2 due eventi:

- con probabilità non nulle $P(E_1), P(E_2) \neq 0$
- incompatibili
- partizioni di Ω

La probabilità condizionata di E_1 rispetto a E_2 è uguale a:

$$P(E_1 | E_2) = \frac{P(E_2 | E_1) \cdot P(E_1)}{P(E_2)} =$$

al denominatore sostituisco, per il teorema della probabilità

assoluta $P(E_2) = P(E_2 | E_1) \cdot P(E_1) + P(E_2 | \overline{E_1}) \cdot P(\overline{E_1})$ avrò che:

$$= \frac{P(E_2 | E_1) \cdot P(E_1)}{P(E_2 | E_1) \cdot P(E_1) + P(E_2 | \overline{E_1}) \cdot P(\overline{E_1})} =$$

Dove:

- $P(E_1)$ è la probabilità a priori dell'evento E_1 (dato che ho già)
- $P(E_1 | E_2)$ è la probabilità a posteriori dell'evento E_1 (che calcolo con Bayes)

Quello che fa la formula di Bayes è:

aggiornare la probabilità dell'evento E_1 (probabilità a priori) con informazioni contenute nell'evento E_2 (ottenendo così una probabilità a posteriori).

Teorema : Teorema di Bayes a k eventi

Siano $E_1, \dots, E_k$ eventi:

- con probabilità non nulle

- incompatibili
- partizioni di Ω

Dato un qualsiasi evento E tra i k eventi, allora la probabilità condizionata di E_k dato E

$$P(E_k | E) = \frac{P(E | E_k) \cdot P(E_k)}{P(E)} =$$

al denominatore sostituisco, per il teorema della

probabilità assoluta $P(E) = \sum_i^k P(E | E_i) \cdot P(E_i)$ avrò che:

$$= \frac{P(E | E_k) \cdot P(E_k)}{\sum_i^k P(E | E_i) \cdot P(E_i)} =$$

Osservazione su formula di Bayes:

Prima di calcolare correttamente la formula di Bayes, è necessario aver già calcolato la probabilità assoluta (che nella formula di Bayes è al denominatore).

1. Scrivi formula di Bayes:

$$P(E_k | E) = \frac{P(E | E_k) \cdot P(E_k)}{P(E)} =$$

2. Calcola separatamente il denominatore della formula nello step 1, $P(E)$, con la formula della probabilità assoluta:

$$P(E) = \sum_i^k P(E | E_i) \cdot P(E_i) = \text{valore}$$

3. Inserisci il valore ottenuto dallo step 2 nel denominatore della formula di Bayes nello step 1:

$$\begin{aligned} P(E_k | E) &= \frac{P(E | E_k) \cdot P(E_k)}{P(E)} = \\ &= \frac{P(E | E_k) \cdot P(E_k)}{\text{valore}} = \end{aligned}$$

Esercizio 1

Siano due eventi:

- M = avere una certa malattia
- T = il risultato del test è positivo

Siano i seguenti dati

- $P(M) = 0.01$
Probabilità di avere una certa malattia
- $P(T | M) = 0.9$
Probabilità che il test sia positivo quando ho già una certa malattia
- $P(\bar{T} | \bar{M}) = 0.98$
Probabilità che il test sia negativo quando so di non avere una certa malattia

Qual è la probabilità che il test sia positivo? $P(T) = ?$

Ricordo dall'osservazione che:

$$T = (T \cap M) \cup (T \cap \bar{M})$$

Dato che $M, \overline{M}$ sono incompatibili, anche $T \cap M$ e $T \cap \overline{M}$ lo sono. Quindi:

$$\begin{aligned}
 P(T) &= P((T \cap M) \cup (T \cap \overline{M})) \\
 &= (P(T \cap M) \cup P(T \cap \overline{M})) \\
 &= \text{per l'assioma 4} \\
 &= P(T \cap M) + P(T \cap \overline{M}) \\
 &= \text{per la formula di fattorizzazione} \\
 &= P(T | M) \cdot P(M) + P(T | \overline{M}) \cdot P(\overline{M}) \\
 &= 0.9 \cdot 0.01 + 0.02 \cdot 0.99 \\
 &= 0.009 + 0.0198 = 0.0288 \quad \text{Risposta corretta}
 \end{aligned}$$

Mi manca trovare:

- $P(T | \overline{M}) = ?$

Ricordo che $P(E) = 1 - P(\overline{E})$, di conseguenza:

$$P(T | \overline{M}) = 1 - P(\overline{T} | \overline{M}) = 1 - 0.98 = 0.02$$

- $P(\overline{M}) = ?$

Ricordo che $P(\overline{E}) = 1 - P(E)$, di conseguenza:

$$P(\overline{M}) = 1 - P(M) = 1 - 0.01 = 0.99$$

Adesso mi chiedo:

Qual è la probabilità che un individuo sia affetto dalla malattia sapendo che il test diagnostico ha dato esito positivo? $P(M | T) = ?$

Uso Bayes perchè conosco i valori di $P(T | M)$, $P(M)$ e posso calcolare $P(T)$ con la probabilità assoluta; se non avessi queste condizioni, non potrei utilizzare la formula di Bayes.

1. Scrivo la formula di Bayes:

$$P(M | T) = \frac{P(T | M) \cdot P(M)}{P(T)}$$

2. Calcolo separatamente il denominatore con la formula della probabilità assoluta per 2 eventi (M,T):

$$\begin{aligned}
 P(T) &= P(T | M) \cdot P(M) + P(T | \overline{M}) \cdot P(\overline{M}) = \\
 &T, M \text{ non sono incompatibili, quindi } P(T | M) \neq 0 \\
 &= 0.9 \cdot 0.01 + 0.02 \cdot 0.99 = 0.0288
 \end{aligned}$$

3. Inserisco il valore trovato nello step 2 al denominatore nella formula di Bayes nello step 1:

$$\begin{aligned}
 P(M | T) &= \frac{P(T | M) \cdot P(M)}{P(T)} = \\
 &= \frac{P(T | M) \cdot P(M)}{0.0288} = \\
 &= \frac{0.9 \cdot 0.01}{0.0288} = 0.3125 \quad \text{Risposta corretta}
 \end{aligned}$$

Esercizio 2

In data 29/10/2025 un'azienda acquista microchip da 3 fornitori.

- I microchip del fornitore 1 hanno il 10% di probabilità di essere difettosi

- I microchip del fornitore 2 hanno il 5% di probabilità di essere difettosi
- I microchip del fornitore 3 hanno il 2% di probabilità di essere difettosi

Supponendo che

- il 20% della fornitura proviene dal fornitore 1
- il 35% della fornitura proviene dal fornitore 2
- il 45% della fornitura proviene dal fornitore 3

Se un microchip viene selezionato a caso tra quelli acquistati in tale data qual è la probabilità che sia difettoso? $P(E) = ?$

1. Definisco cosa mi sta chiedendo:
Qual è la probabilità che un microchip pescato a caso tra quelli acquistati sia difettoso?
 E = il microchip è difettoso
2. Dato che i microchip provengono da fornitori diversi, suddivido gli eventi:
 - E_1 = il microchip proviene dal fornitore 1
 - E_2 = il microchip proviene dal fornitore 2
 - E_3 = il microchip proviene dal fornitore 3

Ripondo alle seguenti domande:

- Gli eventi sono eventi impossibili? No
Perchè:
 - $P(E_1) = 0.20$
 - $P(E_2) = 0.35$
 - $P(E_3) = 0.45$
- Gli eventi sono incompatibili? Sì
Perchè è impossibile che il microchip pescato provenga da due fornitori diversi
- L'unione degli eventi E_1, E_2, E_3 è uguale a Ω ? Sì

Quindi uso la formula della probabilità assoluta $P(E) = \sum_i^k P(E | E_i) \cdot P(E_i)$

$$\begin{aligned} P(E) &= P(E | E_1) \cdot P(E_1) + \\ &\quad + P(E | E_2) \cdot P(E_2) \\ &\quad + P(E | E_3) \cdot P(E_3) = \end{aligned}$$

Dove:

- $P(E | E_1) = 0.10$
Probabilità che il microchip sia difettoso dato che proviene dal fornitore 1
- $P(E | E_2) = 0.05$
Probabilità che il microchip sia difettoso dato che proviene dal fornitore 2
- $P(E | E_3) = 0.02$
Probabilità che il microchip sia difettoso dato che proviene dal fornitore 3

Quindi:

$$P(E) = (0.10 \cdot 0.20) + (0.05 \cdot 0.35) + (0.02 \cdot 0.45) = 0.0465 \quad \text{Risposta corretta}$$

Adesso mi chiedo:

Qual è la probabilità che un microchip scelto a caso sia stato fornito dal produttore 2 sapendo che esso è difettoso? $P(E_2 | E) = ?$ Uso Bayes perchè conosco i valori di $P(E | E_2), P(E_2)$ e posso calcolare $P(E)$ con la probabilità assoluta; se non avessi queste condizioni, non potrei utilizzare la formula di Bayes.

1. Scrivo la formula di Bayes:

$$P(E_2 | E) = \frac{P(E | E_2) \cdot P(E_2)}{P(E)}$$

2. Calcolo separatamente il denominatore con la formula della probabilità assoluta per 3 eventi (E_1, E_2, E_3):

$$\begin{aligned} P(E) &= \sum_{i=1}^3 P(E | E_i) \cdot P(E_i) = \\ &= (P(E | E_1) \cdot P(E_1)) + (P(E | E_2) \cdot P(E_2)) + (P(E | E_3) \cdot P(E_3)) = \\ &= (0.10 \cdot 0.20) + (0.05 \cdot 0.35) + (0.02 \cdot 0.45) = 0.0465 \end{aligned}$$

3. Inserisco il valore trovato nello step 2 al denominatore nella formula di Bayes nello step 1:

$$\begin{aligned} P(E_2 | E) &= \frac{P(E | E_2) \cdot P(E_2)}{P(E)} = \\ &= \frac{P(E | E_2) \cdot P(E_2)}{0.0465} = \\ &= \frac{0.05 \cdot 0.35}{0.0465} = 0.3763 \quad \text{Risposta corretta} \end{aligned}$$

6 Variabili Aleatorie

6.1 Funzione di massa

La funzione di massa indica la probabilità che ha ogni variabile aleatoria discreta che fa parte del supporto $\mathcal{X}$ studiato.

Teorema : Funzione di massa per var discrete

La **funzione di massa di probabilità** di una variabile aleatoria discreta X è definita come:

$$p_X(x) = P(X = x) \quad \forall x \in \mathcal{X}$$

Osservazione:

La funzione assegna una probabilità a ogni variabile aleatoria discreta di $\mathcal{X}$ t.c. la loro somma è uguale a uno:

$$\sum_{x \in \mathcal{X}} P(X = x) = 1$$

Esercizio

Lancio tre volte una moneta con due facce: Croce (C) e Testa (T).

1. **Definisco spazio campionario:**

Ovvero tutti i possibili esiti, che sono $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$ quindi 2 possibili esiti ad ogni lancio.

$$\Omega = \{CCC, CTC, CTT, CCT, TTT, TTC, TCT, TCC\}$$

2. **Definisco la variabile aleatoria discreta:**

Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di teste.

$$X(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{se } \omega = CCC \\ 1 & \text{se } \omega = CCT, CTC, TCC \\ 2 & \text{se } \omega = TTC, TCT, CTT \\ 3 & \text{se } \omega = TTT \end{cases}$$

3. **Supporto della variabile aleatoria:**

Il supporto di X sarà:

$$\mathcal{X} = \{0, 1, 2, 3\}$$

4. **Calcolo la funzione di massa per ogni variabile aleatoria del supporto:**

- $P(X = 0) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che esca tre volte di seguito Croce? $\omega = CCC$

$$P(X = 0) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{1}{8}$$

- $P(X = 1) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che esca una sola volta testa? $\omega = CCT, CTC, TCC$

$$P(X = 1) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{3}{8}$$

- $P(X = 2) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che esca due volte testa?
 $\omega = TTC, TCT, CTT$

$$P(X = 2) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{3}{8}$$

- $P(X = 3) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che esca tre volte di seguito Testa? $\omega = TTT$

$$P(X = 3) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{1}{8}$$

5. **Controllo se ho correttamente calcolato le funzioni di massa:** per vedere se è corretto, la loro somma deve essere uguale a 1.

$$\sum_{x \in X} P(X = x) = 1$$

$$P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1$$

$$\frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$$

$$1 \stackrel{?}{=} 1$$

6.2 Funzione di densità

La funzione di densità indica la probabilità che ha una variabile aleatoria continua di appartenere ad un certo intervallo (supporto $\mathcal{X}$).

Teorema : Funzione di densità per var continue

La **funzione di densità di probabilità** di una variabile aleatoria continua X è definita come:

$$f_X(x) = P(X \in [x_1, x_2]) = P(x_1 \leq X \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f_X(x) dx$$

La probabilità dell'appartenenza della variabile aleatoria in un certo intervallo si calcola con l'integrale definito.

Esercizio

Sia X variabile aleatoria con supporto $\mathcal{X} = (0, 2)$ (intervallo) con funzione di densità di probabilità:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{se } 0 < x < 2, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Scelgo ora un sottointervallo di $(0, 2)$ e ne calcolo la funzione di densità:

$$\begin{aligned}
P(0.25 \leq X \leq 0.75) &= \int_{0.25}^{0.75} f_X(x) dx \\
&= \int_{0.25}^{0.75} \frac{1}{2} dx \\
&= \frac{1}{2} x \Big|_{0.25}^{0.75} \\
&= \left(\frac{1}{2} \cdot 0.75 \right) - \left(\frac{1}{2} \cdot 0.25 \right) \\
&= 0.25
\end{aligned}$$

la probabilità che la var X ha di appartenere a $[0.25, 0.75]$ è uguale a 0.25

Se io invece calcolo la funzione di densità nell'intervallo $(0, 2)$:

$$\begin{aligned}
P(0 < X < 2) &= \int_0^2 f_X(x) dx \\
&= \int_0^2 \frac{1}{2} dx \\
&= \frac{1}{2} x \Big|_0^2 \\
&= \left(\frac{1}{2} \cdot 2 \right) - \left(\frac{1}{2} \cdot 0 \right) \\
&= 1
\end{aligned}$$

corretto poichè è una proprietà della funzione di densità

6.3 Funzione di ripartizione

La funzione di ripartizione indica la probabilità che la variabile aleatoria X sia minore e/o uguale ad un certo valore x .

Osservazione:

Sia $F_X(x) = P(X \leq x)$ la funzione di ripartizione di una variabile aleatoria. Vale sempre che:

$$P(X > x) = 1 - P(X \leq x)$$

6.3.1 Funzione di ripartizione per variabile aleatoria discreta

Teorema : Funzione di ripartizione per var discrete

La **funzione di ripartizione** di una variabile aleatoria discreta X è definita come:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{i=1, u_i \leq x}^x P(X = u_i)$$

La probabilità che la variabile aleatoria X sia minore e/o uguale a x è uguale alla somma cumulative delle funzioni di massa di probabilità fino a x .

$$P(X \leq x) = P(X = u_1) + P(X = u_2) + \cdots + P(X = u_x)$$

Esercizio

Lancio tre volte una moneta con due facce: Croce (C) e Testa (T).

1. **Definisco spazio campionario:**

Ovvero tutti i possibili esiti, che sono $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$ quindi 2 possibili esiti ad ogni lancio.

$$\Omega = \{CCC, CTC, CTT, CCT, TTT, TTC, TCT, TCC\}$$

2. **Definisco la variabile aleatoria discreta:**

Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di teste.

$$X(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{se } \omega = CCC \\ 1 & \text{se } \omega = CCT, CTC, TCC \\ 2 & \text{se } \omega = TTC, TCT, CTT \\ 3 & \text{se } \omega = TTT \end{cases}$$

3. **Supporto della variabile aleatoria:**

Il supporto di X sarà:

$$\mathcal{X} = \{0, 1, 2, 3\}$$

4. **Calcolo la funzione di massa per ogni variabile aleatoria del supporto:**

- $P(X = 0) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che esca tre volte di seguito Croce? $\omega = CCC$

$$P(X = 0) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{1}{8}$$

- $P(X = 1) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che esca una sola volta testa? $\omega = CCT, CTC, TCC$

$$P(X = 1) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{3}{8}$$

- $P(X = 2) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che esca due volte testa? $\omega = TTC, TCT, CTT$

$$P(X = 2) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{3}{8}$$

- $P(X = 3) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che esca tre volte di seguito Testa? $\omega = TTT$

$$P(X = 3) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{1}{8}$$

5. **Calcolo la funzione di ripartizione per ogni valore x del supporto:**

- $P(X \leq 0) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che non escano affatto Teste?

$$P(X \leq 0) = P(X = 0) = \frac{1}{8}$$

- $P(X \leq 1) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che esca una testa oppure zero teste?

$$P(X \leq 1) = [P(X = 0) + P(X = 1)] = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$$

- $P(X \leq 2) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che esca nessuna, una o due volte testa?

$$P(X \leq 2) = [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)] = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$$

- $P(X \leq 3) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che esca nessuna, una, due o tre volte di seguito Testa?

$$P(X \leq 3) = [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3)] = \frac{8}{8} = 1$$

Quindi:

$$F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{8} & 0 \leq x < 1, \\ \frac{4}{8} & 1 \leq x < 2, \\ \frac{7}{8} & 2 \leq x < 3, \\ 1 & x \geq 3. \end{cases}$$

6.3.2 Funzione di ripartizione per variabile aleatoria continua

Teorema : Funzione di ripartizione per var continue

La **funzione di ripartizione** di una variabile aleatoria continua X è definita come:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du$$

La probabilità che la variabile aleatoria X sia minore e/o uguale a x è uguale all'integrale definito da $-\infty$ a x .

Esercizio

Sia X variabile aleatoria con supporto $\mathcal{X} = (0, 2)$ (intervallo) con funzione di densità di probabilità:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{se } 0 < x < 2, \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Calcolo la funzione di ripartizione per x :

1. $P(X \leq x) = ?$

$$\begin{aligned} P(X \leq x) &= \int_0^x f_X(u) du \\ &= \int_0^x \frac{1}{2} du \\ &= \frac{1}{2} u \Big|_0^x \\ &= \frac{1}{2} \cdot x - \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{x}{2} \end{aligned}$$

2. Adesso che ho $P(X \leq x) = \frac{x}{2}$ posso calcolarlo per qualsiasi valore di x che sta nell'intervallo $(0,2)$:

• $P(X \leq 0.2) = ?$

$$P(X \leq 0.2) = \frac{x}{2} = \frac{0.2}{2}$$

• $P(X \leq 0.5) = ?$

$$P(X \leq 0.5) = \frac{x}{2} = \frac{0.5}{2}$$

• $P(X \leq 1) = ?$

$$P(X \leq 1) = \frac{x}{2} = \frac{1}{2}$$

• $P(X \leq 1.5) = ?$

$$P(X \leq 1.5) = \frac{x}{2} = \frac{1.5}{2}$$

• $P(X \leq 2) = ?$

$$P(X \leq 2) = \frac{x}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

6.4 Valore atteso

Il valore atteso di una variabile aleatoria è la media pesata delle variabili aleatorie.

6.4.1 Valore atteso di una variabile aleatoria discreta

Teorema : Valore atteso di var discreta

Il valore atteso di una variabile aleatoria discreta X con funzione di massa di probabilità $p_X(x)$ è definito come:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} (x \cdot p_X(x)) = \sum_{x \in \mathcal{X}} (x \cdot P(X = x))$$

Esercizio

Lancio tre volte una moneta con due facce: Croce (C) e Testa (T).

1. **Definisco spazio campionario:**

Ovvero tutti i possibili esiti, che sono $2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3 = 8$ quindi 8 possibili esiti ad ogni lancio.

$$\Omega = \{CCC, CTC, CTT, CCT, TTT, TTC, TCT, TCC\}$$

2. **Definisco la variabile aleatoria discreta:**

Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di teste.

$$X(\omega) = \begin{cases} 0 & \text{se } \omega = CCC \\ 1 & \text{se } \omega = CCT, CTC, TCC \\ 2 & \text{se } \omega = TTC, TCT, CTT \\ 3 & \text{se } \omega = TTT \end{cases}$$

3. Supporto della variabile aleatoria:

Il supporto di X sarà:

$$\mathcal{X} = \{0, 1, 2, 3\}$$

4. Calcolo la funzione di massa per ogni variabile aleatoria del supporto:

- $P(X = 0) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che esca tre volte di seguito Croce? $\omega = CCC$

$$P(X = 0) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{1}{8}$$

- $P(X = 1) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che esca una sola volta testa? $\omega = CCT, CTC, TCC$

$$P(X = 1) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{3}{8}$$

- $P(X = 2) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che esca due volte testa? $\omega = TTC, TCT, CTT$

$$P(X = 2) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{3}{8}$$

- $P(X = 3) = ?$

Lanciano tre volte una moneta, qual è la probabilità che esca tre volte di seguito Testa? $\omega = TTT$

$$P(X = 3) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{1}{8}$$

5. Calcolo il valore atteso:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x \in \mathcal{X}} x \cdot P(X = x) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{2}$$

Esercizio

Lancio due dadi a sei facce:

- Se la somma degli esiti è 2 o 3, perdo 10 euro
- Se la somma degli esiti è 4, 5 o 6, perdo 4 euro
- Se la somma degli esiti è 7, 8 o 9 vinco 4 euro
- Se la somma degli esiti è 10, 11 o 12 vinco 10 euro

1. Definisco le variabili aleatorie discrete che rappresentano ogni vincita:

- $P(X = -10)$
- $P(X = -4)$

- $P(X = 4)$
- $P(X = 10)$

2. Calcolo la funzione di massa:

- $P(X = -10)$

$$P(X = -10) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

Spiegazione^a

- $P(X = -4)$

$$P(X = -4) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$$

Spiegazione^b

- $P(X = 4)$

$$P(X = 4) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

Spiegazione^c

- $P(X = 10)$

$$P(X = 10) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Spiegazione^d

- Calcolo il valore atteso di X

$$\mathbb{E}[X] = (-10 \cdot \frac{1}{12}) + (-4 \cdot \frac{1}{3}) + (4 \cdot \frac{5}{12}) + (10 \cdot \frac{1}{6}) = 1.17$$

Vuol dire: "In media, per partita, il guadagno medio è di 1.17 euro".

^aProbabilità che la somma degli esiti sia 2 o 3:

- E_1 = somma degli esiti è 2
- E_2 = somma degli esiti è 3

Quindi mi chiedo: $P(E_1 \cup E_2) = ?$

Ricordo la formula: $P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$, quindi:

$$(a) P(E_1) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{1}{36}$$

$$(b) P(E_2) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{2}{36}$$

$$(c) P(E_1 \cap E_2) = 0 \text{ perchè } E_1, E_2 \text{ sono due eventi incompatibili (non possono accadere insieme)}$$

$$\text{Pertanto: } P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2) = \frac{1}{36} + \frac{2}{36} - 0 = \frac{3}{36}$$

^bProbabilità che la somma degli esiti sia 4, 5 o 6:

- E_1 = somma degli esiti è 4
- E_2 = somma degli esiti è 5
- E_3 = somma degli esiti è 6

Quindi mi chiedo: $P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = ?$

Ricordo la formula:

$$P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = [P(E_1) + P(E_2) + P(E_3)] - [P(E_1 \cap E_2) + P(E_1 \cap E_3) + P(E_2 \cap E_3)] + [P(E_1 \cap E_2 \cap E_3)]$$

$$(a) P(E_1) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{3}{36}$$

$$(b) P(E_2) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{4}{36}$$

$$(c) P(E_3) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{5}{36}$$

$$(d) P(E_1 \cap E_2) = 0 \text{ perchè } E_1, E_2 \text{ sono due eventi incompatibili}$$

$$(e) P(E_1 \cap E_3) = 0 \text{ perchè } E_1, E_3 \text{ sono due eventi incompatibili}$$

$$(f) P(E_2 \cap E_3) = 0 \text{ perchè } E_2, E_3 \text{ sono due eventi incompatibili}$$

$$(g) P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = 0 \text{ perchè } E_1, E_2, E_3 \text{ sono due eventi incompatibili (non possono accadere insieme)}$$

$$\text{Pertanto: } P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = \left[\frac{3}{36} + \frac{4}{36} + \frac{5}{36} \right] - [0 + 0 + 0] + 0 = \frac{12}{36}$$

^cProbabilità che la somma degli esiti sia 7, 8 o 9:

- E_1 = somma degli esiti è 7
- E_2 = somma degli esiti è 8
- E_3 = somma degli esiti è 9

Quindi mi chiedo: $P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = ?$

Ricordo la formula:

$$P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = [P(E_1) + P(E_2) + P(E_3)] - [P(E_1 \cap E_2) + P(E_1 \cap E_3) + P(E_2 \cap E_3)] + [P(E_1 \cap E_2 \cap E_3)]$$

$$(a) \quad P(E_1) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{6}{36}$$

$$(b) \quad P(E_2) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{5}{36}$$

$$(c) \quad P(E_3) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{4}{36}$$

$$(d) \quad P(E_1 \cap E_2) = 0 \text{ perchè } E_1, E_2 \text{ sono due eventi incompatibili}$$

$$(e) \quad P(E_1 \cap E_3) = 0 \text{ perchè } E_1, E_2 \text{ sono due eventi incompatibili}$$

$$(f) \quad P(E_2 \cap E_3) = 0 \text{ perchè } E_1, E_2 \text{ sono due eventi incompatibili}$$

$$(g) \quad P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = 0 \text{ perchè } E_1, E_2, E_3 \text{ sono due eventi incompatibili (non possono accadere insieme)}$$

$$\text{Pertanto: } P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = \left[\frac{6}{36} + \frac{5}{36} + \frac{4}{36} \right] - [0 + 0 + 0] + 0 = \frac{15}{36}$$

d. Probabilità che la somma degli esiti sia 10, 11 o 12:

– E_1 = somma degli esiti è 10

– E_2 = somma degli esiti è 11

– E_3 = somma degli esiti è 12

Quindi mi chiedo: $P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = ?$

Ricordo la formula:

$$P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = [P(E_1) + P(E_2) + P(E_3)] - [P(E_1 \cap E_2) + P(E_1 \cap E_3) + P(E_2 \cap E_3)] + [P(E_1 \cap E_2 \cap E_3)]$$

$$(a) \quad P(E_1) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{3}{36}$$

$$(b) \quad P(E_2) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{2}{36}$$

$$(c) \quad P(E_3) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}} = \frac{1}{36}$$

$$(d) \quad P(E_1 \cap E_2) = 0 \text{ perchè } E_1, E_2 \text{ sono due eventi incompatibili}$$

$$(e) \quad P(E_1 \cap E_3) = 0 \text{ perchè } E_1, E_2 \text{ sono due eventi incompatibili}$$

$$(f) \quad P(E_2 \cap E_3) = 0 \text{ perchè } E_1, E_2 \text{ sono due eventi incompatibili}$$

$$(g) \quad P(E_1 \cap E_2 \cap E_3) = 0 \text{ perchè } E_1, E_2, E_3 \text{ sono due eventi incompatibili (non possono accadere insieme)}$$

$$\text{Pertanto: } P(E_1 \cup E_2 \cup E_3) = \left[\frac{3}{36} + \frac{2}{36} + \frac{1}{36} \right] - [0 + 0 + 0] + 0 = \frac{6}{36}$$

6.4.2 Valore atteso di una variabile aleatoria continua

Teorema : Valore atteso di var continua

Il valore atteso di una variabile aleatoria continua X con funzione di densità di probabilità $f_X(x)$ è definito come:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathcal{X}} x \cdot f_X(x) dx$$

Esercizio

Sia X variabile aleatoria con supporto $\mathcal{X} = (0, 2)$ (intervallo) con funzione di densità di probabilità:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{se } 0 < x < 2, \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Calcolo il valore atteso:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathcal{X}} x \cdot f_X(x) dx = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 (x) dx = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x^2}{2} \Big|_0^2 \right) = 1$$

6.5 Varianza di una variabile aleatoria

La varianza indica quanto i dati si discostano alla media / valore atteso:

- Se i valori sono vicini alla media (valore atteso), allora il valore della varianza è piccolo

- Se i valori sono distanti alla media (valore atteso), allora il valore della varianza è grande

Teorema : Formula varianza per var discrete

La varianza è definita come:

$$\mathbb{V}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

Dove:

- $\mathbb{E}[X^2] = \sum_{x \in \mathcal{X}} (x^2 \cdot p_X(x)) = \sum_{x \in \mathcal{X}} (x^2 \cdot P(X = x))$
- $(\mathbb{E}[X])^2$ = calcolo valore atteso e lo elevo al quadrato

Esercizio

Riprendo l'esperimento casuale del lancio di 3 monete e osservare la probabilità del numero di teste già svolto sopra:

- $P(X = 0) = \frac{1}{8}$
- $P(X = 1) = \frac{3}{8}$
- $P(X = 2) = \frac{3}{8}$
- $P(X = 3) = \frac{1}{8}$

$$\mathbb{E}[X] = \frac{3}{2}$$

Calcola la varianza della variabile aleatoria X :

1. Calcola $\mathbb{E}[X^2]$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^2] &= \sum_{x \in \mathcal{X}} (x^2 \cdot P(X = x)) \\ &= (0^2 \cdot \frac{1}{8}) + (1^2 \cdot \frac{3}{8}) + (2^2 \cdot \frac{3}{8}) + (3^2 \cdot \frac{1}{8}) = 3 \end{aligned}$$

2. Calcola $(\mathbb{E}[X])^2$:

$$(\mathbb{E}[X])^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

Pertanto:

$$\mathbb{V}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = 3 - \frac{9}{4} = 0.75 \quad \text{Risposta corretta}$$

Teorema : Formula varianza per var continue

La varianza è definita come:

$$\mathbb{V}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$

Dove:

- $\mathbb{E}[X^2] = \int_{\mathcal{X}} (x^2 \cdot f_X(x)) dx$
- $(\mathbb{E}[X])^2$ = calcolo valore atteso e lo elevo al quadrato

Esercizio

Sia X variabile aleatoria con supporto $\mathcal{X} = (0, 2)$ (intervallo) con funzione di densità di probabilità:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{se } 0 < x < 2, \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathcal{X}} x \cdot f_X(x) dx = \int_0^2 x \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 (x) dx = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x^2}{2} \Big|_0^2 \right) = 1$$

Calcola la varianza:

1. Calcola $\mathbb{E}[X^2]$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X^2] &= \int_0^2 (x^2 \cdot f_X(x)) dx \\ &= \int_0^2 (x^2 \cdot \frac{1}{2}) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^2 (x^2) dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x^3}{3} \Big|_0^2 \right) = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

2. Calcola $(\mathbb{E}[X])^2$:

$$(\mathbb{E}[X])^2 = (1)^2 = 1$$

Pertanto:

$$\mathbb{V}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \frac{4}{3} - 1 = \frac{1}{3} \quad \text{Risposta corretta}$$

6.6 Deviazione standard di una variabile aleatoria

La deviazione standard è la radice quadrata della varianza.

Teorema : Formula deviazione standard

Sia $\mathbb{V}[X]$ la varianza di una variabile aleatoria. La deviazione standard è definita come:

$$DS[X] = \sqrt{\mathbb{V}[X]}$$

Esercizio 1

Riprendendo l'esercizio sopra della variabile discreta X :

$$DS[X] = \sqrt{\mathbb{V}[X]} = \sqrt{0.75}$$

Esercizio 2

Riprendendo l'esercizio sopra della variabile continua X :

$$DS[X] = \sqrt{\mathbb{V}[X]} = \sqrt{\frac{1}{3}}$$

6.7 Distribuzione di probabilità congiunta

Normalmente indichiamo la probabilità congiunta di due eventi così:

$$P(E_1 \cap E_2) = P(E_2 | E_1) \cdot P(E_1)$$

Adesso voglio studiare la probabilità congiunta di due variabili aleatorie, ovvero la probabilità che accadano insieme.

6.7.1 Distribuzione di probabilità congiunta di variabili aleatorie discrete

Teorema : Funzione di massa di probabilità congiunta di var discrete

Siano X, Y due variabili aleatorie discrete con supporto $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ rispettivamente. La **funzione di massa di probabilità congiunta di X e Y** è definita come:

$$p_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in \mathcal{X}, y \in \mathcal{Y}$$

Esercizio

Esperimento: Selezionare un passeggero in modo casuale.

Quesito: Qual è la probabilità che il passeggero non fosse un membro dell'equipaggio e sia sopravvissuto?

Per rispondere a tale quesito abbiamo bisogno della distribuzione di probabilità congiunta di due variabili aleatorie.

Classe del passeggero	Sopravvissuti	Morti	Totale
Prima classe	203	122	325
Seconda classe	118	167	285
Terza classe	178	528	706
Equipaggio	212	673	885
Totale	711	1490	2201

1. Definisco le variabili aleatorie:

- La variabile aleatoria X con supporto $\mathcal{X} = \{0, 1\}$

$$X = \begin{cases} 0 & \text{se il passeggero è sopravvissuto} \\ 1 & \text{se il passeggero è morto} \end{cases}$$

- La variabile aleatoria Y con supporto $\mathcal{Y} = \{1, 2, 3, 4\}$

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{il passeggero era in prima classe} \\ 2 & \text{il passeggero era in seconda classe} \\ 3 & \text{il passeggero era in terza classe} \\ 4 & \text{il passeggero era in un membro dell'equipaggio} \end{cases}$$

2. Definisco il quesito: "Qual è la probabilità che il passeggero non fosse un membro dell'equipaggio e sia sopravvissuto?"

Si traduce in $P(X = 0, Y \in \{1, 2, 3\}) = ?$

3. Soluzione dell'esercizio:

- (a) Calcolo delle funzioni di massa di probabilità per ogni supporto:

$Y = y$	$X = 0$	$X = 1$	$Y = y$	$X = 0$	$X = 1$
1	203/2201	122/2201	1	0.0922	0.0554
2	118/2201	167/2201	2	0.0536	0.0759
3	178/2201	528/2201	3	0.0809	0.2399
4	212/2201	673/2201	4	0.0963	0.3058

(b) Calcolo la funzione di massa di probabilità congiunta:

$$\begin{aligned} P(X = 0, Y \in \{1, 2, 3\}) &= P(X = 0, Y = 1) + P(X = 0, Y = 2) \\ &\quad + P(X = 0, Y = 3) \\ &= 0.0922 + 0.0536 + 0.0809 = 0.2267 \end{aligned}$$

6.7.2 Distribuzione di probabilità congiunta di variabili aleatorie continue

Teorema : Funzione di densità di probabilità congiunta di var continue

Siano X, Y due variabili aleatorie continue con supporto $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ rispettivamente. La **funzione di densità di probabilità congiunta di X e Y** è definita come:

$$f_{X,Y}(x, y) = P(x_1 \leq X \leq x_2, y_1 \leq Y \leq y_2) = \int_{y_1}^{y_2} \left(\int_{x_1}^{x_2} f_{X,Y}(x, y) dx \right) dy$$

Esercizio

Un processo produttivo di una certa industria chimica produce due principali tipi di impurità:

- impurità di tipo I
- impurità di tipo II

Quesito: Sia la funzione di densità di probabilità congiunta di X e Y con supporto $\mathcal{X}, \mathcal{Y} \in [0, 1]$ definita come:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Qual è la probabilità che un prodotto abbia impurità di tipo I compresa tra 0 e 0.5 e impurità di tipo II compresa tra 0.4 e 0.7?

1. **Definisco le variabili aleatorie:**
2. **Definisco il quesito:** Qual è la probabilità che un prodotto abbia impurità di tipo I compresa tra 0 e 0.5 e impurità di tipo II compresa tra 0.4 e 0.7?
Si traduce in $P(0 \leq X \leq 0.5, 0.4 \leq Y \leq 0.7) = ?$
3. **Soluzione dell'esercizio:**

$$\begin{aligned} P(0 \leq X \leq 0.5, 0.4 \leq Y \leq 0.7) &= \int_{y_1}^{y_2} \left(\int_{x_1}^{x_2} f_{X,Y}(x, y) dx \right) dy \\ &= \int_{0.4}^{0.7} \left(\int_0^{0.5} f_{X,Y}(x, y) dx \right) dy \\ &= \int_{0.4}^{0.7} \left(\int_0^{0.5} 2(1-x) dx \right) dy \\ &= \int_{0.4}^{0.7} \left(2x - x^2 \Big|_0^{0.5} \right) dy \\ &= \int_{0.4}^{0.7} (0.75) dy \\ &= 0.75y \Big|_{0.4}^{0.7} = 0.225 \end{aligned}$$

6.7.3 Funzione di ripartizione congiunta di variabili aleatorie

6.8 Funzioni di massa / densità di probabilità condizionate

Ricordo che per due eventi, la probabilità condizionata è definita come:

$$P(E_1 | E_2) = \frac{P(E_1 \cap E_2)}{P(E_2)}$$

6.8.1 Funzione di massa di probabilità condizionate

Teorema : probabilità condizionata per var discrete

Siano X, Y due variabili aleatorie discrete con funzione di massa di probabilità congiunta $p_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$, definisco la **funzione di massa di probabilità condizionata** come il rapporto tra la funzione di massa di prob. congiunta di X e Y e la funzione di massa di prob. marginale di Y :

$$p_{X|Y}(x | y) = P(X = x | Y = y) = \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_Y(y)} = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)}$$

Quindi per calcolare la funzione di massa di probabilità condizionata:

$$p_{X|Y}(x | y) = P(X = x | Y = y)$$

serve prima sapere:

- funzione di massa di probabilità congiunta delle due variabili

$$p_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$$

- funzione di massa di probabilità marginale di Y , ovvero

$$p_Y(y) = P(Y = y)$$

Esercizio

Ritornando all'esercizio del Titanic, Qual è la probabilità che un passeggero sia sopravvissuto dato che viaggiava in prima classe? $P(X = 0 | Y = 1) = ?$

$$P(X = 0 | Y = 1) = \frac{P(X = 0, Y = 1)}{P(Y = 1)}$$

1. Calcolo la probabilità congiunta:

$Y = y$	$X = 0$	$X = 1$	$Y = y$	$X = 0$	$X = 1$
1	203/2201	122/2201	1	0.0922	0.0554
2	118/2201	167/2201	2	0.0536	0.0759
3	178/2201	528/2201	3	0.0809	0.2399
4	212/2201	673/2201	4	0.0963	0.3058

$$P(X = 0, Y = 1) = 0.0922$$

2. Calcolo la probabilità marginale:

$Y = y$	$X = 0$	$X = 1$	$Y = y$	$X = 0$	$X = 1$
1	203/2201	122/2201	1	0.0922	0.0554
2	118/2201	167/2201	2	0.0536	0.0759
3	178/2201	528/2201	3	0.0809	0.2399
4	212/2201	673/2201	4	0.0963	0.3058

$$P(Y = 1) = 0.0922 + 0.0554 = 0.1476$$

Pertanto:

$$P(X = 0 | Y = 1) = \frac{P(X = 0, Y = 1)}{P(Y = 1)} = \frac{0.0922}{0.1476} = 0.6247 \quad \text{Risposta corretta}$$

6.8.2 Funzione di densità di probabilità condizionate

Teorema : probabilità condizionata per var continue

Siano X, Y due variabili aleatorie continue con funzione di densità di probabilità congiunta $f_{X,Y}(x,y) = P(X=x, Y=y)$, definisco la **funzione di densità di probabilità condizionata** come il rapporto tra la funzione di densità di prob. congiunta di X e Y e la funzione di densità di prob. marginale di Y :

$$f_{X|Y}(x|y) = P(x_1 \leq X \leq x_2 | y_1 \leq Y \leq y_2) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

Quindi per calcolare la funzione di densità di probabilità condizionata:

$$f_{X|Y}(x|y) = P(x_1 \leq X \leq x_2 | y_1 \leq Y \leq y_2)$$

serve prima sapere:

- funzione di densità di probabilità congiunta delle due variabili

$$f_{X,Y}(x,y) = P(x_1 \leq X \leq x_2, y_1 \leq Y \leq y_2) = \int_{y_1}^{y_2} \left(\int_{x_1}^{x_2} f_{X,Y}(x,y) dx \right) dy$$

- funzione di densità di probabilità marginale di Y , ovvero

$$f_Y(y) = P(y_1 \leq Y \leq y_2) = \int_{x_1}^{x_2} (f_{X,Y}(x,y)) dx$$

Esercizio

Sia X, Y due variabili aleatorie continue con probabilità congiunta:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-y} & \text{se } 0 < x < y < +\infty \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Calcola la densità condizionata:

1. Calcolo la probabilità congiunta:

$$f_{X,Y}(x,y) = e^{-y}$$

2. Calcolo la probabilità marginale:

$$f_Y(y) = P(y_1 \leq Y \leq y_2) = \int_{x_1}^{x_2} (f_{X,Y}(x,y)) dx = \int_0^y (e^{-y}) dx = ye^{-y} \quad \text{con } y > 0$$

Pertanto:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{e^{-y}}{ye^{-y}} = \frac{1}{y} \quad \text{con } 0 < x < y \quad \text{Risposta corretta}$$

6.9 Variabili aleatorie indipendenti

Ricordo che E_1, E_2 sono due eventi indipendenti se vale:

$$P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) \cdot P(E_2)$$

La probabilità che si verifichi uno non modifica la probabilità dell'altro.

6.9.1 Variabili aleatorie discrete indipendenti

Teorema : var discrete indipendenti

Siano X, Y due variabili aleatorie discrete con funzione di massa di probabilità congiunta $p_{X,Y}(x, y)$ e funzioni di massa di prob. marginali $p_X(x), p_Y(y)$. Si dice che X, Y sono indipendenti se la funzione di massa di prob. congiunta è uguale al prodotto delle funzioni di massa di prob. marginali:

$$p_{X,Y}(x, y) = p_X(x) \cdot p_Y(y)$$

scrivendolo esteso:

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y)$$

6.9.2 Variabili aleatorie continue indipendenti

Teorema : var continue indipendenti

Siano X, Y due variabili aleatorie continue con funzione di densità di probabilità congiunta $f_{X,Y}(x, y)$ e funzioni di densità di prob. marginali $f_X(x), f_Y(y)$. Si dice che X, Y sono indipendenti se la funzione di densità di prob. congiunta è uguale al prodotto delle funzioni di densità di prob. marginali:

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

scrivendolo esteso:

$$\int_{y_1}^{y_2} \left(\int_{x_1}^{x_2} f_{X,Y}(x, y) dx \right) dy = \left(\int_{y_1}^{y_2} (f_{X,Y}(x, y)) dy \right) \cdot \left(\int_{x_1}^{x_2} (f_{X,Y}(x, y)) dx \right)$$

Poichè:

- $f_{X,Y}(x, y) = P(x_1 \leq X \leq x_2, y_1 \leq Y \leq y_2) = \int_{y_1}^{y_2} \left(\int_{x_1}^{x_2} f_{X,Y}(x, y) dx \right) dy$
- $f_X(x) = P(x_1 \leq X \leq x_2) = \int_{y_1}^{y_2} (f_{X,Y}(x, y)) dy$
- $f_Y(y) = P(y_1 \leq Y \leq y_2) = \int_{x_1}^{x_2} (f_{X,Y}(x, y)) dx$

6.10 Variabili aleatorie identicamente distribuite (i.d)

Le variabili aleatorie si dicono **identicamente distribuite** se hanno **tutte** lo stesso valore di probabilità. Ovvero, per ogni valore possibile $X \in \mathcal{X}$, il valore di probabilità è il medesimo.

Esempio

Lancio più volte lo stesso dado. Sia X_i la variabile aleatoria che rappresenta il risultato dell' i -esimo lancio, con supporto

$$\mathcal{X} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Per ogni i vale:

$$P(X_i = k) = \frac{1}{6}, \quad k = 1, \dots, 6.$$

Poiché tutte le variabili aleatorie X_i hanno la stessa distribuzione di probabilità (Bernoulli, Binomiale, Normale, $\dots$), esse sono identicamente distribuite.

6.11 Variabili aleatorie indipendenti identicamente distribuite (i.i.d)

Due variabili aleatorie si dicono **indipendenti e identicamente distribuite** se:

- sono tutte indipendenti tra loro (la probabilità congiunta è uguale al prodotto delle prob. marginali)
- hanno tutte lo stesso valore di probabilità (le funzioni di massa di prob. hanno la stessa probabilità, le funzioni di massa di prob. congiunta hanno la stessa probabilità, ...)

Esempio

Lancio di due monete. Siano X, Y variabili aleatorie discrete che rappresentano l'esito dei due lanci:

- X assume valore 1 se l'esito del primo lancio è testa, zero altrimenti.
- Y assume valore 1 se l'esito del primo lancio è testa, zero altrimenti.

- Funzione di massa di probabilità congiunta, $p_{X,Y}(\cdot, \cdot)$:

	$Y = 0$	$Y = 1$
$X = 0$	1/4	1/4
$X = 1$	1/4	1/4

- Funzioni di massa di probabilità marginali

$$p_X(0) = 1/2 \quad p_X(1) = 1/2 \quad \text{e} \quad p_Y(0) = 1/2 \quad p_Y(1) = 1/2$$

- X e Y sono i.i.d:

$$p(0) \equiv p_X(0) = p_Y(0) = 1/2 \quad p(1) \equiv p_X(1) = p_Y(1) = 1/2$$

e

$$p_{X,Y}(0,0) = p(0) \cdot p(0) = 1/4 \quad p_{X,Y}(0,1) = p(0) \cdot p(1) = 1/4$$

$$p_{X,Y}(1,0) = p(1) \cdot p(0) = 1/4 \quad p_{X,Y}(1,1) = p(1) \cdot p(1) = 1/4$$

7 Famiglie Parametriche

Sia θ indicata come la **probabilità di successo**.

7.1 Distribuzioni per variabili discrete

7.1.1 Distribuzione di Bernoulli

Si usa quando gli esiti dell'esperimento possono essere solo due:

- 1 - Successo
- 0 - Insuccesso

su una singola prova / esperimento.

Teorema : $X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$

Sia X la variabile aleatoria che può assumere solo due valori:

$$X = \begin{cases} 1 & \text{se l'esito è un successo} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e sia $\theta \in [0, 1]$ la probabilità di successo dell'esperimento. Essendo i due esiti complementari, posso scriverli come:

$$P(X = 1) = \theta \quad P(X = 0) = 1 - \theta$$

Formula generale:

$$p_X(x; \theta) = \theta^x (1 - \theta)^{1-x}$$

che è un modo compatto di scrivere le due sopra. Difatti:

- Successo:

$$p_X(x; \theta) = p_X(1; \theta) = \theta^1 (1 - \theta)^{1-1} = \theta^1 (1 - \theta)^{0} = \theta$$

- Insuccesso:

$$p_X(x; \theta) = p_X(0; \theta) = \theta^0 (1 - \theta)^{1-0} = \theta^0 (1 - \theta)^1 = 1 - \theta$$

Teorema : Media e Varianza di $X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$

$$\mathbb{E}_\theta[X] = \theta$$

e

$$\mathbb{V}_\theta[X] = \theta \cdot (1 - \theta)$$

Esempio

Lancio una moneta.

X è l'esito del lancio, e possono essere solo due: T oppure C (o si verifica testa oppure si verifica croce), ecco perchè uso la Distribuzione Bernoulliana.

Scommetto che esca Testa (quindi scelgo come successo "Testa"):

- Se esce Testa, sarà un Successo e quindi assocerò a X il valore di 1:

$$X = 1$$

- Se esce Croce, sarà un Insuccesso e quindi assocerò a X il valore di 0:

$$X = 0$$

Qual è la probabilità che esca Testa? $P(X = 1) = ?$

$$P(X = 1) = \frac{1}{2}$$

Quindi la probabilità di successo è uguale $\theta = \frac{1}{2}$. In questo esperimento, si ha una variabile Bernoulliana X di parametro $\theta = \frac{1}{2}$:

$$X \sim \text{Bernoulli}\left(\frac{1}{2}\right)$$

7.1.2 Distribuzione Binomiale

Si usa quando mi interessa la prob. di successi ottenuti e devo ripetere lo stesso esperimento bernoulliano n volte ognuno con probabilità di successo pari a θ . Ogni prova ha probabilità pari a θ ed è indipendente alle altre ("mi dimentico i valori di probabilità ottenuti nelle prove precedenti").

Teorema : $X \sim \text{Binomiale}(n; \theta)$

Sia X il numero di successi di n prove bernoulliane effettuate e sia θ la probabilità di successo di ogni prova.

Qual è la probabilità di ottenere k successi in n prove effettuate? $P(X = k)$?

$$p_X(k; \theta) = \binom{n}{k} \cdot \theta^k \cdot (1 - \theta)^{n-k}$$

Osservazione

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

Teorema : Media e Varianza di $X \sim \text{Binomiale}(n; \theta)$

$$\mathbb{E}_\theta[X] = n \cdot \theta$$

e

$$\mathbb{V}_\theta[X] = n \cdot \theta \cdot (1 - \theta)$$

Esercizio

La probabilità di fare canestro in un singolo tiro è del 60%, Qual è la probabilità di fare esattamente 7 canestri in 10 lanci effettuati? $X \sim \text{Binomiale}(10; 0.6)$

$$\begin{aligned}P(X = 7) &= \binom{n}{k} \cdot \theta^k \cdot (1 - \theta)^{n-k} \\&= \binom{10}{7} \cdot \theta^7 \cdot (1 - \theta)^{10-7} \\&= \frac{10!}{7!(10-7)!} \cdot \theta^7 \cdot (1 - \theta)^3 \\&= 120 \cdot \theta^7 \cdot (1 - \theta)^3 \\&\text{probabilità di fare canestro in un singolo tiro è del 60\%} \\&= 120 \cdot (0.6)^7 \cdot (1 - 0.6)^3 = 0.215\end{aligned}$$

Quindi la probabilità di fare esattamente 7 canestri su 10 lanci quando $\theta = 0.6$ è del 21.5%

Esercizio

Sia un'auto con un pneumatico di scorta. L'auto si ferma se 2 (o più) pneumatici si forano. Supponiamo che all'inizio del viaggio tutti e 5 gli pneumatici siano usati e che si forino indipendentemente con probabilità $\theta = 0.01$.

Sia X la variabile aleatoria che rappresenta il numero di pneumatici che si forano durante il viaggio:

$$X \sim \text{Binomiale}(n = 5; \theta = 0.01)$$

Qual è la probabilità che l'auto si fermi?

È un esperimento bernoulliano poichè lo pneumatico ha due opzioni: si fora (successo) oppure no (insuccesso). L'auto si fermerà se 2 o più pneumatici si foreranno, quindi il numero di successi (foratura) k affinché avvenga quanto richiesto deve essere:

$$k \geq 2$$

L'auto si fermerà se avremo $k \geq 2$ successi, quindi il quesito diventa $P(X \geq 2) = ?$

Risoluzione:

$$\begin{aligned}P(X \geq 2) &= \sum_{k=2}^5 \left(\binom{5}{k} \cdot \theta^k \cdot (1 - \theta)^{5-k} \right) = \\&= \binom{5}{2} \cdot \theta^2 \cdot (1 - \theta)^{5-2} + \\&+ \binom{5}{3} \cdot \theta^3 \cdot (1 - \theta)^{5-3} + \\&+ \binom{5}{4} \cdot \theta^4 \cdot (1 - \theta)^{5-4} + \\&+ \binom{5}{5} \cdot \theta^5 \cdot (1 - \theta)^{5-5} = \\&= 10 \cdot \theta^2 \cdot (1 - \theta)^3 + \\&+ 10 \cdot \theta^3 \cdot (1 - \theta)^2 + \\&+ 5 \cdot \theta^4 \cdot (1 - \theta)^1 + \\&+ 1 \cdot \theta^5 \cdot 1 = \\&= 10 \cdot 0.01^2 \cdot (1 - 0.01)^3 + 10 \cdot 0.01^3 \cdot (1 - 0.01)^2 + \\&+ 5 \cdot 0.01^4 \cdot (1 - 0.01) + 0.01^5 = 0.00098 \quad \text{Risposta corretta}\end{aligned}$$

Qual è la probabilità di terminare il viaggio?

Abbiamo detto che l'auto si ferma se si forano 2 o più pneumatici, quindi basta che se ne forino 2 e siamo spacciati. Quindi, l'auto non si ferma se:

- Non si forano nessun pneumatico
- Se ne forano solo uno

Affinchè l'auto termini il viaggio se ne devono forare meno di 2.

Il quesito diventa $P(X < 2) = ?$

Soluzione:

$$\begin{aligned} P(X < 2) &= P(X = 0) + P(X = 1) \\ &= \left[\binom{5}{k} \cdot \theta^k \cdot (1 - \theta)^{5-k} \right] + \left[\binom{5}{k} \cdot \theta^k \cdot (1 - \theta)^{5-k} \right] \\ &= \left[\binom{5}{0} \cdot \theta^0 \cdot (1 - \theta)^{5-0} \right] + \left[\binom{5}{1} \cdot \theta^1 \cdot (1 - \theta)^{5-1} \right] \\ &= [(1 - 0.01)^5] + [5 \cdot 0.01^1 \cdot (1 - 0.01)^4] \\ &= [(1 - 0.01)^5] + [5 \cdot 0.01^1 \cdot (1 - 0.01)^4] = 0.99902 \quad \text{Risposta corretta} \end{aligned}$$

Osservazione su $P(X < 2)$

Ricordo che $P(X < 2)$ corrisponde alla funzione di ripartizione che si calcola come:

$$P(X \leq x_n) = \sum_{i=0}^n (P(X = x_i))$$

oppure:

$$P(X < x_n) = \sum_{i=0}^{n-1} (P(X = x_i))$$

Ossia come somma cumulativa delle funzioni di massa di probabilità fino a x_n (nel caso di $\leq$) oppure fino a x_{n-1} (nel caso di $<$)

7.1.3 Distribuzione di Poisson

Si usa quando mi interessa la probabilità di eventi accaduti in un certo intervallo (di tempo, spazio o altro) e non vengono indicate le prove totali effettuate³. Esempi:

- Probabilità di ricevere 30 chiamate dalle 9:00 alle 11:00
- Probabilità che tra le 8:00 e le 11:00 in Via Guidoni passino 1500 persone
- Probabilità che sfogliando le prime 200 pagine (intervallo [1-200]) trovo almeno un errore di ortografia
- Probabilità che accada un incidente nei primi 15km di autostrada (intervallo [0-15])

Teorema : $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

Sia X la variabile aleatoria e λ il numero medio di eventi che si verificano in un certo intervallo. **Qual è la probabilità che si verifichino x eventi in un intervallo di tempo**

³Se invece vengono indicate le prove totali effettuate è Binomiale, non Poisson. Ovvero: Se fosse "Probabilità che accada un incidente nei primi 15km di autostrada (intervallo [0-15]) quando passano 50000 auto" è Binomiale perchè specifico il tot di prove effettuate.

con un certo parametro λ ? $P(X = x) = ?$

$$p_X(x; \lambda) = \frac{\lambda^x}{x!} \cdot e^{-\lambda}$$

Teorema : Media e Varianza di $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$

e

$$\mathbb{E}_\lambda[X] = \lambda$$

$$\mathbb{V}_\lambda[X] = \lambda$$

Esercizio

Si supponga che il numero di guasti che si verificano in un anno presso una centralina telefonica si possa rappresentare con una variabile aleatoria con distribuzione di Poisson di parametro $\lambda = 3$.

Qual è la probabilità che in un anno si verifichino zero guasti? $P(X = 0) = ?$

$$P(X = 0) = \frac{\lambda^x}{x!} \cdot e^{-\lambda} = \frac{3^0}{0!} \cdot e^{-3} = 0.0498 \quad \text{Risposta corretta}$$

Qual è la probabilità di avere almeno due guasti in due anni?

Ho definito che $\lambda = 3$ vale solo per un certo intervallo di tempo: 1 anno; Ma se invece mi chiede 2 anni? Allora avrò due variabili aleatorie:

- X : guasti verificati nel primo anno $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$
- Y : guasti verificati nel secondo anno $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$

$X + Y \sim \text{Poisson}(2\lambda)$

Quindi il quesito diventa $P(X + Y \geq 2) = ?$

Sapendo che la funzione di ripartizione è $P(X < x)$ e che se ho $P(X \geq x_n)$ per la funzione di ripartizione ottengo: $P(X \geq x_n) = 1 - P(X \leq x_{n-1})$, dunque:

$$\begin{aligned} P(X + Y \geq 2) &= 1 - [P(X + Y \leq 1)] \\ &= 1 - [P(X + Y = 0) + P(X + Y = 1)] \\ &= 1 - \left[\frac{\lambda^x}{x!} \cdot e^{-\lambda} + \frac{\lambda^x}{x!} \cdot e^{-\lambda} \right] \\ &= 1 - \left[\frac{(6)^0}{0!} \cdot e^{-6} + \frac{6^1}{1!} \cdot e^{-6} \right] \\ &= 1 - [e^{-6} + 6e^{-6}] \\ &= 1 - 7e^{-6} = 0.9827 \quad \text{Risposta corretta} \end{aligned}$$

Esercizio

Un tipografo, in media, commette un errore ogni 500 parole. Una pagina contiene 300 parole. Qual è la probabilità che non ci siano più di 2 errori in 5 pagine?

Soluzione:

5 pagine contengono in totale $300 \cdot 5 = 1500$ parole. Sapendo che il tipografo commette in media un errore ogni 500 parole, allora in 5 pagine commetterà in media 3 errori, quindi $\lambda = 3$.

Posso esprimere la variabile aleatoria X come il numero di errori presenti nell'intervallo [0-1500] parole. Il quesito richiede $P(X \leq 2) = ?$

$$\begin{aligned}
P(X \leq 2) &= P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) \\
&= \frac{\lambda^0}{0!} \cdot e^{-\lambda} + \frac{\lambda^1}{1!} \cdot e^{-\lambda} + \frac{\lambda^2}{2!} \cdot e^{-\lambda} \\
&= e^{-\lambda} + \lambda e^{-\lambda} + \frac{\lambda^2}{2} \cdot e^{-\lambda} \\
&= e^{-3} + 3e^{-3} + \frac{3^2}{2} \cdot e^{-3} \\
&= e^{-3} + 3e^{-3} + \frac{9}{2}e^{-3} \\
&= \left(1 + 3 + \frac{9}{2}\right) e^{-3} \\
&= \frac{17}{2}e^{-3} = 0.4232 \quad \text{Risposta corretta}
\end{aligned}$$

7.2 Distribuzioni per variabili continue

7.2.1 Distribuzione Uniforme

Si usa quando, avendo un intervallo $[a, b]$ voglio calcolare la probabilità che un evento accada in un suo sottointervallo quando tutti i valori sono equiprobabili.

Teorema : $X \sim \text{Uniforme } [a, b]$

Sia X la variabile aleatoria continua, sia $[a, b]$ l'intervallo e sia $[a', b']$ sottointervallo.

$$f_X(x; [a', b']) = P(a' \leq x \leq b') = \int_{a'}^{b'} f_X(x; [a', b']) \begin{cases} \int_{a'}^{b'} \left(\frac{1}{b-a}\right) dx & \text{se } x \in [a, b] \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Oppure semplicemente si scrive:

$$f_X(x; [a', b']) = P(a < a' \leq x \leq b' < b) = \int_{a'}^{b'} \left(\frac{1}{b-a}\right) dx = \frac{b' - a'}{b - a}$$

Sia la funzione di ripartizione:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du = \begin{cases} 0 & \text{se } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{se } x \in [a, b] \\ 1 & \text{se } x > b \end{cases}$$

Teorema : Media e Varianza di $X \sim \text{Uniforme } [a, b]$

$$\begin{aligned}
&\mathbb{E}_{a,b}[X] = \frac{a+b}{2} \\
&\text{e} \\
&\mathbb{V}_{a,b}[X] = \frac{(b-a)^2}{12}
\end{aligned}$$

Esercizio

Ad una certa fermata passa un autobus ogni 15 minuti a partire dalle 7:00 (quindi alle 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, ...). Arrivo alla fermata in un momento casuale tra le 7:00 e le 7:30, quale sarà la probabilità di dover attendere meno di 5 minuti per prendere il prossimo bus?

Soluzione:

Sia X la variabile aleatoria che rappresenta l'istante in cui arrivo alla fermata e $[0, 30]$ il sottointervallo in cui arrivo, allora: $X \sim \text{Uniforme } [0, 30]$.

Il bus passa ogni 15 minuti (7:00, 7:15, 7:30) e per far in modo che io aspetti meno di 5 minuti, dovrei arrivare dopo le 7:10 ma prima delle 7:15, oppure dopo le 7:25 ma prima delle 7:30.

Il quesito diventa $P(10 < X < 15) = ?$ oppure^a $P(25 < X < 30) = ?$ Dato che sono due eventi incompatibili (non possono accadere insieme, o prendo il bus tra le 7:10 e le 7:15 o prendo il bus delle 7:25 e le 7:30) e "oppure" rappresenta l'unione, quindi:

$$P(10 < X < 15) \cup P(25 < X < 30) = P(10 < X < 15) + P(25 < X < 30)$$

Quindi, il quesito diventa $P(10 < X < 15) + P(25 < X < 30) = ?$

- $[a, b]$ intervallo
- $[a', b']$ sottointervallo

$$\begin{aligned} P(10 < X < 15) + P(25 < X < 30) &= \left[\int_{a'}^{b'} f_X(x) dx \right] + \left[\int_{a'}^{b'} f_X(x) dx \right] \\ &= \left[\int_{10}^{15} f_X(x) dx \right] + \left[\int_{25}^{30} f_X(x) dx \right] \\ &= \left[\int_{10}^{15} \left(\frac{1}{b-a} \right) dx \right] + \left[\int_{25}^{30} \left(\frac{1}{b-a} \right) dx \right] \\ &= \left[\int_{10}^{15} \left(\frac{1}{30-0} \right) dx \right] + \left[\int_{25}^{30} \left(\frac{1}{30-0} \right) dx \right] \\ &= \left[\frac{1}{30} x \Big|_{10}^{15} \right] + \left[\frac{1}{30} x \Big|_{25}^{30} \right] = \frac{1}{3} \quad \text{Risposta corretta} \end{aligned}$$


Oppure semplicemente:

$$\begin{aligned} P(10 < X < 15) + P(25 < X < 30) &= \left[\frac{b' - a'}{b - a} \right] + \left[\frac{b' - a'}{b - a} \right] \\ &= \left[\frac{15 - 10}{30 - 0} \right] + \left[\frac{30 - 25}{30 - 0} \right] \\ &= \frac{5}{30} + \frac{5}{30} = \frac{10}{30} = \frac{1}{3} \quad \text{Risposta corretta} \end{aligned}$$

^aRicordo che $P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) + P(E_2) - P(E_1 \cap E_2)$ ma se E_1, E_2 sono incompatibili, allora diventa: $P(E_1 \cap E_2) = P(E_1) + P(E_2)$

7.2.2 Distribuzione Normale

Molto usata in Statistica, la distribuzione normale rappresenta sul piano cartesiano una curva a campana, detta "curva gaussiana". La probabilità più elevata coincide con il valore medio centrale (che spezza la campana a metà) e decresce spostandosi a destra o a sinistra.



Teorema : $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Sia X una variabile aleatoria e sia μ la media (dove sta il centro della campana) e σ^2 la varianza (quanto è larga la campana) definisco:

$$f_X(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

dove:

- μ = rappresenta il valore atteso $\mathbb{E}_{\mu, \sigma^2}[X]$ (dato che si sta parlando di var aleatorie)
- σ^2 = rappresenta la varianza $\mathbb{V}_{\mu, \sigma^2}[X]$ (dato che si sta parlando di var aleatorie)

Per calcolare la probabilità di un certo valore x sotto la curva uso la funzione di ripartizione:

$$P(X \leq x; \mu, \sigma^2) = F_X(x; \mu, \sigma^2) = \int_{-\infty}^x \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \right) dx$$

Oppure:

$$P(X \geq x; \mu, \sigma^2) = 1 - F_X(x; \mu, \sigma^2) = 1 - \left[\int_{-\infty}^x \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \right) dx \right]$$

Ma questi non sono pratici da calcolare! Quindi come calcolo la funzione di ripartizione? Vedi Distribuzione Normale Standard.

Note:

Voglio calcolare la deviazione standard:

Otengo la deviazione standard σ applicando la radice quadrata alla varianza:

$$DS_{\mu, \sigma^2}[X] = \sqrt{\mathbb{V}_{\mu, \sigma^2}[X]}$$

Voglio calcolare la varianza:

Elevo al quadrato la deviazione standard per ottenere la varianza σ^2 :

$$\mathbb{V}_{\mu, \sigma^2}[X] = \left(DS_{\mu, \sigma^2}[X] \right)^2$$

Attenzione!

La distribuzione Normale è individuata indifferentemente usando (μ, σ^2) oppure (μ, σ) :
Ad esempio:

- X ha distribuzione Normale di media 0 e varianza 9, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$X \sim N(0, 9)$$

- X ha distribuzione Normale di media 0 e deviazione standard 3, $X \sim N(\mu, \sigma)$

$$X \sim N(0, 3)$$

7.2.3 Distribuzione Normale Standard

La Distribuzione Normale Standard è un caso particolare della Distribuzione Normale. In quest'ultima, posso associare a μ, σ^2 i valori che desidero, mentre la Distribuzione Normale Standard ha valori specifici per questi due parametri:

$$\mu = 0 \quad \sigma^2 = 1$$

Abbiamo detto che calcolare la funzione di ripartizione con la Distribuzione Normale non è pratico poichè richiede di svolgere un integrale un pò ostico:

$$P(X \leq x; \mu, \sigma^2) = F_X(x; \mu, \sigma^2) = \int_{-\infty}^x \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \right) dx = ???$$

Teorema : Formula di Standardizzazione

Sia X una variabile aleatoria e standardizzo X applicando la seguente formula:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Trasformo X in Z per poter calcolare $P(X \leq x; \mu, \sigma^2)$.

Esempio:

La colazione degli italiani. Le analisi dichiarano che in media la popolazione mangia 10 biscotti con il caffè latte la mattina e varianza pari a 4 (nella pratica molte persone ne mangiano 8 o 12, con scostamenti tipici di circa 2 biscotti). La variabile aleatoria X rappresenta il numero di biscotti mangiati da un individuo. Ho distribuzione normale $X \sim N(10, 4)$ con media $\mu = 10$ e varianza $\sigma^2 = 4$. Data $X \sim N(10, 4)$ qual è la probabilità che il numero di biscotti mangiati sia minore-uguale a 12? $P(X \leq 12) = ?$

Dato che non posso usare quell'integrale enorme, standardizzo la variabile.

1. Applico la formula:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{12 - 10}{\sqrt{4}} = 1$$

2. Associo il valore a $P(Z \leq z) = \Phi(z)$:

$$P(Z \leq 1) = \Phi(1)$$

3. Guardo le tavola di $\Phi(\cdot)$ per trovare il valore: $\Phi(1) = 0.8413$




z	0.00	0.01	0.02	0.03
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.512
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.551
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.591
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.629
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.666
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.701
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.735
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.767
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.796
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.823
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.848
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.870

Pertanto:

$$P(X \leq 12) = 0.8413 \quad \text{Risposta corretta}$$

La probabilità che il numero di biscotti sia minore-uguale a 12 è del 84.13% e rappresenta l'area in blu sottostante della campana da $\Phi(1)$ fino a $-\infty$

$$\Phi(1) = \Pr(Z \leq 1) = 0.8413$$



7.2.4 Proprietà di $\Phi(\cdot)$

- 1.

$$0 \leq \Phi(z) \leq 1 \quad z \in \mathbb{R}$$

2.

$$\phi(-z) = 1 - \phi(z)$$

Segue che:

$$P(X \geq x) = P(X \geq z) = P(X \leq -z) = \phi(-z) = 1 - \phi(z)$$

3. Se X una variabile aleatoria continua con Distribuzione Normale di media μ e varianza σ^2 : $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, allora

$$P(X \leq x) = \phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \phi(z)$$

4. Per ogni $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = \phi\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) - \phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right) = \phi(z_2) - \phi(z_1)$$

5.

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = \phi\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) - \phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right) = \phi(z_2) - \phi(-z_1) = \phi(z_2) - [1 - \phi(z_1)]$$

Esercizio:

Il tempo di installazione di un dato software X ha distribuzione normale con una media $\mu = 20$ minuti e varianza $\sigma^2 = 16$ minuti.

$$X \sim N(20, 16)$$

Qual è la probabilità che il software venga installato in meno di 15 minuti? $P(X \leq 15) = ?$

1. Standardizzo la variabile:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{15 - 20}{\sqrt{16}} = -\frac{5}{4} = -1.25$$

2. Trovo il valore di $\phi(z)$ nella tavola:

$$\begin{aligned}\phi(z) &= \phi(-1.25) \\ &= 1 - \phi(1.25) \\ &= 1 - (0.8944) \\ &= 0.1056\end{aligned}$$

La probabilità che il software X venga installato in meno di 15 minuti è del 10.56%.

Problema indiretto:

Normalmente il quesito richiede di trovare la probabilità p dati i valori x, μ, σ^2 della Distribuzione Normale $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, ovvero trova p :

$$P(X \leq x; \mu, \sigma^2) = p$$

Il problema inverso invece richiede che, dato p, μ, σ^2 della Distribuzione Normale $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ trovare x :

$$P(X \leq x; \mu, \sigma^2) = p$$

Per trovare x conoscendo p, μ, σ^2 basta applicare la formula:

$$x = z \cdot \sigma + \mu$$

Problema indiretto:

Sia X =tempo istallazione software con $X \sim N(\mu = 20, \sigma^2 = 16)$.

- **Tempo di installazione del software per cui il 90% dei tempi sono inferiori a tale tempo** Trova il valore di x dato $p=0.9$; ovvero, trova il tempo di installazione (in minuti) tale che il 90% dei tempi osservati risulta inferiore a questo valore.

1. **Trova z :**

Per quale valore di z ho che $\phi(z) = 0.9$? Guardo la tavola:

$$z = 1.28$$

2. **Trova x :**

$$\begin{aligned}x &= z \cdot \sigma + \mu \\&= 1.28 \cdot \sqrt{16} + 20 \\&= 25.12 \quad \text{Risposta corretta}\end{aligned}$$

Pertanto, il 90% dei tempi di istallazione sono inferiori a 25.12 minuti

- **Tempo di installazione del software per cui il 20% dei tempi sono inferiori a tale tempo** Trova il valore di x dato $p=0.2$; ovvero, trova il tempo di installazione (in minuti) tale che il 20% dei tempi osservati risulta inferiore a questo valore.

1. **Trova z :**

Per quale valore di z ho che $\phi(z) = 0.2$? Guardo la tavola:

Ma nella tavola i valori partono da 0.5, quindi faccio:

$$1 - z = 1 - 0.2 = 0.8$$

Per quale valore di z ho che $\phi(z) = 0.8$? Guardo la tavola:

$$z = 0.84$$

Impostalo negativo $\phi(-z)$:

$$-z = -0.84$$

2. **Trova x :**

$$\begin{aligned}x &= -z \cdot \sigma + \mu \\&= -0.84 \cdot \sqrt{16} + 20 \\&= 16.64 \quad \text{Risposta corretta}\end{aligned}$$

Pertanto, il 20% dei tempi di istallazione sono inferiori a 16.64 minuti

8 Inferenza Statistica

Far inferenza statistica significa dedurre informazioni sul **fenomeno di interesse** sulla base di informazioni raccolte su un campione $C \subseteq P$.

Come formo il campione dalla popolazione?

- **Campione da popolazioni finite:** La popolazione esiste già prima dell'osservazione. Per formare il campione seleziono in modo casuale.
- **Campione da variabili aleatorie:** La popolazione non esiste, formo il campione con la creazione di dati attraverso l'esperimento.

Esempio **campionamento da popolazioni finite**: Studio Salariale

Voglio conoscere il salario annuo iniziale di laureati di 1^o livello in informatica nelle aziende italiane in un dato anno:

- Fenomeno di interesse: salario annuo (parametro incognito)
- Campione: sottoinsieme di informatici di 1^o livello occupati in aziende italiane

Attraverso la media aritmetica dei valori osservati (vari stipendi annui) posso stimare lo stipendio medio incognito di tutta la popolazione.

Esempio **campionamento da variabili aleatorie**: Studio Componenti Elettronici

Voglio conoscere la durata di vita di componenti elettronici prodotti da un'azienda italiana:

- Fenomeno di interesse: durata di vita di un componente (parametro incognito)
- Campione: un campione di componenti viene messo in funzione e viene registrato il tempo che intercorre fino alla sua rottura

Attraverso la media aritmetica dei valori creati (vari tempi di vita) posso stimare la durata di vita media incognita di tutta la popolazione.

In entrambi i metodi di campionamento, i dati campionari sono generati da un meccanismo aleatorio (il primo li sceglie in modo casuale mentre il secondo li crea) che chiamo **osservazioni**.

ogni osservazione x è la realizzazione della variabile aleatoria X

dove X è il **fenomeno di interesse** che ha nella popolazione una sua distribuzione.

- Studio Salariale: la variabile aleatoria è $X = (\text{stipendio iniziale annuo})$ e dalla lista estraggo:
 - prima estrazione: $x_1 = 28.000 \text{ €}$ (Alice)
 - seconda estrazione: $x_2 = 40.000 \text{ €}$ (Marco)
 - ...
- Studio Componenti Elettronici: la variabile aleatoria è $X = (\text{tempo di vita di un componente})$ accendo i componenti e registro i minuti:
 - primo a spengersi: $x_1 = 3000 \text{ minuti}$
 - secondo a spengersi: $x_2 = 3500 \text{ minuti}$
 - ...

L'obiettivo è individuare il valore del parametro ignoto attraverso i dati campionari: si effettuano n prove (n lanci di moneta, n estrazioni da una lista, attivazione di n componenti elettronici, ...) e si utilizzano i dati osservati per ottenere il parametro ignoto.

Teorema : Campione aleatorio e Campione osservato

- **Campione aleatorio** di numerosità n (prova i -esima):

$$\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$$

- **Campione osservato** x_i è il risultato della i -esima variabile aleatoria:

$$X_i = x_i$$

- Studio salariale: estraggo 3 persone dalla lista

$$X_1 = 40.000\text{€}$$

$$X_2 = 50.000\text{€}$$

$$X_3 = 60.000\text{€}$$

- Studio Componenti Elettronici: attivo e studio la durata di vita di 4 componenti

$$X_1 = 500 \text{ minuti}$$

$$X_2 = 3000 \text{ minuti}$$

$$X_3 = 100 \text{ minuti}$$

$$X_4 = 7000 \text{ minuti}$$

Teorema : Modello Statistico

Famiglia parametrica di leggi di probabilità della variabile aleatoria multipla $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$

$$\mathcal{F}_{\vec{X}} = \{p_{\vec{X}}(\cdot, \theta); \theta \in \Theta\} \quad \text{oppure} \quad \mathcal{F}_{\vec{X}} = \{f_{\vec{X}}(\cdot; \theta); \theta \in \Theta\}$$

Teorema : Campione Casuale

Un **campione casuale** $\vec{X}$ di ampiezza n è composto da n variabili aleatorie $X_1, \dots, X_n$ i.i.d quindi la probabilità (funzione di massa di probabilità $p_{\vec{X}}$ / funzione di densità di probabilità $f_{\vec{X}}$) di osservare un generico campione $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ è:

$$p_{\vec{X}}(\vec{x}; \theta) = p_{\vec{X}}(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p_{\vec{X}}(x_i; \theta) \quad (\text{caso discreto})$$

$$f_{\vec{X}}(\vec{x}; \theta) = f_{\vec{X}}(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f_{\vec{X}}(x_i; \theta) \quad (\text{caso continuo})$$

Nel caso dei componenti elettronici

$$X_1 = 500 \quad \text{il 1}^{\text{o}} \text{ dura 500 minuti}$$

$$X_2 = 3000 \quad \text{il 2}^{\text{o}} \text{ dura 3000 minuti}$$

$$X_3 = 100 \quad \text{il 3}^{\text{o}} \text{ dura 100 minuti}$$

$$X_4 = 7000 \quad \text{il 4}^{\text{o}} \text{ dura 7000 minuti}$$

e sapendo che $X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$ con $\Theta = [0, 1]$ allora la probabilità di osservare il campione $\vec{x} = (500, 3000, 100, 7000)$ (in minuti) sarà:

1. Prendo 4 componenti nuovi

2. Registro la loro durata e risulta che:

$$\begin{cases} X_1 = 500 \\ X_2 = 2000 \\ X_3 = 100 \\ X_4 = 40 \end{cases}$$

posso vedere che per X_1, X_3 risulta un successo (1), mentre per gli altri un insuccesso (0).

$$\begin{cases} X_1 = 500 \\ X_2 = 2000 \\ X_3 = 100 \\ X_4 = 40 \end{cases} \implies \begin{cases} X_1 = 1 \\ X_2 = 0 \\ X_3 = 1 \\ X_4 = 0 \end{cases}$$

Quindi la probabilità di osservare il campione $\vec{x} = (500, 3000, 100, 7000)$ (in minuti) sarà:

$$\begin{aligned} p_{\vec{X}}(\vec{x}; \theta) &= \\ &= P(\vec{X} = \vec{x}; \theta) \\ &= P(X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 1, X_4 = 0; \theta) \\ &= \prod_{i=1}^4 P(X_i = x_i; \theta) \\ &= \prod_{i=1}^4 (\theta^{x_i} (1 - \theta)^{1-x_i}) \\ &= (\theta^1 (1 - \theta)^{1-1}) \cdot (\theta^0 (1 - \theta)^{1-0}) \cdot (\theta^1 (1 - \theta)^{1-1}) \cdot (\theta^0 (1 - \theta)^{1-0}) \\ &= \theta^{1+0+1+0} (1 - \theta)^{(1+1+1+1)-(1+0+1+0)} \\ &= \theta^2 (1 - \theta)^{4-(2)} \\ &= \theta^2 (1 - \theta)^2 \end{aligned}$$

Ho trovato la funzione di verosomiglianza $\mathbf{L}(\theta) = \theta^2 (1 - \theta)^2$

3. Applico la funzione di Log-verosomiglianza a $\mathbf{L}(\theta)$ ovvero:

$$\begin{aligned} \ell(\theta) = \ell(\mathbf{L}(\theta)) &= \ln [\theta^2 (1 - \theta)^2] \\ &= \ln(\theta^2) + \ln((1 - \theta)^2) \\ &= 2 \ln(\theta) + 2 \ln(1 - \theta) \end{aligned}$$

4. Calcolo derivata:

$$\begin{aligned} \ell'(\theta) &= (2 \ln(\theta) + 2 \ln(1 - \theta))' \\ &= (2 \ln(\theta))' + (2 \ln(1 - \theta))' \\ &= (2 \cdot \frac{1}{\theta}) + (2 \cdot \frac{1}{1 - \theta} \cdot (-1)) \\ &= \frac{2}{\theta} - \frac{2}{1 - \theta} \end{aligned}$$

5. Impongo derivata uguale a zero:

$$\begin{aligned} \frac{2}{\theta} - \frac{2}{1 - \theta} &= 0 \\ \frac{1}{\theta} - \frac{1}{1 - \theta} &= 0 \\ \theta &= 1 - \theta \\ \theta &= 0.5 \quad \text{Risposta corretta} \end{aligned}$$

8.1 Distribuzione χ^2

Utilizzo questa distribuzione quando ho un campione estratto da una popolazione Normale (ovvero quando i dati della popolazione si distribuiscono seguendo la distribuzione Normale $X \sim N(\mu, \sigma^2)$).

Teorema : $X \sim \chi^2_\nu$

Una variabile aleatoria continua X ha distribuzione χ^2 con ν gradi di libertà se non assume mai valori negativi:


$$\mathcal{X} = [0, +\infty)$$

Teorema : Media e Varianza di $X \sim \chi^2_\nu$

e

$$\mathbb{E}[X] = \nu$$

$$\mathbb{V}[X] = 2 \cdot \nu$$



Proprietà di χ^2 :

1. Dalla Normale a Chi-Quadro: ho una variabile normale standard Z (quindi già standardizzata), se la elevo al quadrato ottengo una Chi-Quadro con 1 grado di libertà

$$Z^2 \sim \chi^2_{\nu=1}$$

Se ho $Z = \frac{x-\mu}{\sigma} = -1.5$, elevandolo al quadrato ottengo $P(Z^2 \leq 2.25)$ che equivale a $P(\sqrt{Z^2} \leq \sqrt{2.25}) = P(|Z| \leq 1.5) = P(-1.5 \leq Z \leq 1.5)$.

- (a) Se cerco nella tavola della Normale Standard:

$$\begin{aligned} P(-1.5 \leq Z \leq 1.5) &= \phi(1.5) - \phi(-1.5) \\ &= \phi(1.5) - [1 - \phi(1.5)] \\ &= 0.9332 - [1 - 0.9332] = 0.8664 \end{aligned}$$

- (b) Se cerco nella tavola della Chi-Quadro:

$$\begin{aligned} P(\chi^2_\nu = 1 \leq x_p) &= P(\chi^2_\nu = 1 \leq 2.25) \\ &\text{cerco il valore che sta in mezzo tra 1.32 e 2.71} \\ &\text{che corrispondono a } p = 0.750 \text{ e } p = 0.900 \\ &= \frac{0.750 + 0.900}{2} = 0.825 \end{aligned}$$

χ^2_r		p									
r		0.005	0.010	0.025	0.050	0.100	0.250	0.500	0.750	0.900	0.950
1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10	0.45	1.32	2.71	3.84
2		0.01	0.02	0.05	0.10	0.21	0.58	1.39	2.77	4.61	5.99

2. Proprietà della somma: Se sommo diverse variabili Chi-Quadro indipendenti, ottengo ancora una Chi-Quadro:

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim \chi^2_{\nu} \quad \text{con} \quad \nu = \sum_{i=1}^n \nu_i$$

Siano:

$$\begin{cases} X_1 \sim \chi^2_2 \\ X_2 \sim \chi^2_3 \\ X_3 \sim \chi^2_5 \end{cases}$$

la loro somma sarà:

$$X_1 + X_2 + X_3 \text{ con } \nu = 2 + 3 + 5 = 10 \text{ gradi di libertà} \implies X_1 + X_2 + X_3 \sim \chi^2_{10}$$

3. Somma di normali standardizzate al quadrato: se ho n variabili Normali (anche con medie μ_i e varianze σ_i^2 diverse), le standardizzo singolarmente, le elevo al quadrato, poi le sommo. Il risultato equivale ad una χ^2 con $\nu = n$ gradi di libertà

Ho 3 sensori che misurano la temperatura (ognuno con media e varianza), e standardizzandoli ottengo:

$$\begin{cases} Z_1 = 1 \implies 1^2 = 1 \\ Z_2 = -2 \implies (-2)^2 = 4 \\ Z_3 = 0.5 \implies 0.5^2 = 0.25 \end{cases}$$

Sommandoli $1 + 4 + 0.25 = 5.25$ e quindi con Chi-Quadro avrò $x_p = 5.25$ e $\nu = 3$:

$$P(\chi^2_3 \leq 5.25) = 0.825$$

Teorema : Formule

Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione casuale da una popolazione Normale $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ per calcolare la probabilità sulla somma, media e/o varianza uso le seguenti formule:

1. **Somma**

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n \cdot \mu, n \cdot \sigma^2)$$

Uso tavole di Z

2. **Media**

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

Uso tavole di Z

3. **Varianza**

$$\frac{(n-1) \cdot S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{\nu=n-1}$$

Uso tavole di Chi-Quadro

Esercizio

Il diametro delle viti prodotte da un'azienda ha distribuzione Normale con $\mu = 150$ mm e varianza $\sigma^2 = 100$ mm². Siano $n = 9$ estratte dalla produzione (campione). Qual è la probabilità che la media campionaria assuma valori tra 145 e 155 mm?

$$P(145 \leq \bar{X} \leq 155) = \phi\left(\frac{x_2 - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}\right) - \phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}}\right)$$

devo calcolare la prob. sulla media uso proprietà 2 delle formule;
"standardizzo" usando la formula 2

$$\begin{aligned} &= \phi\left(\frac{155 - 150}{\sqrt{\frac{100}{9}}}\right) - \phi\left(\frac{145 - 150}{\sqrt{\frac{100}{9}}}\right) \\ &= \phi\left(\frac{155 - 150}{10/3}\right) - \phi\left(\frac{145 - 150}{10/3}\right) \\ &= \phi(1.5) - \phi(-1.5) \\ &= \phi(1.5) - [1 - \phi(1.5)] \\ &= 0.9332 - [1 - 0.9332] = 0.8664 \quad \text{Risposta corretta} \end{aligned}$$

Qual è la probabilità che la varianza campionaria sia maggiore di 121 mm?

$$P(S^2 > 121) = P\left(\chi_{\nu=n-1}^2 > \frac{(n-1) \cdot S^2}{\sigma^2}\right)$$

devo calcolare la prob. sulla varianza uso proprietà 3 delle formule;
"standardizzo" usando la formula 3

$$\begin{aligned} &= P\left(\chi_{\nu=9-1}^2 > \frac{(9-1) \cdot 121}{100}\right) \\ &= P\left(\chi_{\nu=8}^2 > \frac{(8) \cdot 121}{100}\right) \\ &= P(\chi_8^2 > 9.68) \\ &= 1 - P(\chi_8^2 \leq 9.68) \\ &= 1 - 0.700 = 0.3 \end{aligned}$$

o meglio scrivere $1 - P(\chi_8^2 \leq 9.68) \in (0.25, 0.5)$ Risposta corretta

8.2 Distribuzione T -Student

Utilizzo questa distribuzione quando ho un campione estratto da una popolazione Normale (ovvero quando i dati della popolazione si distribuiscono seguendo la distribuzione Normale $X \sim N(\mu, \sigma^2)$).

Nota


Uso la distribuzione T-Student quando voglio calcolare la probabilità della media e ho σ^2 ignoto.

Teorema : Media e Varianza di $X \sim t_\nu$

e

$$\mathbb{E}[X] = 0$$

$$\mathbb{V}[X] = \frac{\nu}{\nu - 2} \quad \text{con } \nu > 2$$

**Teorema : Formule**

Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione casuale da una popolazione Normale $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ per calcolare la probabilità sulla media uso la seguente formula:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{S^2}} \sim t_{\nu=n-1}$$

Esercizio

Il diametro delle viti prodotte da un'azienda ha distribuzione Normale con $\mu = 150$ mm e varianza $\sigma^2 = 100$ mm². Siano $n = 9$ estratte dalla produzione (campione). Qual è la probabilità che la media campionaria assuma valori che distano dalla media non più di $\left(1.86 \cdot \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right)$?

- Uso la Normale Standard perchè conosco σ^2 :

$$\begin{aligned}
 & P\left(\mu - \left(1.86 \cdot \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right) \leq \bar{X} \leq \mu + \left(1.86 \cdot \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right)\right) = \\
 & = P\left(\mu - 1.86 \leq \bar{X} \cdot \sqrt{\frac{n}{\sigma^2}} \leq \mu + 1.86\right) \\
 & = P\left(-1.86 \leq \bar{X} \cdot \sqrt{\frac{n}{\sigma^2}} - \mu \leq 1.86\right) \\
 & = P\left(-1.86 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}} \leq 1.86\right) \\
 & = P(-1.86 \leq Z \leq 1.86) \\
 & = \phi(z_2) - \phi(z_1) \\
 & = \phi(1.86) - \phi(-1.86) \\
 & = \phi(1.86) - [1 - \phi(1.86)] = 0.9371
 \end{aligned}$$

- Uso la T-Student perchè σ^2 ignoto (suppongo che l'es non mi abbia dato il valore

di σ^2):

$$P\left(\mu - \left(1.86 \cdot \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right) \leq \bar{X} \leq \mu + \left(1.86 \cdot \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right)\right) =$$

σ^2 è ignoto, quindi lo sostituisco con S^2

$$P\left(\mu - \left(1.86 \cdot \sqrt{\frac{S^2}{n}}\right) \leq \bar{X} \leq \mu + \left(1.86 \cdot \sqrt{\frac{S^2}{n}}\right)\right) =$$

uso formula per standardizzare

$$= P\left(-1.86 \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{S^2}} \leq 1.86\right)$$

$$= P(-1.86 \leq T_{\nu=n-1} \leq 1.86)$$

$$= P(-1.86 \leq T_{\nu=8} \leq 1.86)$$

$$= P(-1.86 \leq T_8 \leq 1.86)$$


$$= \phi(t_{p_2}) - \phi(t_{p_1})$$

$$= \phi(1.86) - \phi(-1.86)$$

$$= \phi(1.86) - [1 - \phi(1.86)]$$

$$= 0.95 - [1 - 0.95] = 0.90$$

Tavola C.3 Quantili della distribuzione T di Student.



r	p					
	0.60	0.70	0.80	0.90	0.95	0.975
1	0.325	0.727	1.376	3.078	6.314	12.706
2	0.289	0.617	1.061	1.886	2.920	4.303
3	0.277	0.584	0.978	1.638	2.353	3.182
4	0.271	0.569	0.941	1.533	2.132	2.776
5	0.267	0.559	0.920	1.476	2.015	2.571
6	0.265	0.553	0.906	1.440	1.943	2.447
7	0.263	0.549	0.896	1.415	1.895	2.365
8	0.262	0.546	0.889	1.397	1.860	2.306
9	0.261	0.543	0.883	1.383	1.833	2.262

Situazione	Formula	Distribuzione	Tavola
Probabilità sulla somma , σ^2 nota	$\frac{\sum X_i - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}$	$N(0, 1)$	Normale standard
Probabilità sulla media , σ^2 nota	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}$	$N(0, 1)$	Normale standard
Probabilità sulla varianza	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$	χ^2_{n-1}	Chi-quadro
Probabilità sulla media , σ^2 ignota	$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sqrt{S^2}}$	t_{n-1}	T-Student

Tabella 1: Quale distribuzione usare

8.3 Teorema del Limite Centrale

Questo teorema semplifica le cose quando voglio calcolare la probabilità della somma e della media di variabili aleatorie quando ho un campione di grandi dimensioni. Ho la possibilità di utilizzare la Distribuzione Normale per approssimare il comportamento di somme e media campionarie, quando non conosco la distribuzione della popolazione di partenza (oppure so con certezza che non ha distribuzione normale). Utile quando:

- La popolazione di partenza non ha Distribuzione Normale oppure non so che distribuzione abbia (può essere di Bernoulli, Binomiale, ...)
- Il campione è di grandi dimensioni
- La varianza σ^2 è finita e maggiore di zero

Teorema : Teorema del Limite Centrale

Siano una successione di variabili aleatorie i.i.d con valore atteso $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ e varianza $0 < \mathbb{V}[X_i] = \sigma^2 < +\infty$, allora:

1. La variabile standardizzata della media campionaria converge ad una Normale Standard:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sqrt{\sigma^2}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

2. La variabile standardizzata della somma converge ad una Normale Standard:

$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i) - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

3. La variabile standardizzata della media campionaria con σ^2 ignoto, converge ad una Normale Standard:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sqrt{S^2}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

Come usare il Teorema del Limite Centrale?

Se voglio calcolare la probabilità di una somma o media di una popolazione con distribuzione non Normale (Bernoulli, Binomiale, Poisson, ...) con campione sufficientemente grande, posso standardizzare le variabili aleatorie e poi calcolare con la tavola di Z. Ricordo che:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sqrt{\sigma^2}} \underset{\text{Media}}{\simeq} N(0, 1) \qquad \frac{\sum_{i=1}^n (X_i) - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}} \underset{\text{Somma}}{\simeq} N(0, 1)$$

$$\bar{X}_n \underset{\text{Media}}{\simeq} N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \sum X_i \underset{\text{Somma}}{\simeq} N(n\mu, n\sigma^2)$$

e che:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2}} \qquad N(\mu, \sigma^2)$$

quindi per standardizzare i valori faccio:

$$\phi\left(\frac{\sqrt{n}(x - \mu)}{\sqrt{\sigma^2}}\right) \underset{\text{Media}}{\qquad} \phi\left(\frac{x - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}\right) \underset{\text{Somma}}{\qquad}$$

e poi guardo le tavole di Z e trovo i valori.

8.4 Stima Puntuale

Siano i dati osservati

$$\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$$

la realizzazione di un campione casuale

$$\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$$

da una popolazione X (Normale, Binomiale, Bernoulliana, Poisson, ecc...).

La **stima puntuale** risponde alla domanda: "qual è il valore del parametro $(\mu, \theta, \dots)$ che ha generato i dati che sto osservando?"

8.4.1 Funzione di Verosomiglianza

Teorema : funzione di verosomiglianza

Sia $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ un campione con funzione di massa/densità di probabilità congiunta

$$p_{\vec{X}}(\cdot; \theta) = p_{(X_1, \dots, X_n)}(\cdot; \theta) = P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)$$

$$f_{\vec{X}}(\cdot; \theta) = f_{(X_1, \dots, X_n)}(\cdot; \theta)$$

e sia $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$ una sua realizzazione.

Si chiama **funzione di verosomiglianza** associata al campione osservato $\vec{x}$ la funzione:

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathcal{L}(\theta; \vec{x}) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n p_X(x_i; \theta) & \text{se } X \text{ discreta} \\ \prod_{i=1}^n f_X(x_i; \theta) & \text{se } X \text{ continua} \end{cases}$$

La funzione di verosomiglianza è il prodotto delle n funzioni di massa/densità di probabilità.

8.4.2 Funzione di Log-Verosomiglianza

Teorema : funzione di log-verosomiglianza

Si chiama **funzione di log-verosomiglianza** associata al campione osservato $\vec{x}$ la funzione logaritmo naturale che prende come input la funzione di verosomiglianza:

$$\ell(\theta) = \ell(\mathcal{L}(\theta; \vec{x})) = \ln(\mathcal{L}(\theta; \vec{x})) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n (\ln(p_X(x_i; \theta))) & \text{se } X \text{ discreta} \\ \sum_{i=1}^n (\ln(f_X(x_i; \theta))) & \text{se } X \text{ continua} \end{cases}$$

La funzione di log-verosomiglianza è la somma delle n funzioni di massa/densità di probabilità a cui viene applicato il logaritmo naturale (prima applico $\ln$ a ogni funzione di massa/densità di probabilità e poi le sommo).

8.4.3 Metodo della Massima Verosomiglianza

Serve per trovare il valore del parametro ignoto.

1. **Trovo la funzione di verosomiglianza:**

$$\mathcal{L}(\theta; \vec{x}) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n p_X(x_i; \theta) & \text{se } X \text{ discreta} \\ \prod_{i=1}^n f_X(x_i; \theta) & \text{se } X \text{ continua} \end{cases}$$

2. Trovo la funzione di log-verosomiglianza applicando il logaritmo naturale alla funzione del punto 1:

$$\ell(\theta) = \ell(\mathcal{L}(\theta; \vec{x})) = \ln(\mathcal{L}(\theta; \vec{x}))$$

3. Calcolo la derivata di $\ell(\theta)$ del punto 2
 4. Impongo la derivata uguale a zero (trovo il punto stazionario):

$$\ell'(\theta) = 0$$

5. Verifico che la derivata seconda sia negativa: il punto stazionario è un punto di massimo se la derivata seconda è negativa

- Se il parametro ignoto è solo uno, controllo che la derivata seconda sia negativa (il punto stazionario è un punto di massimo)

$$\ell''(\theta) < 0$$

- Se i parametri ignoti sono due, controllo che la derivata parziale seconda sia negativa con il test dell'Hessiana

Esempio: Stima di MV per il modello di Poisson

Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione casuale da una popolazione X con $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$.

1. Trovo la funzione di verosomiglianza

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\lambda; \vec{x}) &= \prod_{i=1}^n \left(e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} \right) \\ &= \left(e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_1}}{x_1!} \right) \cdot \left(e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_2}}{x_2!} \right) \dots \left(e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_n}}{x_n!} \right) \\ &= e^{-n\lambda} \frac{\lambda^{(x_1+x_2+\dots+x_n)}}{x_1! \cdot x_2! \cdot \dots \cdot x_n!} \\ &= e^{-n\lambda} \frac{\lambda^{(\sum x_i)}}{\prod x_i!} \end{aligned}$$

2. Trovo la funzione di log-verosomiglianza

$$\begin{aligned} \ell(\lambda; \vec{x}) &= \ln \left(e^{-n\lambda} \cdot \frac{\lambda^{(\sum x_i)}}{\prod x_i!} \right) \\ &\text{per le proprietà dei logaritmi} \\ &= \ln(e^{-n\lambda}) + \ln \left(\frac{\lambda^{(\sum x_i)}}{\prod x_i!} \right) \\ &= \ln(e^{-n\lambda}) + \ln(\lambda^{(\sum x_i)}) - \ln(\prod x_i!) \\ &= -n\lambda \cdot \ln(e) + \sum x_i \cdot \ln(\lambda) - \ln(\prod x_i!) \\ &\text{so che } \ln(e) = 1 \text{ quindi} \\ &= -n\lambda + \sum x_i \cdot \ln(\lambda) - \ln(\prod x_i!) \end{aligned}$$

3. Calcolo la derivata

in questo caso devo derivare rispetto a λ quindi tutto ciò che non contiene λ

scompare:

$$\begin{aligned}
 \ell'(\lambda) &= \left(-n\lambda + \sum x_i \cdot \ln(\lambda) - \ln \left(\prod x_i! \right) \right)' \\
 &= (-n\lambda)' + \left(\sum x_i \cdot \ln(\lambda) \right)' \\
 &= -n + \left[\left(\sum x_i \cdot \ln(\lambda) \right)' + \left(\sum x_i \cdot \ln(\lambda) \right)' \right] \\
 &= -n + \left[\left(\sum x_i' \cdot \ln(\lambda) \right) + \left(\sum x_i \cdot \ln(\lambda)' \right) \right] \\
 &= -n + \left(\sum x_i \cdot \ln(\lambda)' \right) \\
 &= -n + \left(\sum x_i \cdot \frac{1}{\lambda} \right) \\
 &= -n + \left(\frac{\sum x_i}{\lambda} \right)
 \end{aligned}$$

4. Impongo derivata prima uguale a zero e trovo stimatore

$$\begin{aligned}
 -n + \left(\frac{\sum x_i}{\lambda} \right) &= 0 \\
 \left(\frac{\sum x_i}{\lambda} \right) &= n \\
 \sum x_i &= \lambda n \\
 \hat{\lambda} &= \frac{\sum x_i}{n}
 \end{aligned}$$

La stima è

$$\hat{\lambda} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Lo stimatore è

$$\hat{\lambda} = \frac{\sum X_i}{n}$$

5. Verifico che la derivata seconda sia negativa

Il parametro ignoto è solo uno, quindi basta calcolare la derivata seconda

$$\begin{aligned}
 (\ell'(\lambda))' &= \left[-n + \left(\frac{\sum x_i}{\lambda} \right) \right]' \\
 &= (-n)' + \left(\frac{\sum x_i}{\lambda} \right)' \\
 &= \left(\frac{\sum x_i}{\lambda} \right)' \\
 &= \left[\frac{(\sum x_i' \cdot \lambda) - (\sum x_i \cdot \lambda')}{\lambda^2} \right] \\
 &= -\frac{(\sum x_i \cdot \lambda')}{\lambda^2} \\
 &= -\frac{\sum x_i}{\lambda^2}
 \end{aligned}$$

È negativa $(\ell'(\lambda))' < 0$ quindi la stima di MV di λ è $\hat{\lambda} = \frac{\sum x_i}{n}$ (che alla fine è la media), quindi:

$$\text{Stima di MV di } \lambda \quad \hat{\lambda}_{ML}(\vec{x}) = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$$

$$\text{Stimatore di MV di } \lambda \quad \hat{\lambda}_{ML}(\vec{X}) = \frac{\sum X_i}{n} = \bar{X}$$

Esempio: Stima di MV per il modello Normale

La differenza tra questo esempio e quello precedente è che il parametro ignoto della Normale è un vettore $\theta = (\mu, \sigma^2)$ quindi invece di trovare la derivata prima, devo trovare le derivate parziali (punto 3), imporre le derivate parziali uguali a zero in un sistema (punto 4) e successivamente verificare che la stima trovata sia quella giusta controllando che la derivata parziale seconda sia negativa con il test dell'Hessiana.

Siano $X_1, \dots, X_n$ variabili aleatorie i.i.d con $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

1. Trovo la funzione di verosomiglianza

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}(\mu, \sigma^2; \vec{x}) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_i - \mu}{\sigma}\right)^2} \\
 &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x_i - \mu}{\sigma}\right)^2} \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{\sigma^2}}\right)^n \cdot e^{-\frac{1}{2}\sum\left(\frac{x_i - \mu}{\sigma}\right)^2} \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{\sigma^2}}\right)^n \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum(x_i - \mu)^2} \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \cdot \left(\frac{1}{(\sigma^2)^{\frac{1}{2}}}\right)^n \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum(x_i - \mu)^2} \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \cdot \frac{1^n}{((\sigma^2)^{\frac{1}{2}})^n} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum(x_i - \mu)^2} \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \cdot \frac{1^n}{(\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum(x_i - \mu)^2} \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \cdot \left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^{\frac{n}{2}} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum(x_i - \mu)^2} \\
 &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \cdot (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum(x_i - \mu)^2}
 \end{aligned}$$

2. Trovo la funzione di log-verosomiglianza

$$\begin{aligned}
 \ell(\mu, \sigma^2; \vec{x}) &= \ln \left(\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \cdot (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum(x_i - \mu)^2} \right) \\
 &= \ln \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n \right] + \ln \left[(\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \right] + \ln \left[e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum(x_i - \mu)^2} \right] \\
 &= n \ln \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \ln(e) \\
 &= n \ln \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \\
 &= -n \ln(\sqrt{2\pi}) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \\
 &= -n \ln(2\pi^{1/2}) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \\
 &= -\frac{1}{2}n \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \\
 &= -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2
 \end{aligned}$$

3. Calcolo derivate prime parziali

- Derivata prima parziale rispetto a μ (quindi σ^2, n costanti)

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ell}{\partial \mu} &= \left(-\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \right)' \\ &= -0 - 0 - \left(\frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \right)' \\ &= - \left(\frac{1}{2\sigma^2} \sum (-2(x_i - \mu)) \right) \\ &= \frac{1}{\sigma^2} \sum (x_i - \mu) \\ \text{sapendo che } \mu &= n\mu \\ &= \frac{1}{\sigma^2} \sum (x_i - n\mu)\end{aligned}$$

- Derivata prima parziale rispetto a σ^2 (quindi μ, n costanti)

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ell}{\partial \sigma^2} &= \left(-\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \right)' \\ &= 0 - \left(\frac{n}{2} \ln(\sigma^2) \right)' - \left(\frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \right)' \\ \text{per evitare di impazzire impongo } \sigma^2 &= Y \\ &= - \left(\frac{n}{2} \ln(Y) \right)' - \left(\frac{1}{2Y} \sum (x_i - \mu)^2 \right)' \\ &= -\frac{n}{2Y} + \frac{1}{2Y^2} \sum (x_i - \mu)^2 \\ \text{sostituisco } Y & \\ &= -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum (x_i - \mu)^2 \\ &= \frac{1}{2\sigma^2} \left[-n + \frac{1}{\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \right]\end{aligned}$$

4. Impongo derivate prime parziali uguali a zero col sistema e trovo stimatori $\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2$

(a) **trovo $\hat{\mu}$**

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ell}{\partial \mu} &= 0 \\ \frac{1}{\sigma^2} \sum x_i - n\mu &= 0 \\ \frac{\sum x_i - n\mu}{\sigma^2} &= 0 \\ \sigma^2 \cdot \frac{\sum x_i - n\mu}{\sigma^2} &= \sigma^2 \cdot 0 \\ \sum x_i - n\mu &= 0 \\ \mu &= \frac{\sum x_i}{n}\end{aligned}$$

Quindi la stima è la media:

$$\hat{\mu} = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$$

(b) **trovo $\hat{\sigma}^2$**

$$\begin{aligned}\frac{\partial \ell}{\partial \sigma^2} &= 0 \\ \frac{1}{2\sigma^2} \left[-n + \frac{1}{\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2 \right] &= 0 \\ &\vdots \\ \sigma^2 &= \frac{1}{n} \sum (x_i - \mu)^2\end{aligned}$$

sostituisco sapendo che $\mu = \frac{\sum x_i}{n} = \bar{x}$ vedi passo prec.

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

Quindi la stima è la varianza:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

5. Verifico che la derivata seconda parziale sia negativa con il test dell'Hessiana

• **Calcolo delle derivate parziali seconde:**

$$\frac{\partial^2 \ell}{\partial \mu^2} = \frac{\partial}{\partial \mu} \left[\frac{1}{\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i - n\mu \right) \right] = -\frac{n}{\sigma^2}$$

$$\frac{\partial^2 \ell}{\partial (\sigma^2)^2} = \frac{\partial}{\partial \sigma^2} \left[-\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \right] = \frac{n}{2(\sigma^2)^2} - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{(\sigma^2)^3}$$

$$\frac{\partial^2 \ell}{\partial \mu \partial \sigma^2} = \frac{\partial}{\partial \sigma^2} \left[\frac{1}{\sigma^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i - n\mu \right) \right] = -\frac{1}{(\sigma^2)^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i - n\mu \right)$$

• **Valutazione nel punto stazionario $(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$:** Sostituendo le stime di massima verosimiglianza $\hat{\mu} = \bar{x}$ (da cui $\sum x_i = n\bar{x}$) e $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ (da cui $\sum (x_i - \bar{x})^2 = n\hat{\sigma}^2$):

$$\left. \frac{\partial^2 \ell}{\partial \mu^2} \right|_{(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)} = -\frac{n}{\hat{\sigma}^2}$$

$$\left. \frac{\partial^2 \ell}{\partial \mu \partial \sigma^2} \right|_{(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)} = -\frac{1}{(\hat{\sigma}^2)^2} \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n x_i - n\bar{x} \right)}_{=0} = 0$$

$$\left. \frac{\partial^2 \ell}{\partial (\sigma^2)^2} \right|_{(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)} = \frac{n}{2(\hat{\sigma}^2)^2} - \frac{\overbrace{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}^{= n\hat{\sigma}^2}}{(\hat{\sigma}^2)^3} = \frac{n}{2(\hat{\sigma}^2)^2} - \frac{n}{(\hat{\sigma}^2)^2} = -\frac{n}{2(\hat{\sigma}^2)^2}$$

- **Costruzione della Matrice Hessiana** $H(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$: Poiché le derivate miste si azzerano, la matrice assume una struttura diagonale:

$$H(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 \ell}{\partial \mu^2} & \frac{\partial^2 \ell}{\partial \mu \partial \sigma^2} \\ \frac{\partial^2 \ell}{\partial \sigma^2 \partial \mu} & \frac{\partial^2 \ell}{\partial (\sigma^2)^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{n}{\hat{\sigma}^2} & 0 \\ 0 & -\frac{n}{2(\hat{\sigma}^2)^2} \end{bmatrix}$$

- **Test del Determinante:** Il determinante dell'Hessiana è positivo e $-\frac{n}{\hat{\sigma}^2} < 0$ quindi la stima di MV di (μ, σ^2) è $(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$. Ovvero le stime trovate nel punto 4 sono giuste.

8.4.4 Metodi per valutare gli stimatori

Ho trovato lo stimatore per il parametro ignoto e voglio verificare le sue proprietà:

- Non distorsione
- Efficienza
- Consistenza

Teorema : Non distorsione

Sia $T_n(\vec{X})$ uno stimatore per il parametro θ di un certo modello statistico. Lo stimatore è detto **non distorto** se:

$$\mathbb{E}_\theta[T_n(\vec{X})] = \theta$$

E **distorto** se:

$$\mathbb{E}_\theta[T_n(\vec{X})] \neq \theta$$

Nel caso in cui lo stimatore fosse distorto, si calcola il valore della **distorsione** come segue:

$$\mathbb{B}_\theta(T_n(\vec{X})) = \mathbb{E}_\theta[T_n(\vec{X})] - \theta$$

Stimatore non distorto

Nell'esempio precedente con il metodo di MV ho trovato sia $\hat{\lambda} = \frac{\sum X_i}{n}$ è lo stimatore del parametro λ con Distribuzione di Poisson.

Lo stimatore è distorto o non distorto?

$$T_n(\vec{X}) = \hat{\lambda} = \frac{\sum X_i}{n} \implies T_n(\vec{X}) = \hat{\lambda}$$

Verifico uguaglianza:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[T_n(\vec{X})] &\stackrel{?}{=} \lambda \\
 \mathbb{E}[\hat{\lambda}] &\stackrel{?}{=} \lambda \\
 \mathbb{E}\left[\frac{\sum X_i}{n}\right] &\stackrel{?}{=} \lambda \\
 \frac{1}{n}\mathbb{E}\left[\sum X_i\right] &\stackrel{?}{=} \lambda \\
 \frac{1}{n}\mathbb{E}[X_1 + \dots + X_n] &\stackrel{?}{=} \lambda \\
 \frac{1}{n}(\mathbb{E}[X_1] + \dots + \mathbb{E}[X_n]) &\stackrel{?}{=} \lambda \\
 \text{nella Poisson, } \mathbb{E}[X] = \lambda, \text{ quindi} \\
 \frac{1}{n}(\lambda + \dots + \lambda) &\stackrel{?}{=} \lambda \\
 \frac{1}{n}(n\lambda) &\stackrel{?}{=} \lambda \\
 \lambda &\stackrel{\checkmark}{=} \lambda
 \end{aligned}$$

L'uguaglianza è vera, quindi lo stimatore è non distorto.

Stimatore distorto

Suppongo che lo stimatore trovato sia $\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$ verifico se è distorto oppure no:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[T_n(\vec{X})] &\stackrel{?}{=} \lambda \\
 \mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2\right] &\stackrel{?}{=} \lambda \\
 \frac{1}{n}\mathbb{E}\left[\sum (X_i - \bar{X})^2\right] &\stackrel{?}{=} \lambda \\
 \frac{n-1}{n}\lambda &\neq \lambda
 \end{aligned}$$

Lo stimatore è distorto, calcolo il valore della distorsione:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{B}_\lambda(T_n(\vec{X})) &= \mathbb{E}[T_n(\vec{X})] - \lambda \\
 &= \frac{n-1}{n}\lambda - \lambda \\
 &= -\frac{\lambda}{n}
 \end{aligned}$$

Nel caso avessi $n = 5, \lambda = 4$ allora la distorsione sarebbe:

$$\mathbb{B}_\lambda(T_n(\vec{X})) = -\frac{\lambda}{n} = -\frac{4}{5} = -0.8$$

Teorema : Efficienza

Sia T uno stimatore per il parametro θ di un certo modello statistico. L'**errore quadratico medio** di T viene definito come:

$$MSE_{\theta}(T) = \mathbb{V}_{\theta}[T(\vec{X})] + \mathbb{B}_{\theta}(T(\vec{X}))^2$$

e se il parametro non è distorto^a:

$$MSE_{\theta}(T) = \mathbb{V}_{\theta}[T(\vec{X})]$$

^aperchè quando il parametro non è distorto, per definizione $\mathbb{B}_{\theta}(T(\vec{X})) = 0$

Siano $T_1(\vec{X}), T_2(\vec{X})$ due stimatori del parametro θ . Lo stimatore T_1 è **più efficiente** di T_2 se

$$MSE_{\theta}(T_1(\vec{X})) \leq MSE_{\theta}(T_2(\vec{X}))$$

e misuro **quanto è più efficiente** dalla formula:

$$\text{eff}_{\theta}(T_1, T_2) = \frac{MSE_{\theta}(T_2(\vec{X}))}{MSE_{\theta}(T_1(\vec{X}))}$$

Quindi nella prima indico qual è lo stimatore più efficiente tra i due e nella seconda di quanto (valore numerico) è più efficiente dell'altro.

Teorema : Consistenza

Uno stimatore $T(\vec{X})$ per il parametro θ di un certo modello statistico si dice **consistente** se:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} MSE_{\theta}(T(\vec{X})) = 0$$

Modello per la popolazione	Dimensione del campione	Parametro da stimare	Migliore stimatore	Distribuzione campionaria
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	qualsiasi	μ	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$	$N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
$X \sim f(\mu, \sigma^2)$	n grande	μ	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$	$N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
$X \sim Ber(\theta)$	n grande	θ	$\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum X_i$	$N\left(\theta, \frac{\theta(1-\theta)}{n}\right)$
$X \sim \mathcal{P}(\lambda)$	qualsiasi	λ	$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$	$N\left(\lambda, \frac{\lambda}{n}\right)$
$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	qualsiasi	σ^2	$\bar{S}^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$	$\frac{(n-1)\bar{S}^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$

8.5 Stima Intervallare

Sappiamo che con la stima puntuale possiamo trovare uno stimatore per un parametro ignoto θ a cui possiamo attribuire un valore numerico (stima).

Un "buon" stimatore assume valori vicini al vero valore del parametro θ , ma la probabilità che lo stimatore assuma valore esattamente uguale al parametro è pari a zero. Quindi, oltre alla stima puntuale, si riporta un **intervallo di confidenza**, ossia un intervallo di valori che ci aspettiamo contenga, con un certo **livello di confidenza**, il vero valore del parametro.

8.5.1 Come costruire gli intervalli di confidenza per n piccolo: Media

Teorema : Stima Intervallare della Media con σ^2 nota (Normale Standard)

Sia:

- Popolazione Normale
- Varianza nota

$$\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

L'ampiezza intervallare A si misura come segue:

$$A = \left(2 \cdot z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right) \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Esercizio 1

Nell'ambito della selezione del personale di una grande azienda, viene richiesto lo svolgimento di un esercizio al computer per il quale viene rilevato il tempo di esecuzione. I tempi osservati (in secondi) dei 24 concorrenti sono:

345, 389, 363, 417, 476, 334, 417, 427

269, 370, 289, 336, 305, 285, 294, 319

370, 338, 297, 328, 414, 257, 284, 410

ammettendo che il tempo di esecuzione dell'esercizio abbia distribuzione normale con deviazione standard 50, **determinare l'intervallo di confidenza al 95% per la media della popolazione.**

Soluzione

Devo trovare la stima intervallare per la media μ della popolazione e ho i seguenti dati:

1. Campione $n = 24$
2. Varianza nota
3. Popolazione Normale
4. Intervallo di confidenza 95%

quindi uso:

$$\left(\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad , \quad \bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

1. **Trovo α**

$$\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$$

2. **Trovo $1 - \frac{\alpha}{2}$**

$$\begin{aligned} 1 - \frac{\alpha}{2} &= 1 - \frac{0.05}{2} \\ &= 0.975 \end{aligned}$$

3. Trovo $\pm z_{1-\frac{\alpha}{2}}$

$$z_{0.975} = ?$$

guardo la tavola della Normale Standard
= 1.96

I valori sono

$$-z_{1-\alpha/2} = -1.96 \quad z_{1-\alpha/2} = 1.96$$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756

4. Calcolo intervallo

L'esercizio non mi ha fornito la media campionaria, quindi la calcolo

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = 347.21$$

allora

$$\left(\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad , \quad \bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\left(347.21 - 1.96 \cdot \frac{50}{\sqrt{24}} \quad , \quad 347.21 + 1.96 \cdot \frac{50}{\sqrt{24}} \right)$$

$$(327.21 \quad , \quad 367.21) \quad \text{Risposta corretta}$$

Teorema : Stima Intervallare della Media con σ^2 ignota (T -Student)

Sia:

- Popolazione Normale
- Varianza **non** nota

$$\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

L'ampiezza intervallare A si misura come segue:

$$A = \left(2 \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2}} \right) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Esercizio 2

Il produttore di una certa marca di sigarette desidera controllare il quantitativo medio di catrame in esse contenuto. Viene osservato un campione casuale di 25 sigarette:

11.1, 10.5, 11.4, 10.7, 11.4,
10.8, 11.2, 10.3, 11.6, 10.6,
12.7, 10.6, 11.7, 10.6, 10.7,
12.2, 10.7, 11.0, 10.5, 11.0,
10.9, 10.7, 10.1, 11.3, 10.5

assumendo che la popolazione sia normale, **determinare l'intervallo di confidenza per μ al 99%**.

Soluzione

Devo trovare la stima intervallare per la media μ della popolazione e ho i seguenti dati:

1. Campione $n = 25$
2. Varianza non nota
3. Popolazione Normale
4. Intervallo di confidenza 99%

quindi uso:

$$\left(\bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

1. **Trovo α**

$$\alpha = 1 - 0.99 = 0.01$$

2. **Trovo $1 - \frac{\alpha}{2}$**

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0.01}{2} = 0.995$$

3. **Trovo $\pm t_{1-\frac{\alpha}{2}}$**

$$t_{0.995} = ?$$

guardo la tavola della T -Student con $n - 1 = 25 - 1 = 24$ gradi di libertà
= 2.797

I valori sono

$$-t_{1-\alpha/2} = -2.797 \quad t_{1-\alpha/2} = 2.797$$

r	p							
	0.60	0.70	0.80	0.90	0.95	0.975	0.990	1
1	0.325	0.727	1.376	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	0.289	0.617	1.061	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	0.277	0.584	0.978	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	0.271	0.569	0.941	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	0.267	0.559	0.920	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	0.265	0.553	0.906	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	0.263	0.549	0.896	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	0.262	0.546	0.889	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	0.261	0.543	0.883	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	0.260	0.542	0.879	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	0.260	0.540	0.876	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	0.259	0.539	0.873	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	0.259	0.538	0.870	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	0.258	0.537	0.868	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	0.258	0.536	0.866	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	0.258	0.535	0.865	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	0.257	0.534	0.863	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	0.257	0.534	0.862	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	0.257	0.533	0.861	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	0.257	0.533	0.860	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	0.257	0.532	0.859	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	0.256	0.532	0.858	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	0.256	0.532	0.858	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	0.256	0.531	0.857	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	0.256	0.531	0.856	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787

4. **Calcolo intervallo**

L'esercizio non mi ha fornito la media campionaria, quindi la calcolo

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = 11$$

L'esercizio non mi ha fornito la varianza campionaria, quindi la calcolo

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1} = 0.357$$

quindi

$$s = \sqrt{0.357}$$

allora

$$\begin{pmatrix} \bar{x} - t_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} & , & \bar{x} + t_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \\ \left(11 - 2.797 \cdot \frac{\sqrt{0.357}}{\sqrt{25}} & , & 11 + 2.797 \cdot \frac{\sqrt{0.357}}{\sqrt{25}} \right) \\ (10.67 & , & 11.33) \end{pmatrix} \quad \text{Risposta corretta}$$

8.5.2 Come costruire gli intervalli di confidenza per n piccolo: Varianza

Teorema : Stima Intervallare della Varianza ($\chi^2_{\nu=n-1}$ Chi-Quadro)

Sia:

- Popolazione Normale

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}}$$

L'ampiezza intervallare A si misura come segue:

$$A = \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}} \right) - \left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}} \right)$$

Esercizio 3

Un'azienda produttrice di orologi di precisione dichiara che questi sono soggetti a un'oscillazione massima di 1 secondo al mese. Viene osservato l'errore mensile di 20 orologi e si trova $s^2 = 0.14$. assumendo che la popolazione sia normale, **determinare l'intervallo di confidenza per σ^2 al 95%**.

Soluzione

Devo trovare la stima intervallare per la media σ^2 della popolazione e ho i seguenti dati:

1. Campione $n = 20$
2. Popolazione Normale
3. Intervallo di confidenza 95%

quindi uso:

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2} \right)$$

1. Trovo α

$$\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$$

2. Trovo $1 - \frac{\alpha}{2}, \alpha/2$

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0.05}{2} = 0.975$$

$$\frac{\alpha}{2} = \frac{0.05}{2} = 0.025$$

3. Trovo $\chi_{1-\alpha/2}^2, \chi_{\alpha/2}^2$

$$\chi_{0.975}^2 = ?$$

guardo la tavola della Chi-Quadro con $n - 1 = 20 - 1 = 19$ gradi di libertà
= 32.85

r	p																	
	0.005	0.010	0.025	0.050	0.100	0.250	0.500	0.750	0.900	0.950	0.975	0.99						
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10	0.45	1.32	2.71	3.84	5.02	6.4						
2	0.01	0.02	0.05	0.10	0.21	0.58	1.39	2.77	4.61	5.99	7.38	9.2						
3	0.07	0.11	0.22	0.35	0.58	1.21	2.37	4.11	6.25	7.81	9.35	11.						
4	0.21	0.30	0.48	0.71	1.06	1.92	3.36	5.39	7.78	9.49	11.14	13.						
5	0.41	0.55	0.83	1.15	1.61	2.67	4.35	6.63	9.24	11.07	12.83	15.						
6	0.68	0.87	1.24	1.64	2.20	3.45	5.35	7.84	10.64	12.59	14.45	16.						
7	0.99	1.24	1.69	2.17	2.83	4.25	6.35	9.04	12.02	14.07	16.01	18.						
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	5.07	7.34	10.22	13.36	15.51	17.53	20.						
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	5.90	8.34	11.39	14.68	16.92	19.02	21.						
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	6.74	9.34	12.55	15.99	18.31	20.48	23.						
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	7.58	10.34	13.70	17.28	19.68	21.92	24.						
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	8.44	11.34	14.85	18.55	21.03	23.34	26.						
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	9.30	12.34	15.98	19.81	22.36	24.74	27.						
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	10.17	13.34	17.12	21.06	23.68	26.12	29.						
15	4.60	5.23	6.26	7.26	8.55	11.04	14.34	18.25	22.31	25.00	27.49	30.						
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	11.91	15.34	19.37	23.54	26.30	28.85	32.						
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	12.79	16.34	20.49	24.77	27.59	30.19	33.						
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.86	13.68	17.34	21.60	25.99	28.87	31.53	34.						
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	14.56	18.34	22.72	27.20	30.14	32.85	36.						
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	15.45	19.34	23.83	28.41	31.41	34.17	37.						

$$\chi_{0.025}^2 = ?$$

guardo la tavola della Chi-Quadro con $n - 1 = 20 - 1 = 19$ gradi di libertà
= 8.91

r	p																	
	0.005	0.010	0.025	0.050	0.100	0.250	0.500	0.750	0.900	0.950	0.975	0.99						
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.10	0.45	1.32	2.71	3.84	5.02	6.4						
2	0.01	0.02	0.05	0.10	0.21	0.58	1.39	2.77	4.61	5.99	7.38	9.2						
3	0.07	0.11	0.22	0.35	0.58	1.21	2.37	4.11	6.25	7.81	9.35	11.						
4	0.21	0.30	0.48	0.71	1.06	1.92	3.36	5.39	7.78	9.49	11.14	13.						
5	0.41	0.55	0.83	1.15	1.61	2.67	4.35	6.63	9.24	11.07	12.83	15.						
6	0.68	0.87	1.24	1.64	2.20	3.45	5.35	7.84	10.64	12.59	14.45	16.						
7	0.99	1.24	1.69	2.17	2.83	4.25	6.35	9.04	12.02	14.07	16.01	18.						
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	5.07	7.34	10.22	13.36	15.51	17.53	20.						
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	5.90	8.34	11.39	14.68	16.92	19.02	21.						
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	6.74	9.34	12.55	15.99	18.31	20.48	23.						
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	7.58	10.34	13.70	17.28	19.68	21.92	24.						
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	8.44	11.34	14.85	18.55	21.03	23.34	26.						
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	9.30	12.34	15.98	19.81	22.36	24.74	27.						
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	10.17	13.34	17.12	21.06	23.68	26.12	29.						
15	4.60	5.23	6.26	7.26	8.55	11.04	14.34	18.25	22.31	25.00	27.49	30.						
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	11.91	15.34	19.37	23.54	26.30	28.85	32.						
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.09	12.79	16.34	20.49	24.77	27.59	30.19	33.						
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.86	13.68	17.34	21.60	25.99	28.87	31.53	34.						
19	6.84	7.63	8.91	10.12	11.65	14.56	18.34	22.72	27.20	30.14	32.85	36.						
20	7.43	8.26	9.59	10.85	12.44	15.45	19.34	23.83	28.41	31.41	34.17	37.						

I valori sono

$$\chi_{0.975}^2 = 32.85 \quad \chi_{0.025}^2 = 8.91$$

4. Calcolo intervallo

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}} \right)$$

$$\left(\frac{(20-1)0.14}{32.85}, \frac{(20-1)0.14}{8.91} \right)$$

$$\left(\frac{19 \cdot 0.14}{32.85}, \frac{19 \cdot 0.14}{8.91} \right)$$

$$(0.08, 0.30) \quad \text{Risposta corretta}$$

8.5.3 Come costruire gli intervalli di confidenza per n grande: Media

Teorema : Stima Intervallare della Media per n grande (Normale Standard)

Sia:

- Popolazione qualsiasi

$$\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

L'ampiezza intervallare A si misura come segue:

$$A = \left(2 \cdot z_{1-\frac{\alpha}{2}} \right) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Esercizio 4

Nel processo di controllo del peso delle confezioni di pasta da 500 grammi, un pastificio considera non conformi i pesi al di sotto di 485 grammi o al di sopra di 515 grammi. Per valutare l'efficienza di una confezionatrice, l'azienda esamina un campione di 830 confezioni e trova che 42 di esse sono non conformi. **Determinare l'intervallo di confidenza al 95% per θ .**

Soluzione

Devo trovare la stima intervallare per la media μ della popolazione e ho i seguenti dati:

1. Campione $n = 830$
2. Popolazione Bernoullina
3. Intervallo di confidenza 95%

quindi uso:

$$\left(\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

1. Trovo α

$$\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$$

2. Trovo $1 - \frac{\alpha}{2}$

$$1 - \frac{\alpha}{2} = 1 - \frac{0.05}{2}$$

$$= 0.975$$

3. Trovo $\pm z_{1-\frac{\alpha}{2}}$

$$z_{0.975} = ?$$

guardo la tavola della Normale Standard

$$= 1.96$$

I valori sono

$$-z_{1-\alpha/2} = -1.96 \quad z_{1-\alpha/2} = 1.96$$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756

4. Calcolo intervallo

So che la popolazione è Bernoulliana e che la sua varianza campionaria è $s^2 = \theta(1 - \theta)$, quindi questa formula

$$\left(\bar{x} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \quad , \quad \bar{x} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

diventa

$$\left(\bar{\theta} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sqrt{\theta(1-\theta)}}{\sqrt{n}} \quad , \quad \bar{\theta} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sqrt{\theta(1-\theta)}}{\sqrt{n}} \right)$$

L'esercizio non mi ha fornito la media campionaria, quindi la calcolo

$$\bar{\theta} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{n \text{ successi}}{\text{campione}} = \frac{42}{830} = 0.051$$

allora

$$\left(\bar{\theta} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sqrt{\theta(1-\theta)}}{\sqrt{n}} \quad , \quad \bar{\theta} + z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sqrt{\theta(1-\theta)}}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\left(0.05 - 1.96 \cdot \frac{\sqrt{0.05(1-0.05)}}{\sqrt{830}} \quad , \quad 0.05 + 1.96 \cdot \frac{\sqrt{0.05(1-0.05)}}{\sqrt{830}} \right)$$

(0.036 , 0.066) Risposta corretta

STIMA INTERVALLARE

n piccolo $n < 30$

della media μ

della varianza σ^2

σ^2 nota

$$\bar{X} \pm Z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

NORMALE STANDARD

σ^2 ignota

$$\bar{X} \pm t_{1-\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

T-STUDENT

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}} \right)$$

CHI-QUADRO con $n-1$
GRADI DI LIBERTA'

n grande $n \geq 30$

della media μ

$$\bar{X} \pm Z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

NORMALE STANDARD

8.6 Verifica delle Ipotesi

Il test d'ipotesi è una procedura che permette di decidere, sulla base di un campione, se c'è abbastanza evidenza per mettere in discussione un'affermazione fatta sulla popolazione.

Teorema : Ipotesi nulla e Ipotesi alternativa

L'ipotesi sottoposta a verifica viene chiamata **ipotesi nulla** (considerata vera fino a prova contraria)

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

e l'ipotesi che la contraddice, viene denominata **ipotesi alternativa** H_1 .

Obbiettivo

L'obbiettivo è effettuare un **test d'ipotesi** per:


- rifiutare H_0
- non rifiutare H_0 (in questo caso non si rifiuta nè si accetta l'ipotesi)
- accettare H_0

8.6.1 Sistema di ipotesi

Teorema : Ipotesi alternativa unilaterale destra

Fissato un valore del parametro θ_0 , si ha:

$$\begin{cases} H_0 : \theta = \theta_0 & \text{ipotesi nulla} \\ H_1 : \theta > \theta_0 & \text{ipotesi alternativa unilaterale destra} \end{cases}$$




Se il campione estratto proviene:

- da $\mathcal{A}$, si accetta H_0
- da $\mathcal{R}$, si rifiuta H_0 (per ogni campione $> c$, si rifiuta l'ipotesi nulla)

Teorema : Ipotesi alternativa unilaterale sinistra

Fissato un valore del parametro θ_0 , si ha:

$$\begin{cases} H_0 : \theta = \theta_0 & \text{ipotesi nulla} \\ H_1 : \theta < \theta_0 & \text{ipotesi alternativa unilaterale sinistra} \end{cases}$$




Se il campione estratto proviene:

- da $\mathcal{A}$, si accetta H_0
- da $\mathcal{R}$, si rifiuta H_0 (per ogni campione $< c$, si rifiuta l'ipotesi nulla)

Teorema : Ipotesi alternativa bidirezionale

Fissato un valore del parametro θ_0 , si ha:

$$\begin{cases} H_0 : \theta = \theta_0 & \text{ipotesi nulla} \\ H_1 : \theta \neq \theta_0 & \text{ipotesi alternativa bilaterale} \end{cases}$$



Se il campione estratto proviene:

- da $\mathcal{A}$, si accetta H_0
- da $\mathcal{R}$, si rifiuta H_0 (per ogni campione $> c$ e per ogni campione $< c$, si rifiuta l'ipotesi nulla)

8.6.2 Errori del Test

- **Errore di I tipo:** rifiutare H_0 quando vera (errore più grave)
- **Errore di II tipo:** accettare H_0 quando falsa

Esempio

Nel contesto giuridico, si assume che l'imputato è innocente fino a prova contraria

$$H_0 : \text{imputato innocente}$$

Quindi:

- Errore di I tipo: l'imputato viene dichiarato colpevole quando in realtà è innocente (questo errore è considerato più grave perchè un fratm ingiustamente ingabbiat' insomma, gli rovini la vita)
- Errore di II tipo: l'imputato viene dichiarato innocente quando in realtà è colpevole

Teorema : Probabilità di commettere l'errore

- **Probabilità di commettere l'errore I (livello di significatività):** indicato con $\alpha(\theta)$
- **Probabilità di commettere l'errore II:** indicato con $\beta(\theta)$
- **Probabilità di rifiutare H_0 quando è falsa^a(Potenza del test):** indicato con $\pi(\theta) = 1 - \beta(\theta)$

^aovvero la probabilità di dimostrare che H_0 è davvero falsa.

8.6.3 Passi da seguire nella verifica delle ipotesi

1. **Definire H_0 e H_1**
2. **Scegliere la statistica test (media campionaria, varianza campionaria, ecc..)**
3. **Scegliere il livello di significatività α**
4. **Definizione del valore critico c e della regione di rifiuto**

$$c = \begin{cases} z_{1-\alpha} & \text{con ipotesi alternativa destra} \\ -z_{1-\alpha} & \text{con ipotesi alternativa sinistra} \\ z_{1-\alpha/2} & \text{con ipotesi alternativa bilaterale} \end{cases}$$

5. **Estrazione del campione**
6. **Calcolo del valore osservato z_{oss} attraverso la statistica test**
7. **Analizzare se il valore osservato cade nella regione di rifiuto o nella regione di accettazione:**
 - Se z_{oss} cade nella regione di rifiuto, allora si rifiuta H_0 .
 - Se z_{oss} cade nella regione di accettazione, allora non si rifiuta H_0 al livello di significatività fissato.

Esercizio 1

Siano:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 500 \\ H_1 : \mu > 500 \end{cases}$$

con $\alpha = 0.01$, $\bar{x} = 502.9$, $\sigma^2 = 35$ e con $n = 40$ campioni. **Verificare l'ipotesi nulla H_0 .**

Soluzione

1. Calcolare valore critico $z_{1-\alpha}$

$$z_{1-\alpha} = z_{1-0.01} = z_{0.99} = 2.326$$

2. Definire zona di rifiuto

$$\mathcal{R}_\alpha = \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > z_{1-\alpha} \right\} = \left\{ \frac{\bar{x} - 500}{\frac{\sqrt{35}}{\sqrt{40}}} > 2.326 \right\}$$

3. Calcolo del valore osservato z_{oss} attraverso la statistica test

$$z_{oss} = \frac{\bar{x} - 500}{\frac{\sqrt{35}}{\sqrt{40}}} = \frac{502.9 - 500}{\frac{\sqrt{35}}{\sqrt{40}}} = 3.100$$

4. Analizzare se z_{oss} cade nella regione di rifiuto o no

$3.100 > 2.326 \implies z_{oss}$ cade nella regione di rifiuto
quindi **rifiuto** l'ipotesi nulla H_0 .

Esercizio 2

Siano:

$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq 30 \\ H_1 : \mu > 30 \end{cases}$$

con $\alpha = 0.05$, $\sigma^2 = 50$ e con i seguenti campioni:

43.5, 32, 26.4, 37.8, 25, 31, 46.8, 19

28.5, 35, 23.7, 32.5, 37.9, 36, 31.4

Verificare l'ipotesi nulla H_0 .

Soluzione

1. Calcolare valore critico $z_{1-\alpha}$

$$z_{1-\alpha} = z_{1-0.05} = z_{0.95} = 1.645$$

2. Definire zona di rifiuto

$$\mathcal{R}_\alpha = \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > z_{1-\alpha} \right\} = \left\{ \frac{\bar{x} - 30}{\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{15}}} > 1.645 \right\}$$

3. Calcolo del valore osservato z_{oss} attraverso la statistica test

$$z_{oss} = \frac{\bar{x} - 30}{\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{15}}} =$$

mi manca il valore di $\bar{x}$, lo calcolo:

$$\bar{x} = \frac{43.5 + 32 + 26.4 + \dots + 32.5 + 37.9 + 36 + 31.4}{15} = 32.43$$

quindi:

$$z_{oss} = \frac{\bar{x} - 30}{\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{15}}} = \frac{32.43 - 30}{\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{15}}} = 1.330$$

4. Analizzare se z_{oss} cade nella regione di rifiuto o no

$1.330 < 1.645 \implies z_{oss}$ cade nella regione di accettazione⁴

quindi **non rifiuto** l'ipotesi nulla H_0 .

⁴ perché non cade nella regione di rifiuto, essendo minore del valore critico

Esercizio 3

Siano:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 8 \\ H_1 : \mu \neq 8 \end{cases}$$

con $\alpha = 0.05$, $\sigma^2 = 4$ e $\bar{x} = 9.5$ e $n = 5$. **Verificare l'ipotesi nulla H_0 .**

Soluzione

1. Calcolare il valore critico $|z_{1-\alpha/2}|$

$$z_{1-\alpha/2} = z_{1-0.05/2} = z_{0.975} = 1.960$$

quindi

$$z_{1-\alpha/2} = 1.960 \quad -z_{1-\alpha/2} = -1.960$$

2. Definire zona di rifiuto

$$\mathcal{R}_\alpha = \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_{1-\alpha/2} \right\} \cup \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{1-\alpha/2} \right\}$$

$$\mathcal{R}_\alpha = \left\{ \frac{\bar{x} - 8}{\sqrt{4}/\sqrt{5}} > 1.960 \right\} \cup \left\{ \frac{\bar{x} - 8}{\sqrt{4}/\sqrt{5}} < -1.960 \right\}$$

3. Calcolo z_{oss} attraverso la statistica test (media campionaria)

$$z_{oss} = \frac{\bar{x} - 8}{\sqrt{4}/\sqrt{5}} = \frac{9.5 - 8}{\sqrt{4}/\sqrt{5}} = 1.677$$

4. Analizzo se z_{oss} è cade nella regione di rifiuto o no

1.667 sta tra -1.960 e +1.960 quindi cade nella regione di accettazione
quindi **non rifiuto** l'ipotesi nulla H_0 .

Oppure posso semplicemente dire che:

$$\text{se } |z_{oss}| > z_{1-\alpha/2} \implies \text{rifiuto } H_0$$

ma ho visto che:

$$\begin{aligned} |z_{oss}| &= |1.677| \\ |1.667| &< 1.960 \implies \text{non rifiuto } H_0 \end{aligned}$$

8.6.4 p -value

È un approccio alternativo per decidere se accettare o rifiutare l'ipotesi nulla.

Teorema : p -value

Il **p -value** è la probabilità che la statistica test ($\bar{x}$ oppure s^2) assuma un valore uguale o più estremo (nella direzione dell'ipotesi alternativa) di quello osservato z_{oss} quando H_0 è vera.

$$\begin{cases} p\text{-value} < \alpha \implies \text{Rifiutare } H_0 \\ p\text{-value} > \alpha \implies \text{Non Rifiutare } H_0 \end{cases}$$

Esempio p -value

Siano:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 8 \\ H_1 : \mu \neq 8 \end{cases}$$

con $\alpha = 0.05$, $\sigma^2 = 4$ e $\bar{x} = 9.5$ e $n = 5$. **Verificare l'ipotesi nulla H_0 .**

Soluzione classica

1. Calcolare il valore critico $|z_{1-\alpha/2}|$

$$z_{1-\alpha/2} = z_{1-0.05/2} = z_{0.975} = 1.960$$

quindi

$$z_{1-\alpha/2} = 1.960 \quad -z_{1-\alpha/2} = -1.960$$

2. Definire zona di rifiuto

$$\mathcal{R}_\alpha = \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_{1-\alpha/2} \right\} \cup \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{1-\alpha/2} \right\}$$

$$\mathcal{R}_\alpha = \left\{ \frac{\bar{x} - 8}{\sqrt{4}/\sqrt{5}} > 1.960 \right\} \cup \left\{ \frac{\bar{x} - 8}{\sqrt{4}/\sqrt{5}} < -1.960 \right\}$$

3. Calcolo z_{oss} attraverso la statistica test (media campionaria)

$$z_{oss} = \frac{\bar{x} - 8}{\sqrt{4}/\sqrt{5}} = \frac{9.5 - 8}{\sqrt{4}/\sqrt{5}} = 1.677$$

4. Analizzo se z_{oss} è cade nella regione di rifiuto o no

1.667 sta tra -1.960 e +1.960 quindi cade nella regione di accettazione
quindi **non rifiuto** l'ipotesi nulla H_0 .

Soluzione con p -value

1. Calcolo p -value:

$$\begin{aligned} P(|\bar{x}| > |z_{oss}|) &= P(|\bar{x}| > |z_{oss}|) \\ &= 2 \cdot [1 - P(Z \leq |z_{oss}|)] \\ &= 2 \cdot [1 - \phi(|z_{oss}|)] \\ &= 2 \cdot [1 - \phi(|1.677|)] \\ &= 2 \cdot [1 - \phi(1.677)] \\ &= 2 \cdot [1 - 0.9535] = 0.093 \end{aligned}$$

quindi la probabilità che la media campionaria (statistica test) sia maggiore del valore osservato (in valore assoluto) è pari a 0.093.

2. Analizzo se p -value è maggiore o minore di α

$$p\text{-value} = 0.093$$

e $0.093 > 0.05 \implies$ **non rifiutare H_0 .**

8.6.5 Test di ipotesi sulla media di una popolazione normale con varianza nota

Test unilaterale destro per μ di una popolazione Normale con σ^2 noto

Il tempo di installazione di un certo hardware ha distribuzione normale di media μ e $\sigma^2 = 25$. Un tecnico installa l'hw in 64 pc impiegandoci 42 minuti e $\alpha = 0.05$. **Valutare l'ipotesi nulla H_0 .**

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 40 \text{ minuti} \\ H_1 : \mu > 40 \text{ minuti} \end{cases}$$

Soluzione

1. Calcolare il valore critico

$$z_{1-\alpha} = z_{1-0.05} = z_{0.95} = 1.645$$

2. Definire la regione di rifiuto

$$\mathcal{R}_\alpha = \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_{1-\alpha} \right\} = \left\{ \frac{\bar{x} - 40}{\sqrt{25/64}} > 1.645 \right\}$$

3. Calcolare il valore osservato

$$z_{oss} = \frac{\bar{x} - 40}{\sqrt{25/64}} = \frac{42 - 40}{\sqrt{25/64}} = 3.2$$

4. Analizzare se il valore osservato cade nella regione di rifiuto o no

$$3.2 > 1.645 \implies \text{cade nella regione di rifiuto, quindi si rifiuta } H_0.$$

Soluzione con p -value

1. Calcolo p -value:

$$\begin{aligned} P(\bar{x} > z_{oss}) &= 1 - P(Z \leq z_{oss}) \\ &= 1 - \phi(z_{oss}) \\ &= 1 - \phi(3.2) \\ &= 1 - 0.9993 = 0.0007 \end{aligned}$$

2. Analizzo se p -value è minore o maggiore di α :

$$\begin{aligned} p\text{-value} &= 0.0007 \\ 0.0007 < 0.05 &\implies \text{rifiutare } H_0 \end{aligned}$$

Test unilaterale sinistro per μ di una popolazione Normale con σ^2 noto

Siano i dati $n = 32$, $\sigma = 0.0076$, $\bar{x} = 1.247$ e $\alpha = 0.05$. **Valutare l'ipotesi nulla H_0 .**

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 1.25 \\ H_1 : \mu < 1.25 \end{cases}$$

Soluzione

1. Calcolare il valore critico

$$-z_{1-\alpha} = -z_{1-0.05} = -z_{0.95} = -1.645$$

2. Definire la regione di rifiuto

$$\mathcal{R}_\alpha = \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{1-\alpha} \right\} = \left\{ \frac{\bar{x} - 1.25}{0.0076/\sqrt{32}} < -1.645 \right\}$$

3. Calcolare il valore osservato

$$z_{oss} = \frac{\bar{x} - 1.25}{0.0076/\sqrt{32}} = \frac{1.247 - 1.25}{0.0076/\sqrt{32}} = -2.233$$

4. Analizzare se il valore osservato cade nella regione di rifiuto o no

$$-2.233 < -1.645 \implies \text{cade nella regione di rifiuto, quindi si rifiuta } H_0.$$

Soluzione con p -value

1. Calcolo p -value:

$$\begin{aligned} P(\bar{x} < z_{oss}) &= \phi(z_{oss}) \\ &= \phi(-2.233) \\ &= 1 - \phi(2.233) \\ &= 1 - 0.9871 = 0.0129 \end{aligned}$$

2. Analizzo se p -value è minore o maggiore di α :

$$\begin{aligned} p\text{-value} &= 0.0129 \\ 0.0129 < 0.05 &\implies \text{rifiutare } H_0 \end{aligned}$$

Test bilaterale per μ di una popolazione Normale con σ^2 noto

Siano i dati $n = 32$, $\sigma = 0.0076$, $\bar{x} = 1.247$ e $\alpha = 0.05$. Valutare l'ipotesi nulla H_0 .

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 1.25 \\ H_1 : \mu \neq 1.25 \end{cases}$$

Soluzione

1. Calcolare il valore critico

$$z_{1-\alpha/2} = z_{1-0.05/2} = z_{0.975} = 1.96$$

quindi:

$$-z_{1-\alpha/2} = -1.96 \quad z_{1-\alpha/2} = 1.96$$

2. Definire la regione di rifiuto

$$\mathcal{R}_\alpha = \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{1-\alpha/2} \right\} \cup \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_{1-\alpha/2} \right\}$$

$$\mathcal{R}_\alpha = \left\{ \frac{\bar{x} - 1.25}{0.0076/\sqrt{32}} < -1.96 \right\} \cup \left\{ \frac{\bar{x} - 1.25}{0.0076/\sqrt{32}} > 1.96 \right\}$$

3. Calcolare il valore osservato

$$z_{oss} = \frac{\bar{x} - 1.25}{0.0076/\sqrt{32}} = \frac{1.247 - 1.25}{0.0076/\sqrt{32}} = -2.233$$

4. Analizzare se il valore osservato cade nella regione di rifiuto o no

$$-2.233 < -1.96 \implies \text{cade nella regione di rifiuto, quindi si rifiuta } H_0.$$

Soluzione con p -value

1. Calcolo p -value:

$$\begin{aligned}P(|\bar{x}| > |z_{oss}|) &= 2 \cdot [1 - P(Z \leq |z_{oss}|)] \\&= 2 \cdot [1 - \phi(|-2.233|)] \\&= 2 \cdot [1 - \phi(2.233)] \\&= 2 \cdot [1 - 0.9871] = 0.0258\end{aligned}$$

2. Analizzo se p -value è minore o maggiore di α :

$$p\text{-value} = 0.0258$$

$$0.0258 < 0.05 \implies \text{rifiutare } H_0$$

8.6.6 Test di ipotesi sulla media di una popolazione normale con varianza non nota

Stessa procedura del capitoletto 8.6.5 ma al posto di σ^2 inserisco s^2 (varianza campionaria) e uso distribuzione T -Student e non la Normale Standard.

Test unilaterale destro per μ di una popolazione Normale con σ^2 ignota

Test unilaterale sinistro per μ di una popolazione Normale con σ^2 ignota

Siano $n = 12$, $\bar{x} = 47.28$, $s = 2.73$ e $\alpha = 0.01$. Verifica l'ipotesi nulla H_0

$$\begin{cases} H_0 : \mu \geq 50 \\ H_1 : \mu < 50 \end{cases}$$

Soluzione

1. Trovo il valore critico

$$-t_{1-\alpha, n-1} = -t_{1-0.01, 11} = -t_{0.99, 11} = -2.718$$

2. Definisco la regione di rifiuto

$$\mathcal{R}_\alpha = \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} < -t_{1-\alpha/2} \right\} = \left\{ \frac{\bar{x} - 50}{2.73/\sqrt{12}} < -2.718 \right\}$$

3. Calcolo il valore osservato

$$t_{oss} = \frac{\bar{x} - 50}{2.73/\sqrt{12}} = \frac{47.28 - 50}{2.73/\sqrt{12}} = -3.451$$

4. Analizzo se il valore osservato cade nella zona di rifiuto oppure no

$$-3.451 < -2.718 \implies \text{cade nella zona di rifiuto, quindi rifiuto } H_0 \quad \checkmark$$

Soluzione con p -value

1. Calcolo il p -value

$$\begin{aligned} P(T < t_{oss}) &= \phi(t_{oss}) \\ &= \phi(-3.451) \\ &= 1 - \phi(3.451) \\ &\text{il valore di } \phi(3.451) \text{ con } n - 1 = 12 - 1 = 11 \text{ gradi di libert\`a} \\ &= 1 - 0.997 = 0.003 \end{aligned}$$

2. Analizzo se p -value \u00e8 maggiore o no di α

$$0.003 < 0.01 \implies \text{rifiuto } H_0 \quad \checkmark$$

Test bilaterale per μ di una popolazione Normale con σ^2 ignota

Il consumo di acqua (litri al giorno) per abitazione ha distribuzione Normale con media μ e varianza σ^2 . In un campione di $n = 16$ abitazioni si osserva $\bar{x} = 353.8$ litri/giorno,

$s = 21.85$ litri/giorno con $\alpha = 0.10$. **Verifica l'ipotesi nulla H_0 .**

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 350 \\ H_1 : \mu \neq 350 \end{cases}$$

Soluzione

1. Trovo il valore critico con $n - 1$ gradi di libertà

$$t_{1-\alpha/2, n-1} = t_{1-0.10/2, 15} = t_{0.95, 15} = 1.753$$

quindi

$$-t_{1-\alpha/2} = -1.753 \quad t_{1-\alpha/2} = 1.753$$

2. Definisco la regione di rifiuto

$$\mathcal{R}_\alpha = \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} < -t_{1-\alpha/2} \right\} \cup \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} > t_{1-\alpha/2} \right\}$$

$$\mathcal{R}_\alpha = \left\{ \frac{\bar{x} - 350}{21.85/\sqrt{16}} < -1.753 \right\} \cup \left\{ \frac{\bar{x} - 350}{21.85/\sqrt{16}} > 1.753 \right\}$$

3. Calcolo il valore osservato

$$t_{oss} = \frac{\bar{x} - 350}{21.85/\sqrt{16}} = \frac{353.8 - 350}{21.85/\sqrt{16}} = 0.696$$

4. Analizzo se il valore osservato cade nella regione di rifiuto o no

$$-1.753 < 0.696 < 1.753 \implies \text{cade nella zona di accettazione}$$

quindi **non rifiuto H_0** ✓

Soluzione con p -value

1. Calcolo il p -value

$$\begin{aligned} P(|T| > |t_{oss}|) &= 2 \cdot [1 - P(T \leq |t_{oss}|)] \\ &= 2 \cdot [1 - \phi(|T_{oss}|)] \\ &= 2 \cdot [1 - \phi(|0.696|)] \\ &= 2 \cdot [1 - \phi(0.696)] \end{aligned}$$

il valore di $\phi(0.696)$ con $n - 1 = 16 - 1 = 15$ gradi di libertà

sta tra $p = 0.70$ e $p = 0.80$ quindi $(0.70 + 0.80)/2 = 0.75$

$$= 2 \cdot [1 - 0.75] = 0.5$$

r	0.60	0.70	3	0.80	0.90
1	0.325	0.727		1.376	3.078
2	0.289	0.617		1.061	1.886
3	0.277	0.584		0.978	1.638
4	0.271	0.569		0.941	1.533
5	0.267	0.559		0.920	1.476
6	0.265	0.553		0.906	1.440
7	0.263	0.549		0.896	1.415
8	0.262	0.546		0.889	1.397
9	0.261	0.543		0.883	1.383
10	0.260	0.542		0.879	1.372
11	0.260	0.540		0.876	1.363
12	0.259	0.539		0.873	1.356
13	0.259	0.538		0.870	1.350
14	0.258	0.537		0.868	1.345
15	1	0.536		0.866	2
16	0.258	0.535		0.865	1.337

2. Analizzo se il p -value è maggiore o minore di α

$$p - \text{value} = 0.5$$

$$0.5 > 0.10 \implies \text{non rifiuto } H_0 \quad \checkmark$$

8.6.7 Test di ipotesi sulla media di una popolazione qualsiasi nel caso di grandi campioni

Quando il campione è sufficientemente grande, possiamo approssimarlo alla Normale.

Test bilaterale per μ di una popolazione qualsiasi con n grande (Normale)

slide 61

Test unilaterale sinistro per μ di una popolazione qualsiasi con n grande (Normale)

Siano $n = 60$, $\bar{x} = 9.1$, $s = 4.2$ e $\alpha = 0.01$. **Verificare l'ipotesi nulla H_0 .**

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 10 \\ H_1 : \mu < 10 \end{cases}$$

Soluzione

1. Trovo il valore critico

$$-z_{1-\alpha} = -z_{1-0.01} = -z_{0.99} = -2.326$$

2. Definisco la regione di rifiuto

$$\mathcal{R}_\alpha = \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} < -z_{1-\alpha} \right\} = \left\{ \frac{\bar{x} - 10}{4.2/\sqrt{60}} < -2.326 \right\}$$

3. Calcolo il valore osservato

$$z_{oss} = \frac{\bar{x} - 10}{4.2/\sqrt{60}} = \frac{9.1 - 10}{4.2/\sqrt{60}} = -1.660$$

4. Analizzo se il valore osservato cade nella zona di rifiuto o no

$$-1.660 > -2.326 \implies \text{cade nella regione di accettazione} \\ \text{quindi } \mathbf{\text{non rifiuto } H_0} \quad \checkmark$$

Soluzione con p -value

1. Calcolo p -value

$$\begin{aligned} P(\bar{x} < z_{oss}) &= P(Z < z_{oss}) \\ &= \phi(z_{oss}) \\ &= \phi(-1.66) \\ &= 1 - \phi(1.66) \\ &= 1 - 0.9515 = 0.0485 \end{aligned}$$

2. Analizzo se p -value è maggiore o no di α

$$p\text{-value} = 0.0485 \\ 0.0485 > 0.01 \implies \mathbf{\text{non rifiutare } H_0} \quad \checkmark$$

Varianza campionaria - Bernoulli

Nel caso di Bernoulli

$$s^2 = \theta(1 - \theta)$$

Test unilaterale destro per μ di una popolazione qualsiasi con n grande (Bernoulli)

Siano $n = 300$ pc comprati di cui 9 difettosi e $\alpha = 0.05$. **Verifica l'ipotesi nulla H_0 .**

$$\begin{cases} H_0 : \mu \leq 0.02 \\ H_1 : \mu > 0.02 \end{cases}$$

Soluzione

1. Trovo il valore critico

$$z_{1-\alpha} = z_{1-0.05} = z_{0.95} = 1.645$$

2. Definisco la regione di rifiuto

$$\mathcal{R}_\alpha = \left\{ \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} > z_{1-\alpha} \right\}$$

ma la popolazione è Bernoulliana, quindi:

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_\alpha &= \left\{ \frac{\bar{x} - \theta_0}{\frac{\sqrt{\theta_0(1-\theta_0)}}{\sqrt{n}}} > z_{1-\alpha} \right\} \\ &= \left\{ \frac{\bar{x} - \theta_0}{\sqrt{\theta_0(1-\theta_0)/n}} > z_{1-\alpha} \right\} \\ &= \left\{ \frac{\bar{x} - 0.02}{\sqrt{0.02(1-0.02)/300}} > 1.645 \right\} \end{aligned}$$

3. Calcolo il valore osservato

$$\text{prima devo calcolare } \bar{x} = \frac{\text{successi}}{n} = \frac{k}{n} = \frac{9}{300} = 0.03$$

$$z_{oss} = \frac{\bar{x} - 0.02}{\sqrt{0.02(1-0.02)/300}} = \frac{0.03 - 0.02}{\sqrt{0.02(1-0.02)/300}} = 1.237$$

4. Analizzo se il valore osservato cade nella regione di rifiuto o no

$$1.237 < 1.645 \implies \text{cade nella regione di accettazione}$$

quindi **non rifiuto H_0** ✓

Soluzione con p -value

1. Calcolo p -value

$$\begin{aligned} P(\bar{x} > z_{oss}) &= P(Z > z_{oss}) \\ &= 1 - P(Z \leq z_{oss}) \\ &= 1 - \phi(z_{oss}) \\ &= 1 - \phi(1.237) \\ &= 1 - 0.8907 = 0.11 \end{aligned}$$

2. Analizzo se p -value è maggiore o no di α

$$p\text{-value} = 0.11$$

$$0.11 > 0.05 \implies \text{non rifiutare } H_0 \text{ ✓}$$

8.6.8 Test di ipotesi sulla varianza di una popolazione normale