

# Problem Set 9

## Problem 1

$$(1) |A| = 3$$

$$(2) |B| = \aleph_0$$

$$(3) |C| = \aleph_0$$

$$(4) |B \cap C| = \aleph_0$$

$$(5) |B \cap C| = \aleph_0$$

$$(6) |D| = \aleph_1$$

## Problem 2

### (1)

令  $C = B - A$ , 易知  $C$  也是可数集

$$\therefore A \cup B = A \cup (B - A) = A \cup C, A \cap C = \emptyset$$

不妨假设  $|A| \leq |C|$ , 否则将  $A$  与  $C$  对调

由  $A, C$  均为可数集可定义  $f_A : |A| \xrightarrow[\text{onto}]{1-1} A, f_C : |C| \xrightarrow[\text{onto}]{1-1} C$

定义函数  $f : |A \cup B| \rightarrow A \cup B$

当  $x < 2|A|$  时,

$$f(x) = \begin{cases} f_A(\frac{x}{2}), & x = 2k, k \in \mathbb{N} \\ f_C(\frac{x-1}{2}), & x = 2k+1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

当  $x \geq 2|A|$  时,

$$f(x) = f_C(x - |A|)$$

$\therefore$  易知 $f$ 为双射函数,  $|A \cup B| \in \mathbb{N}$ 或 $|A \cup B| = \aleph_0$

$\therefore A \cup B$ 是可数集

## (2)

不妨定义 $f_A : \mathbb{N} \xrightarrow{1-1, onto} A, f_B : \mathbb{N} \xrightarrow{1-1, onto} B$

$$\text{令 } f : A \times B \rightarrow \mathbb{N}, f((f_A(m), f_B(n))) = \sum_{i=1}^{m+n} i + m = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m$$

$\therefore$  易知 $f$ 是双射函数

$\therefore A \times B$ 是可列集

## Problem 3

a) 可数无限的, 取 $f(x) = x + 11$

b) 可数无限的, 取 $f(x) = -2x - 1$

c) 有限的

d) 不可数的

$$\text{e) 可数无限的, 取 } f(x) = \begin{cases} (2, \frac{x}{2} + 1), & x = 2k, k \in \mathbb{N} \\ (3, \frac{x+1}{2}), & x = 2k+1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$\text{f) 可数无限的, 取 } f(x) = \begin{cases} 5x, & x = 2k, k \in \mathbb{N} \\ -5x - 5, & x = 2k+1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

## Problem 4

假设 $A - B$ 是可数的

$\therefore B$ 是可数集合

$\therefore A \cap B$ 是可数集合

$\therefore A - (A \cap B) = A - B$ 也为可数集合

$$\therefore A = A - (A \cap B) + (A \cap B)$$

由Problem 2.(1)可知两个可数集合的并集也是可数集合

$\therefore A$ 是可数集合

$\therefore A$ 是不可数集合, 产生矛盾, 假设不成立

$\therefore A - B$ 是不可数的

## Problem 5

$\therefore A$ 是可数集合

当 $A$ 是有穷集时, 不妨记 $A \approx n$ , 则有 $g : n \xrightarrow[\text{onto}]{1-1} A$

$\therefore$  存在 $f : A \xrightarrow[\text{onto}]{1-1} B$

$\therefore f \circ g : n \xrightarrow[\text{onto}]{1-1} B$

$\therefore B \approx n$

$\therefore B$ 是有穷集

$\therefore B$ 是可数的

当 $A$ 是无穷可列集时,  $A \approx \mathbb{N}$

$\therefore$  同理可知 $B \approx \mathbb{N}$

$\therefore B$ 是可数的

## Problem 6

取 $f_A : |A| \xrightarrow[\text{onto}]{1-1} A$ ,  $f_B : |B| \xrightarrow[\text{onto}]{1-1} B$

$\therefore A \subset B$

$\therefore |A| < |B|$

$\therefore$  令 $f : A \rightarrow B$ ,  $f(f_A(n)) = f_B(n)$

易知 $f$ 是单射函数

$$\therefore A \preceq B$$

## Problem 7

$$\therefore A = \{a, b, c\}$$

$$\therefore \mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

$$\begin{aligned} \therefore B = \{ & \\ & \{(a, 0), (b, 0), (c, 0)\}, \\ & \{(a, 0), (b, 0), (c, 1)\}, \\ & \{(a, 0), (b, 1), (c, 0)\}, \\ & \{(a, 0), (b, 1), (c, 1)\}, \\ & \{(a, 1), (b, 0), (c, 0)\}, \\ & \{(a, 1), (b, 0), (c, 1)\}, \\ & \{(a, 1), (b, 1), (c, 0)\}, \\ & \{(a, 1), (b, 1), (c, 1)\} \\ & \} \end{aligned}$$

$$\therefore |\mathcal{P}(A)| = |B| = 8$$

$$\therefore \mathcal{P}(A) \approx B$$

## Problem 8

$$(1) \text{ 是, 取 } f(x) = \begin{cases} x, & x = 2k, k \in \mathbb{N} \\ -x - 1, & x = 2k + 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$(2) \text{ 不是, } (0, 0.5) \approx \mathbb{R} \not\approx \mathbb{N}$$

$$(3) \text{ 是, 取 } f(x) = \begin{cases} \frac{7x}{2}, & x = 2k, k \in \mathbb{N} \\ \frac{-7x - 7}{2}, & x = 2k + 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$(4) \text{ 是, 取 } f(x) = \begin{cases} \frac{3x}{2} + 1, & x = 2k, k \in \mathbb{N} \\ \frac{x-1}{2} + 2, & x = 2k + 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

## Problem 9

a)  $A = \mathbb{R}, B = \mathbb{R}$

b)  $A = \mathbb{R}, B = \mathbb{R} - \mathbb{N}$

c)  $A = P(\mathbb{R}), B = \mathbb{R}$

## Problem 10

设这些可数集合为 $C_i$ ,  $(i = 1, 2, \dots, m)$

令 $S_1 = C_1, S_i = C_j - (C_1 \cup \dots \cup C_{j-1}), (j = 2, 3, \dots, m)$

易知 $S_i$ 也是可数集, 且互不相同的两个 $S_i$ 的交集为空

不妨假定 $|S_1| < |S_2| < \dots < |S_m|$ , 否则交换它们的位置

$$\therefore C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_i = S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_i, \quad (i = 1, 2, \dots, m)$$

由 $S_i$ 均为可数集可定义 $f_{S_i} : |S_i| \xrightarrow[onto]{1-1} A$

定义函数 $f : |C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_i| \rightarrow C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_i$

当 $0 \leq x < m|S_1|$ 时,

$$f(x) = \begin{cases} f_{S_1}(\frac{x}{m}), & x = mk, k \in \mathbb{N} \\ f_{S_2}(\frac{x-1}{m}), & x = mk + 1, k \in \mathbb{N} \\ \dots \\ f_{S_m}(\frac{x-m+1}{m}), & x = mk + m - 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

当 $\sum_{i=1}^n (m-i+1)|S_i| \leq x < \sum_{i=1}^{n+1} (m-i+1)|S_i|$ 时,

$$f(x) = \begin{cases} f_{S_n}(\frac{x}{m-n}), & x = (m-n)(\sum_{i=1}^n (m-i+1)|S_i| + k), k \in \mathbb{N} \\ f_{S_{n+1}}(\frac{x-1}{m-n}), & x = (m-n)(\sum_{i=1}^n (m-i+1)|S_i| + k) + 1, k \in \mathbb{N} \\ \dots \\ f_{S_m}(\frac{x-m+n+1}{m-n}), & x = (m-n)(\sum_{i=1}^n (m-i+1)|S_i| + k) + m - n - 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

其中 $n = 1, 2, \dots, m-1$

$\therefore$  易知 $f$ 为双射函数, $|C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_i| \in \mathbb{N}$ 或 $|C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_i| = \aleph_0$

$\therefore C_1 \cup C_2 \cup \cdots \cup C_i$ 是可数集