

Ch 1-3 古典概型与几何概型



回顾前一次课

- 频率、频率的稳定性、频率与概率的关系
- 概率的公理化
- $P(\emptyset) = 0$
- $P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots P(A_n)$
- $P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A \cup B) - P(B)$
- 容斥原理 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
- Union bound

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) \leq P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_n)$$

古典概型

概率论最早的研究对象，相对简单、在概率论中具有重要意义

如果试验 E 满足：

- 试验结果只有有限种可能，即 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$
- 每种结果发生的可能性相同，即 $P(\{\omega_i\}) = P(\{\omega_j\})$ ($i \neq j$)

则称这样的试验为**古典概型**，又称**等可能概型**

根据上述定义可知：

$$P(\{\omega_i\}) = 1/n$$

若事件 A 包含 k 个基本事件，则事件 A 发生的概率为：

$$P(A) = k/n = |A|/|\Omega|$$

基本计数原理

计数的两条基本原理

- **加法原理**: 若一项工作可以用两种不同的过程 \mathcal{A}_1 和 \mathcal{A}_2 完成, 且过程 \mathcal{A}_1 和 \mathcal{A}_2 分别有 n_1 和 n_2 种方法, 则完成该工作有 $n_1 + n_2$ 种方法
- **乘法原理**: 若一项工作需要依次通过 \mathcal{A}_1 和 \mathcal{A}_2 两过程, 且过程 \mathcal{A}_1 和 \mathcal{A}_2 分别有 n_1 和 n_2 种方法, 则完成该工作有 $n_1 \times n_2$ 种方法

上述两条原理可进一步推广到多个过程的情况

排列与组合

排列: 从 n 个不同的元素中无放回地取出 r 个元素进行排列, 既要考虑取出的元素, 也要顾及其排列顺序, 有

$$(n)_r = n(n-1)\cdots(n-r+1)$$

种不同的排列。若 $r = n$ 时称全排列, 有 $n!$ 种

组合: 从 n 个不同的元素中无放回地取出 r 个元素, 取出的元素之间无顺序关系, 共有 $\binom{n}{r}$ 种不同的取法, 其中

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

称为**组合数**或**二项系数**

例题

将 n 个不同的球随机放入 N ($N \geq n$)个不同的盒子中:

- 事件 A 表示恰有 n 个盒子且每盒一球
- 事件 B 表示指定的 n 个盒子中各有一球
- 事件 C 表示指定一盒子恰有 m 个球

求事件 A, B, C 发生的概率 (盒子容量不限, 放入同一盒子内的球无顺序区别)

生日问题

有 k 个人 ($k < 365$), 每个人的生日等可能地出现于365天中的任意一天, 求至少两人生日相同的概率

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{(365)_k}{365^k}$$

人数	概率
20	0.411
23	0.507
30	0.706
40	0.891
50	0.970
60	0.994
100	0.999999

超几何分布

设一批 N 件产品中有 M 件次品, 现从 N 件产品中不放回地任选 n 件, 求其中恰有 k 件次品的事件 A 的概率 $P(A)$

超几何概率:

$$P(A) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

将上例中“无放回”修改为“有放回”，该问题如何求解？

抽签问题

袋中有 a 个不同的白球, b 个不同的红球, 假设有 k 个人依次随机无放回地从袋中取一个球, 问第 i 个人 ($i \leq k$) 取出红球的概率?

Matching问题

有 n 对夫妻参加一次聚会，现将所有参会人员任意分成 n 组，每组一男一女，问至少有一对夫妻被分到同一组的概率是多少？

几何概型

古典概型考虑有限的样本空间,即有限个等可能的基本事件,在很多实际应用中受到限制. 另一种特殊的随机现象,具有如下特征:

- ◆ **样本空间无限可测** 样本空间包含无限不可列个样本点,可以用几何图形(如一维线段、二位平面区域、或三维空间区域等)来表示,其相应的几何测度(如长度、面积、体积等)是一个非零有限的实数
- ◆ **基本事件等可能性** 每个基本事件发生的可能性大小相等,从而使得每个事件发生的概率与该事件的几何测度相关,与具体位置无关

称为 **几何概型**

几何概型(续)

在一个测度有限的区域 Ω 内等可能性投点, 落入 Ω 内的任意子区域 A 的可能性与 A 的测度成正比, 与 A 的位置与形状无关, 这样的概率模型称之为**几何概型**. 事件 A 发生的概率为

$$P(A) = \frac{A\text{的测度}}{\Omega\text{的测度}} = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$


这里 $\mu(\cdot)$ 表示区域的测度

例：公交车发车班次

假设一乘客到达汽车站的时间是任意的, 客车间隔一段时间发班, 请规划最长的间隔发车时间, 才能确保乘客候车等待时间不超过20分钟的概率大于80%.


例：平面三角形

将一根长度为 l 的木棍随意折成三段, 这三段能构成平面三角形的概率是多少?



例：会面问题

两银行经理约定中午12:00 - 13:00到某地会面, 两人到达时间随机, 先到者等另一人15分钟后离开, 求两人见面的概率.



统计模拟法或蒙特卡洛法

统计模拟法：通过计算机模拟近似计算几何概型的概率

先构造概率模型, 再进行计算机模拟试验, 用统计的方法计算其估计值近似概率. 如可利用蒙特卡洛法来近似计算会面问题的概率

```
 $n_A \leftarrow 0$ 
For  $i = 1 : N$ 
     $x \leftarrow \text{Random}(0, 60)$ 
     $y \leftarrow \text{Random}(0, 60)$ 
    If  $|x - y| \leq 15$  then
         $n_A \leftarrow n_A + 1$ 
    Endif
Endfor
Return  $n_A/N$ 
```
