الدليل الطبي الشامل: أنواع الحساسية

دليلك للتعرف على مسببات الحساسية، الأعراض، وطرق التعامل السليم

مقدمة: تحدث الحساسية (Allergy) عندما يُصدر جهاز المناعة في الجسم رد فعل مبالغ فيه تجاه مواد طبيعية أو غريبة (تُعرف بمولدات الحساسية) تُعتبر غير ضارة لمعظم الناس. تتراوح شدة هذه التفاعلات من الانزعاج البسيط إلى الحالات المهددة للحياة.

نظرة عامة على أشهر أنواع الحساسية

نوع الحساسية	المسببات الشائعة	أبرز الأعراض
حساسية الجهاز التنفسي	حبوب اللقاح، الغبار، العفن، وبر الحيوانات الأليفة	عطاس، سيلان الأنف، حكة بالعين، ضيق تنفس، سعال
حساسية الطعام	الفول السوداني، الحليب، البيض، الأسماك، المكسرات، القمح	تورم الشفاه واللسان، قيء ومغص، طفح جلدي، صدمة حساسية
حساسية الجلد	ملامسة المعادن (كالنيكل)، بعض النباتات، مستحضرات التجميل	احمرار، حكة شديدة، جفاف وتقشر الجلد، بثور
حساسية الأدوية	البنسلين، مسكنات الألم (NSAIDs)، بعض المضادات الحيوية	طفح جلدي، تورم الوجه، صعوبة في التنفس، حكة عامة
حساسية الحشرات	سم النحل، الدبابير، النمل الناري	تورم كبير ومؤلم مكان اللدغة، ضيق تنفس، دوار، غثيان

تفاصيل الأنواع الشائعة وكيفية تمييزها

1. حساسية الجهاز التنفسي (Respiratory Allergies)

تعتبر من أكثر الأنواع شيوعاً وتؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة. تنقسم بشكل رئيسي إلى:

- **التهاب الأنف التحسسي (حمى القش):** يصيب الأغشية المخاطية للأنف والعينين، ويزداد في مواسم تفتح الأزهار (حساسية موسمية) أو عند التعرض المستمر للغبار المنزلي (حساسية مزمنة).
- **الربو التحسسي (Allergic Asthma):** يؤدي التعرض للمهيجات إلى تشنج في الشعب الهوائية، مما يسبب أزيزاً في الصدر، وسعالاً مستمراً يزداد ليلاً، وصعوبة ملحوظة في التنفس.

2. حساسية الطعام (Food Allergies)

تظهر الأعراض عادة في غضون دقائق إلى ساعتين من تناول الطعام المسبب للحساسية. قد تقتصر على أعراض هضمية وجلدية بسيطة، أو تتطور لتشمل أجهزة الجسم المختلفة.

- **أبرز المسببات:** الحليب البقري، البيض، الصويا، القمح (في الأطفال)، والمأكولات البحرية والمكسرات (في البالغين).
- **ملاحظة هامة:** تختلف حساسية الطعام الحقيقية عن "عدم تحمل الطعام" (مثل عدم تحمل اللاكتوز)؛ فالأخيرة لا يتدخل فيها جهاز المناعة وتقتصر أعراضها على اضطرابات الجهاز الهضمي فقط.

3. حساسية الجلد (Skin Allergies)

تشمل تفاعلات الجلد مع المؤثرات الداخلية أو الخارجية، وأشهرها:

- **الإكزيما (التهاب الجلد التأتبي):** تسبب بقعاً حمراء وجافة ومثيرة للحكة، وتنتشر غالباً عند الأطفال وتتأثر بالعوامل الوراثية والبيئية.
- **الشرى (Urticaria/Hives):** طفح جلدي أحمر بارز ومسطح يظهر فجأة ويسبب حكة شديدة، وقد يختفي ويظهر في أماكن مختلفة من الجسم خلال ساعات.
- **التهاب الجلد التماسي:** يحدث عند التلامس المباشر مع المادة المسببة، مثل العطور أو المعادن الرخيصة في الإكسسوارات.

تحذير طبي: الحساسية المفرطة (Anaphylaxis)

هي رد فعل تحسسي شامل وسريع **يهدد الحياة**. يمكن أن تحدث خلال ثوانٍ أو دقائق من التعرض للمسبب (مثل لدغة نحلة أو تناول الفول السوداني). تتطلب هذه الحالة استخدام حاقن الإبينفرين فوراً والتوجه لأقرب طوارئ.

- **أعراضها الطارئة:** هبوط حاد في ضغط الدم، فقدان الوعي، ضيق شديد في التنفس بسبب تورم الحلق أو اللسان، ونبض سريع وضعيف.

طرق التشخيص السريري

يعتمد الأطباء على التاريخ الطبي للمريض بالإضافة إلى عدة طرق لتحديد المسبب الدقيق للحساسية:

- **اختبارات الجلد (Skin Prick Test):** تعريض منطقة صغيرة من الجلد (غالباً في الذراع) لقطرات من مستخلصات مسببات الحساسية ثم وخزها بخفة، ومراقبة التفاعل (ظهور تورم أحمر).
- **تحاليل الدم (IgE Blood Test):** قياس مستوى الأجسام المضادة (الجلوبولين المناعي E) الخاصة بالحساسية في مجرى الدم، وهو مفيد لمن لا يستطيعون إجراء فحص الجلد.
- **النظام الغذائي الاستبعادي:** استبعاد أطعمة معينة يشتبه بها من النظام الغذائي لعدة أسابيع، ثم إعادتها تدريجياً تحت إشراف طبي لمعرفة المسبب.

سبل الوقاية وبروتوكولات العلاج

- **تجنب المسببات:** الخطوة الأولى والأهم. يجب قراءة ملصقات الأطعمة بدقة، واستخدام أغطية فراش مضادة لعث الغبار، وتجنب الخروج في أوقات ذروة حبوب اللقاح.
- **مضادات الهيستامين (Antihistamines):** أدوية أساسية تساعد في تخفيف الأعراض الخفيفة والمتوسطة مثل الحكة، العطاس، وسيلان الأنف.
- **الكورتيكوستيرويدات:** تُستخدم لتقليل الالتهاب الشديد؛ وتتوفر على شكل بخاخات للأنف، كريمات موضعية للجلد، أو أقراص فموية.
- **العلاج المناعي (Immunotherapy):** خيار طويل الأمد يتضمن تعريض المريض لجرعات متزايدة ومدروسة من المسبب لتدريب جهاز المناعة على تقبله (يتوفر كحُقن أو أقراص تحت اللسان).
- **حاقن الإبينفرين التلقائي (EpiPen):** يجب أن يُحمل دائماً وفي كل مكان مع الأشخاص المعرضين لخطر الحساسية المفرطة.