Erfolgskontrolle:
**HLW und DEFI Erwachsener**

Rettungssanitäterausbildung

Aus Liebe zum Menschen. ÖSTERREICHISCHES ROTES KREUZ OBERÖSTERREICH

| Punkte erreicht | Punkte möglich | Maßnahmen patientenorientiert | Maßnahmen geräteorientiert | Punkte möglich | Punkte erreicht |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dieses Szenario wird **zweimal** mit vertauschten Rollen durchgespielt. Anschließend werden die Punkte der linken und rechten Spalte zusammengezählt. | | | |
| | 0-5 | **Szene**, ist Notarzt mitalarmiert? / Kommunikation im Team | | 0-5 | |
| | 0-5 | **Sicherheit**: PSA, Umgebung | | 0-5 | |
| | 0-5 | **Situation** / 1.Eindruck / AVP**U** / **Notarzt nachfordern** , wenn nicht schon unterwegs | | 0-5 | |
| | 0-10 | lautes Ansprechen, sanftes Schütteln an den Schultern | | | |
| | 0-10 | A - Atemwege freimachen: eine Hand an der Stirn, andere Hand (mit Fingerspitzen) hebt Unterkiefer an | | | |
| | 0-10 | B - Beurteilung der Atmung (max. 10 sek.): Sehen, Hören, Fühlen, auf weitere Lebenszeichen achten | Gerätemanagement: Position von DEFI, Absaugeinheit und Rucksack | 0-5 | |
| | | 10 for 10 - Teamkommunikation | | | |
| | 0-10 | Notfalldiagnose: Atem- Kreislaufstillstand | Lagemeldung mit Notfalldiagnose | 0-5 | |
| | 0/5 | zeitgerecht DEFI einschalten | | 0/5 | |
| | 0-20 | korrekte Herzdruckmassage: Druckpunkt / Hands off Zeiten minimieren | Defipads korrekt und ohne Lufteinschlüsse **fest aufkleben** | 0-5 | |
| | 0-30 | Herzdruckmassage mit korrekter Frequenz, Drucktiefe und Entlastung *1) | Analyse drücken | 0-5 | |
| | | | Beatmungsbeutel, Filter u. $O_2$ vorbereiten | 0-5 | |
| | 0/10 | QCPR: Entlastung >90% *2) | LTS-D Größe wählen und Cuff prüfen | 0-5 | |
| | 0/10 | QCPR: Drucktiefe >90% *2) | LTS-D anfeuchten und Fixierung vorbereiten | 0-5 | |
| | 0/10 | QCPR: korrekte Frequenz >90% *2) | Larynxtubus setzen und blocken | 0-5 | |
| | | | Kontrollbeatmung ggf. zurückziehen | 0-5 | |
| | | nach positiver Kontrollbeatmung auf Rhythmus 30:2 umstellen | | | |
| | 0-5 | Reanimationszyklus 30:2 einhalten | | 0-5 | |
| | | | Larynxtubus fixieren (LT 1x umwickeln) | 0/5 | |
| | | | Absaugkath. Zur Lagekontrolle eingeführt | 0/5 | |
| | | | 2 Beatmungen (erste bereits in der Entlastungsphase der letzten HDM) | 0-10 | |
| | 0/5 | Beachtet Anweisung des DEFIs | Qualität der Beatmung (ca. 1 sek lang, Brustkorb hebt sich normal) | 0-10 | |
| | 0-5 | Wechsel in der Analysephase | | 0-5 | |
| | 0-5 | in der **Präschockphase** nur **Herzdruckmassage** | | 0-5 | |
| | 0-10 | 2 Beatmungen (erste bereits in der Entlastungsphase der letzten HDM) | Sicherheitscheck und Schockabgabe max. 5 Sekunden die HDM unterbrechen | 0-5 | |
| | 0-10 | Qualität der Beatmung (ca. 1 sek lang, Brustkorb hebt sich normal) | korrekte Herzdruckmassage: Druckpunkt / Hands off Zeiten minimieren | 0-20 | |
| | 0/5 | LT und Beatmungsbeutel diskonnektieren | Herzdruckmassage mit korrekter Frequenz, Drucktiefe und Entlastung *1) | 0-30 | |
| | 0/5 | Abstand DEFI-Pads - AMBU 1m | | | |
| | | | QCPR: Entlastung >90% *2) | 0/10 | |
| | 0-5 | Sicherheitscheck und Schockabgabe max. 5 Sekunden die HDM unterbrechen | QCPR: Drucktiefe >90% *2) | 0/10 | |
| | | | QCPR: korrekte Frequenz >90% *2) | 0/10 | |
| | 0/5 | Absaugbereitschaft hergestellt, **max. Sog** eingestellt | | 0/5 | |
| | 0-10 | Zeige: 5 Maskenbeatmungen m. Guedelt. | Zeige: alle Lagekorrekturen des LTS-D | 0-10 | |
| | | Fragen zur Ergänzung oder Erläuterung: | | | |
| | 0-20 | | | 0-20 | |
| | **200** | < erreichte Punkte oder "**N**" für negativ | erreichte Punkte oder "**N**" für negativ > | **200** | |
| | | ***1) ohne Feedbacksystem eintragen - *2) mit Feedbacksystem** | | | |

Bewertungsschema:
sehr gut (1): 200 - 189 / gut (2): 188 - 177 / befriedigend (3): 176 - 165 / genügend (4): 164 - 151 / nicht genügend (5): 150 - 0
oder grobes Patienten schädigendes Verhalten => Bei nicht genügend gut dokumentieren auf der Rückseite oder am Formblatt!

| Persis | Name | Lehrsanitäter_in | Name | Persis |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |