Szenario: **CPR Kind**

**Maßnahmen**

| | patientenorientiert | | geräteorientiert | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dieses Szenario wird **nur einmal** durchgespielt. Beurteilt wird primär die zugeteilte Spalte (patienten- oder geräteorientiert). Bei Abweichungen von der Rollenzuteilung entscheidet der Prüfer über die individuelle Punktevergabe. | | | | |
| | | **Szene**, ist Notarzt mitalarmiert? / Kommunikation im Team | | | |
| | | **Sicherheit**: PSA, Umgebung | | | |
| | | **Situation** / 1.Eindruck / AVP**U** / **Notarzt nachfordern** , wenn nicht schon unterwegs | | | |
| | | lautes Ansprechen,<br>sanftes Schütteln an den Schultern | Zusammenstellung des Beatmungsbeutels (Filter aufsetzen, Maske wählen) | | |
| | | A - Atemwege freimachen (Kopf geringf. überstr.): eine Hand an der Stirn, andere Hand (mit Fingersp.) hebt Unterkiefer an | Wenn keine Atmung vorhanden folgen:<br>5 initiale Beatmungen je ca. 1 Sek. lang<br>(auch ohne Sauerstoff möglich) | | |
| | | B - Beurteilung der Atmung<br>(max. 10 sek.): Sehen, Hören, Fühlen | $O_2$-Reservoir anschließen / O2-Flow (10-15l/min bei Erw.AMBU, 6-8l/min bei Baby AMBU). Bis spätestens nach dem ersten 15:2 Zyklus. | | |
| | | solange keine Lebenszeichen (Atmung, Husten, Bewegung) weiter mit HLW | | | |
| | 10 for 10 - Teamkommunikation | | | | |
| | | Notfalldiagnose: Atem-Kreislaufstillstand | Lagemeldung inkl. geschätztem Alter | | |
| | | zeitgerecht DEFI einschalten | | | |
| | | korrekte Herzdruckmassage:<br>Druckpunkt / Hands off Zeiten minimieren | 2 Beatmungen (erste bereits in der Entlastungsphase der letzten HDM) | | |
| | 0-30 | Herzdruckmassage mit korrekter Frequenz, Drucktiefe und Entlastung *1) | Qualität der Beatmung (ca. 1 Sek. lang, Brustkorb hebt sich normal) | | |
| | 0/10 | QCPR: Entlastung >90% *2) | Defipads korrekt aufkleben (mit minimaler oder) ohne Unterbrechung der CPR (Pads-Abstand < 2,5cm => anterior posterior) | | |
| | 0/10 | QCPR: Drucktiefe >90% *2) | | | |
| | 0/10 | QCPR: korrekte Frequenz >90% *2) | | | |
| | | zeitgerecht ANALYSE drücken | | | |
| | | Zyklus 15 : 2 und Wechsel spätestens alle 2 Minuten | | | |
| | | in der **Präschockphase** weiter im **Zyklus 15** Herzdruckmassagen **: 2** Beatmung | | | |
| | | Sicherheitsabstand<br>DEFI-Pads - AMBU (mind. 1m) | Sicherheitscheck und Schockabgabe<br>max. 5 Sekunden die HDM unterbrechen | | |
| | | 2 Beatmungen (erste bereits in der Entlastungsphase der letzten HDM) | korrekte Herzdruckmassage:<br>Druckpunkt / Hands off Zeiten minimieren | | |
| | | Qualität der Beatmung (ca. 1 Sek. lang, Brustkorb hebt sich normal) | Herzdruckmassage mit korrekter Frequenz, Drucktiefe und Entlastung *1) | 0-30 | |
| | | | QCPR: Entlastung >90% *2) | 0/10 | |
| | | Sicherheitscheck und Schockabgabe<br>max. 5 Sekunden die HDM unterbrechen | QCPR: Drucktiefe >90% *2) | 0/10 | |
| | | | QCPR: korrekte Frequenz >90% *2) | 0/10 | |
| | | Absaugbereitschaft hergestellt, **max. Sog** eingestellt | | | |
| | Fragen zur Ergänzung oder Erläuterung: | | | | |
| | | | | | |
| | < erreichte Punkte oder "**N**" für negativ | | erreichte Punkte oder "**N**" für negativ > | | |
| | ***1) ohne Feedbacksystem eintragen - *2) mit Feedbacksystem** | | | | |

| Persis | Name | Name | Persis |
|---|---|---|---|