

tarea-002.R

Usuario

2020-02-20

```
# Camila Elisa Medrano Vigil  
#1860924  
#20.02.20
```

```
# Ejercicio 1 -----
```

```
library(plyr)  
accidentes <- c(0,1,0,2,2,1,4,3,0,1,5,1,2,3,4,0,1,1,3,4)  
acc <- count(accidentes)  
acc
```


```
##   x freq  
## 1 0    4  
## 2 1    6  
## 3 2    3  
## 4 3    3  
## 5 4    3  
## 6 5    1
```

```
(acc$freq/sum(acc$freq)*100)
```

```
## [1] 20 30 15 15 15 5
```

```
acc$rf <- acc$freq/sum(acc$freq)*100  
barplot(acc$freq, names.arg = acc$x, main = " Accidentes en el aserradero", col= "green")
```

Accidentes en el aserradero




```
mean(accidentes)
```

```
## [1] 1.9
```

```
sum(accidentes)
```

```
## [1] 38
```

```
boxplot(accidentes)
```



```
#¿ Cual es el numero de accidentes al mes?
mean(accidentes)
```

```
## [1] 1.9
```

```
#¿ Que numero de accidentes reporta la mayor proporcion?
# El 1 con el 30%
```

```
# Ejercicio 2
```

```
especies <- c("F", "H", "F", "C", "F", "A", "H", "F",
              "H", "C", "A", "C", "F", "H", "H", "H",
              "F", "H", "A", "C", "F", "H", "H", "F")
```

```
esp <- count(especies)
```

```
esp
```


```
##  x freq
## 1 A    3
## 2 C    4
## 3 F    8
## 4 H    9
```

```
esp$rf <- esp$freq/sum(esp$freq)*100
esp
```

```
##  x freq    rf
## 1 A    3 12.50000
```

```
## 2 C    4 16.66667
## 3 F    8 33.33333
## 4 H    9 37.50000
```

```
barplot(esp$freq, names.arg = esp$x, main = "Cantidad de especies", col = "red")
```



#¿Que especie tienen mas proporcion? la H

#Ejercicio 3

```
library(repmis)
conjunto <- source_data("https://www.dropbox.com/s/hmsf07bbayxv6m3/cuadro1.csv?dl=1")
```

```
## Downloading data from: https://www.dropbox.com/s/hmsf07bbayxv6m3/cuadro1.csv?dl=1
```

```
## SHA-1 hash of the downloaded data file is:
```

```
## 2bdde4663f51aa4198b04a248715d0d93498e7ba
```


#Encontrar la frecuencia de las variables vecinos y especies

```
.vc <- table(conjunto$Vecinos, conjunto$Especie)
addmargins(as.table(.vc))
```

```
##
##      C  F  H Sum
## 0    1  0  2   3
## 1    1  2  1   4
## 2    3  2  1   6
## 3    5  3  5  13
```

```
## 4 5 5 3 13
## 5 5 1 0 6
## 6 2 1 2 5
## Sum 22 14 14 50
```

```
barplot(table(conjunto$Vecinos, conjunto$Especie), main = " Cantidad de vecinos y especies", col = "pink")
```



#Ejercicio 4

```
h <- conjunto$Altura
range(h)
```

```
## [1] 8.47 21.46
```

```
intervalo <- seq(7.5, 22.5, by= 5)
intervalo
```


```
## [1] 7.5 12.5 17.5 22.5
```

```
h.table <- cut(h, intervalo)
table(h.table)
```


```
## h.table
## (7.5,12.5] (12.5,17.5] (17.5,22.5]
##          15          31           4
```

```
par(mfrow=c(1,2))
hist(h, main = "Datos sin intervalos")
hist(conjunto$Altura, breaks = intervalo, main = "Datos sin intervalos", col = "blue")
```

Datos sin intervalos



Datos sin intervalos



```
par(mfrow= c(1,1))
```