B 問題　20　生物の成長と細胞分裂・生殖　図から考える問題（根の成長・細胞分裂）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　根の成長　20 点

タマネギの根に等間隔の印をつけ、2 日後に観察した（図 1 ）。図 2 は、根の 2 か所の細胞を同じ倍率で見たものである。

(1) 2 日後、印の間隔が最も大きく広がったのは、図 1 のア～ウのどこか。（3 点）

ヒント　根の先端に近い部分と、根もとに近い部分のどちらがよくのびる？

(2) 図 2 の P・Q のうち、根の先端近くの細胞はどちらか。（3 点）

ヒント　分裂した直後の細胞は、小さい？大きい？

(3) 根の先端近くにある、細胞分裂がさかんな部分を何というか。（3 点）

(4) 図 1 の R の、根の先端を守っている部分を何というか。（3 点）

(5) からだをつくる細胞がふえるときの、染色体の数が変わらない細胞分裂を何というか。（3 点）

図1　根ののび方





図2　細胞のようす



(6) 根がのびるしくみを、「細胞分裂」という語を使って、2 つの段階で書きなさい。（5 点）

ヒント　① 細胞の「数」がどうなる → ② 1 つ 1 つの細胞の「大きさ」がどうなる、の順に書く。

2　細胞分裂の観察　22 点

タマネギの根の先端をうすい塩酸に入れたあと、酢酸カーミン液で染色し、押しつぶして顕微鏡で観察した。図 3 のア～カは、観察された細胞のスケッチである。

(1) イを始まりとして、ア～カを細胞分裂の順に並べなさい。（6 点）


ヒント　核 → 染色体が見える → 中央に並ぶ → 両端へ → 仕切り → 2 つの細胞

(2) オの細胞に見られる、ひものようなものを何というか。（3 点）

(3) 根をうすい塩酸に入れる理由はどれか。
ア 細胞どうしを離れやすくするため
イ 細胞を赤く染めるため　ウ 細胞を大きくするため（3 点）

(4) 酢酸カーミン液を使う理由はどれか。
ア 核や染色体を染めて見やすくするため　イ 細胞を離れやすくするため（3 点）

図 3　細胞分裂のようす



(5) タマネギの体細胞の染色体は 16 本である。エの 1 つの細胞の染色体は何本か。（4 点）

ヒント　体細胞分裂では、染色体の数は変わらない。

(6) カバーガラスの上から押しつぶす理由はどれか。
ア 細胞の重なりをなくすため　イ 細胞をふやすため（3 点）

B 問題　20　生物の成長と細胞分裂・生殖　図から考える問題(動物と植物の生殖)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　カエルの生殖と発生　24 点

図 4 は、カエルの生殖細胞ができて受精し、受精卵が成長していくようすを表したものである。

(1) 図 4 の X の、生殖細胞をつくるときの細胞分裂を何というか。(3 点)

(2) 図 4 の ① と ③ にあてはまる数を答えなさい。(各 2 点)

ヒント　減数分裂で半分になり、受精で 13 ＋ 13 になる。


①　　③

(3) 受精とはどのようなことか。「核」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　何と何の「核」が、どうなる？　文の終わりは「～こと。」

(4) 図 4 の Y のように、受精卵が細胞分裂をくり返して、親と同じつくりになるまでの過程を何というか。(3 点)

図 4　カエルの生殖と発生



(5) 受精卵が分裂を始めてから、自分で食物をとり始める前までの子を何というか。(3 点)

(6) 受精卵が 5 回分裂すると、細胞は何個になるか。(3 点)

ヒント　1 回の分裂で 2 倍。2 × 2 × 2 × 2 × 2

(7) 受精卵の分裂が進むと、1 つ 1 つの細胞の大きさはどうなるか。
ア 小さくなる　イ 大きくなる　ウ 変わらない(3 点)

4　被子植物の受精　22 点

図 5 は、受粉したあとのめしべの断面、図 6 は花粉管がのびるようすを観察する実験である。

(1) 図 5 の B・E の名前を答えなさい。(各 2 点)

B　　E

(2) 花粉が A につくことを何というか。(3 点)

(3) 受精後、E と F はそれぞれ何になるか。(各 2 点)

E →　　F →

(4) B の管のはたらきを、「精細胞」「卵細胞」の 2 語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　C を、どこにある D まで運ぶ？

図5　受粉後のめしべの断面




図6　花粉管の実験



(ペトリ皿の中にスライドガラス)

(5) 図 6 で、ショ糖水溶液を使う理由はどれか。
ア 柱頭に近い状態にして、花粉管をのばすため　イ 花粉を染めるため(3 点)

(6) 図 6 で、ペトリ皿に水を入れてふたをする理由はどれか。
ア 花粉が乾燥するのを防ぐため　イ 花粉を冷やすため(3 点)

5　無性生殖と有性生殖(まとめ)　12 点

次のふえ方は、無性生殖・有性生殖のどちらか。無性生殖なら「無」、有性生殖なら「有」と答えなさい。

(1) それぞれ答えなさい。(各 2 点)

(1) アメーバの分裂　　(2) ジャガイモのいも　　(3) カエルの受精


(4) サツマイモのさし木　　(5) エンドウの種子　　(6) ヒトの受精

B 問題 解説　20 生物の成長と細胞分裂・生殖　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　根の成長　20 点

タマネギの根に等間隔の印をつけ、2 日後に観察した（図 1 ）。図 2 は、根の 2 か所の細胞を同じ倍率で見たものである。

図1　根ののび方　　図2　細胞のようす



(1) 2 日後、印の間隔が最も大きく広がったのは、図 1 のア～ウのどこか。
答え：ウ
考え方：根は先端に近い部分（ウ）がよくのびる。根もとに近い部分はほとんどのびない。

(2) 図 2 の P・Q のうち、根の先端近くの細胞はどちらか。
答え：Q
考え方：先端近くは細胞分裂がさかんで、小さい細胞がたくさんある（Q）。

(3) 根の先端近くにある、細胞分裂がさかんな部分を何というか。
答え：成長点
考え方：成長点は根の先端近くにあり、細胞分裂がさかんに行われている。


(4) 図 1 の R の、根の先端を守っている部分を何というか。
答え：根冠
考え方：根冠は、成長点を守るぼうしのような部分。

(5) からだをつくる細胞がふえるときの、染色体の数が変わらない細胞分裂を何というか。
答え：体細胞分裂
考え方：体細胞分裂では、分裂の前後で染色体の数は同じ。

(6) 根がのびるしくみを、「細胞分裂」という語を使って、2 つの段階で書きなさい。
答え：細胞分裂で細胞の数がふえ、ふえた細胞が大きくなることでのびる。
考え方：成長＝①細胞分裂で数がふえる → ②ふえた細胞が大きくなる。この順で書く。

2　細胞分裂の観察　22 点

タマネギの根の先端をうすい塩酸に入れたあと、酢酸カーミン液で染色し、押しつぶして顕微鏡で観察した。図 3 のア～カは、観察された細胞のスケッチである。



(1) イを始まりとして、ア～カを細胞分裂の順に並べなさい。
答え：イ → オ → ウ → ア → カ → エ
考え方：核がはっきり見える図（イ・エ）は、最初か最後になる。

(2) オの細胞に見られる、ひものようなものを何というか。
答え：染色体
考え方：染色体は核の中にあり、細胞分裂のときにはっきり見えるようになる。

(3) 根をうすい塩酸に入れる理由はどれか。
ア 細胞どうしを離れやすくするため　イ 細胞を赤く染めるため　ウ 細胞を大きくするため
答え：ア
考え方：塩酸で細胞どうしを離れやすくする（細胞分裂も止まる）。


(4) 酢酸カーミン液を使う理由はどれか。
ア 核や染色体を染めて見やすくするため　イ 細胞を離れやすくするため
答え：ア
考え方：酢酸カーミン液（酢酸オルセイン液）は、核や染色体を赤く染める。

(5) タマネギの体細胞の染色体は 16 本である。エの 1 つの細胞の染色体は何本か。
答え：16 本
考え方：分裂前に染色体が複製されて 2 倍になり、半分ずつ分かれるので、16 本のまま。

(6) カバーガラスの上から押しつぶす理由はどれか。
ア 細胞の重なりをなくすため　イ 細胞をふやすため
答え：ア
考え方：押しつぶして細胞の重なりをなくし、1 つ 1 つの細胞を観察しやすくする。

3　カエルの生殖と発生　24 点

図 4 は、カエルの生殖細胞ができて受精し、受精卵が成長していくようすを表したものである。



(1) 図 4 の X の、生殖細胞をつくるときの細胞分裂を何というか。
答え：減数分裂
考え方：精子や卵をつくるときは減数分裂。染色体の数がもとの半分になる。

(2) 図 4 の ① と ③ にあてはまる数を答えなさい。
答え：① 13 本　③ 26 本
考え方：精子・卵は 26 本の半分の 13 本。受精卵は 13 ＋ 13 ＝ 26 本（親と同じ）。

(3) 受精とはどのようなことか。「核」という語を使って書きなさい。
答え：精子の核と卵の核が合体すること。
考え方：受精＝精子の核と卵の核が合体すること。「核」を必ず書く。

B 問題 解説　20 生物の成長と細胞分裂・生殖　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(4) 図４の Y のように、受精卵が細胞分裂をくり返して、親と同じつくりになるまでの過程を何というか。
答え:発生
考え方:受精卵 → 胚 → 成体 と育つ過程を発生という。

(5) 受精卵が分裂を始めてから、自分で食物をとり始める前までの子を何というか。
答え:胚
考え方:分裂を始めた受精卵から、自分で食物をとる前までを胚という。

(6) 受精卵が５回分裂すると、細胞は何個になるか。
答え: 32 個
考え方: 1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 32 (個)。

(7) 受精卵の分裂が進むと、１つ１つの細胞の大きさはどうなるか。
ア 小さくなる　イ 大きくなる　ウ 変わらない
答え:ア
考え方:全体の大きさはほとんど変わらずに分裂するので、１つ１つの細胞は小さくなる。

4　被子植物の受精　22 点

図５は、受粉したあとのめしべの断面、図６は花粉管がのびるようすを観察する実験である。

図5　受粉後のめしべの断面





図6　花粉管の実験



(ペトリ皿の中にスライドガラス)

(1) 図５の B・E の名前を答えなさい。
答え: B 花粉管　E 胚珠
考え方: A 柱頭、B 花粉管、C 精細胞、D 卵細胞、E 胚珠、F 子房。

(2) 花粉が A につくことを何というか。
答え:受粉
考え方:受粉＝花粉がめしべの柱頭につくこと。

(3) 受精後、E と F はそれぞれ何になるか。
答え: E → 種子　F → 果実
考え方:胚珠 → 種子、子房 → 果実。受精卵 → 胚。

(4) B の管のはたらきを、「精細胞」「卵細胞」の２語を使って書きなさい。
答え:花粉の中の精細胞を、胚珠の中の卵細胞まで届けるはたらき。
考え方:植物の精細胞は泳げないので、花粉管を通って卵細胞まで運ばれる。

(5) 図６で、ショ糖水溶液を使う理由はどれか。
ア 柱頭に近い状態にして、花粉管をのばすため　イ 花粉を染めるため
答え:ア
考え方:柱頭に近い状態にすると、花粉管がのびやすい。

(6) 図６で、ペトリ皿に水を入れてふたをする理由はどれか。
ア 花粉が乾燥するのを防ぐため　イ 花粉を冷やすため
答え:ア
考え方:水を入れてふたをすると、中がしめって花粉が乾燥しない。

5　無性生殖と有性生殖(まとめ)　12 点

次のふえ方は、無性生殖・有性生殖のどちらか。無性生殖なら「無」、有性生殖なら「有」と答えなさい。

(1) それぞれ答えなさい。
答え: (1) アメーバの分裂 無　(2) ジャガイモのいも 無　(3) カエルの受精 有　(4) サツマイモのさし木 無　(5) エンドウの種子 有　(6) ヒトの受精 有
考え方:受精しない＝無性生殖(子は親と同じ形質)。受精する＝有性生殖(親とちがう形質も出る)。