04 まとめ 物質の性質・密度

物体と物質 → 有機物と無機物 → 金属 → 密度の計算 → 浮き沈み・グラフ

① 物質の性質 密度の計算

1 物体と物質／純粋な物質と混合物 ― 物質は性質で見分ける




純粋な物質＝１種類の物質
酸素・水・鉄・食塩
混合物＝２種類以上が混ざる
空気・海水・食塩水・みりん
※ 水溶液はすべて混合物
蒸留で分ける＜千葉 2025＞

物質は「性質」で見分ける（何を調べる操作か）

加熱する → **有機物か**	電気を通す？ → **金属か**
みがく → **金属光沢**	磁石を近づける → **鉄か**
水に入れる → **とけるか**	密度を求める → **物質名**

2 有機物と無機物 ― 加熱して調べる



有機物＝炭素をふくむ
砂糖・デンプン・紙・ろう
エタノール・プラスチック
加熱すると**こげて黒くなる**
燃えると二酸化炭素と水
無機物＝食塩・鉄・ガラス
※ 二酸化炭素は無機物

白い粉（食塩・砂糖・デンプン）の見分け方

- 加熱する → こげない → **食塩**
- 水に入れる → とける → **砂糖**
- ヨウ素液 → 青むらさき → **デンプン**

確かめ方：石灰水が白くにごる＝**二酸化炭素**

3 金属と非金属 ― その操作で「どの性質」を確かめたかを答える



注意
磁石につくのは
金属共通ではない
（鉄はつく、銅・アルミ ×）

入試ではこう出る
薬さじでこする → **金属光沢**を確かめる
＜静岡 2024＞
非金属＝金属以外（ガラス・ゴム・プラスチック）


4 密度と計算ルート ― まず「何が体積か」を決める

密度（みつど）＝ 1cm³ あたりの質量

$$\text{密度} = \frac{\text{質量〔g〕}}{\text{体積〔cm³〕}}$$



同じ物質なら密度は同じ



計算ルート（金属 54.0g、水 20.0 → 40.0cm³）


ステップ１ 体積＝ 40.0 − 20.0 ＝ 20.0〔cm³〕（ふえた分）

ステップ２ 密度＝ $\frac{54.0}{20.0}$ ＝ 2.70〔g/cm³〕→ アルミニウム

単位 **単位をそろえてから計算**：1kg = 1000g
1m³ = 100×100×100 = 1000000cm³

注意 最初の水の量を体積にしない＜神奈川 2024＞

5 浮くか沈むか／グラフで密度を比べる




浮く＝物体の密度＜液体の密度
沈む＝物体の密度＞液体の密度
「軽いから浮く」ではない
※ ふつう固体＞液体の密度
水は例外で、氷が水に浮く

結果を不等号に置きかえる＜静岡 2024＞



A：エタノールに沈み水に浮く
→ 0.79 ＜ A ＜ 1.00
B：水に沈み食塩水に浮く
→ 1.00 ＜ B ＜ 1.20
C：食塩水にも沈む → 1.20 ＜ C



原点を通る直線のかたむき＝密度
かたむきが急なほど密度が大きい
同じ直線上の点＝同じ物質
グラフから１回分の体積を読む ＜山口 2026＞

入試のポイント 計算は「体積を決める → 分数で計算 → 表や性質で答える」

❶ 有機物＝炭素をふくむ → 加熱でこげ、二酸化炭素と水ができる／金属の性質＝光沢・のびる・広がる・電気と熱を通す
❷ 密度から物質を決めたら、**性質**（磁石につく・電気を通す）までつなげて答える（鉄か銅か → 鉄は磁石につく）＜東京 2025＞
❸ 浮き沈みの理由 →「**物体の密度が液体の密度より小さい（大きい）から**」と書く
❹ 水の密度 1.0 より小さい物質は水に浮く（氷 0.92・木 0.6・油 0.91）／大きい物質は沈む（アルミ 2.7・鉄 7.9）
❺ エタノール・プラスチック・ろうも**有機物**。二酸化炭素は炭素をふくむが**無機物**（ひっかけ注意）


04 まとめ


気体の性質


集め方 → よく出る 4 つの気体 → 観察結果から当てる → その他の気体 → 注意


② 気体の性質 集め方・確かめ方

1 気体の集め方 ― 「水へのとけ方」と「空気との重さ」の 2 つで決まる









記述 理由は 2 つの条件で書く

水上置換 →「水にとけにくい」
下方置換 →「水にとけやすく、空気より重い」
上方置換 →「水にとけやすく、空気より軽い」
水上置換は純粋な気体が集まり、集めた量もわかる

2 よく出る 4 つの気体 ― 「操作 → 気体名 → 確かめ方 → 集め方」をつなぐ

気体	発生させる操作	確かめ方	水へのとけ方	空気と比べて	集め方
酸素	二酸化マンガン ＋ オキシドール(うすい過酸化水素水)	火のついた線香が**激しく燃える**	とけにくい	少し重い	水上置換法
二酸化炭素	石灰石(貝がら)＋ うすい塩酸 **炭酸水素ナトリウムを加熱**	石灰水が**白くにごる**	少しとける	重い	下方置換法(水上置換法も可)
水素	金属(亜鉛・鉄)＋ うすい塩酸	マッチの火で**ポンと音を立てて燃え**、水ができる	とけにくい	最も軽い	水上置換法
アンモニア	塩化アンモニウム ＋ 水酸化カルシウムを加熱	**刺激臭**。水溶液は**アルカリ性**	**非常にとける**	軽い	上方置換法だけ

※ 二酸化炭素は発泡入浴剤を湯に入れても出る＜千葉 2024＞。水溶液(炭酸水)は酸性。 ※酸素自身は燃えない(ものを燃やすはたらき)。

最近の入試 ▸ 操作だけ見て**気体名を書く** ▸ **同じ気体**が出る操作を選ぶ ▸ 観察結果 **2 つ**から当てる ▸ 集め方を **2 つの条件**で説明

3 入試ではこう問われる ― 操作や観察結果から気体を当てる

同じうすい塩酸でも、入れるもので変わる

うすい塩酸 ＋ 石灰石 → 二酸化炭素
うすい塩酸 ＋ 亜鉛・鉄 → 水素

「水素」を書く問題は得点率が低い＜大阪 2026＞

2 つの観察結果を合わせて考える＜埼玉 2026＞


噴水ができた → 水に**非常によくとける**
水が赤くなった → 水溶液が**アルカリ性**
→ **アンモニア**


炭酸水素ナトリウムの加熱と同じ気体が出る操作は？
→ 石灰石＋うすい塩酸(どちらも**二酸化炭素**)

4 その他の気体 ― 名前と特徴だけ覚える

	窒素	塩素	塩化水素	硫化水素	メタン
におい	なし	刺激臭	刺激臭	腐卵臭(くさった卵)	なし
特徴	空気の約 78 %(いちばん多い)	有毒 漂白・殺菌作用	水溶液＝塩酸 酸性	有毒 温泉のにおい	天然ガス よく燃える
集め方	水上置換法	下方置換法	下方置換法	下方置換法	水上置換法

5 集めるときの注意／アンモニアの噴水と水溶液の性質





アンモニアの噴水実験

1 液体の加熱
アンモニアを集めたフラスコ
水にとてもよくとける
→ 圧力が下がる
→ 噴水になる

2 薬品がついたら
・すぐに多量の流水で流す
・先生に知らせる
・保護めがねをつける
・においは手であおいでかぐ

フェノールフタレイン 赤 → アルカリ性

噴水：水にとてもよくとけるから起こる
水にとかすと
二酸化炭素 → 酸性
BTB 黄色・青リトマス紙 → 赤
アンモニア → アルカリ性
BTB 青・赤リトマス紙 → 青
塩化水素 → 酸性(水溶液は塩酸)
※においは手であおいでかぐ

入試のポイント 「操作 → 気体名」を書けるようにする

❶ 塩酸＋石灰石 → **二酸化炭素**／塩酸＋亜鉛・鉄 → **水素** 上方置換＝**アンモニアだけ**
❷ 下方置換＝二酸化炭素・塩素・塩化水素など／水上置換＝水にとけにくい気体(純粋な気体が集まる)
❸ 水素 → ポンと音を立てて燃える アンモニア → 噴水(水にとてもよくとけるから)

A 問題　4　物質の性質・気体・密度　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　物体と物質・有機物と無機物・金属　2 点 ×10 = 20 点

(1) 1 種類の物質でできているものを何というか。

(2) 2 種類以上の物質が混ざったものを何というか。

(3)　食塩水・空気・海水は、純粋な物質・混合物のどちらか。

(4)　炭素をふくむ物質を何というか。

(5)　有機物を加熱すると、水と何ができるか。

(6)　有機物以外の物質を何というか。

(7)　炭素をふくむが、例外的に無機物とされる気体は何か。

(8)　デンプンにヨウ素液をつけると、何色になるか。

(9)　金属に共通する性質のうち、たたくとうすく広がる性質。

(10)　金属に共通する性質ではないものは、次のどれか。「電気を通す・磁石につく・光沢がある」

2　密度　2 点 ×6 = 12 点

(1)　物質　1 cm³　あたりの質量を何というか。

(2)　密度は、質量　÷　(　)で求める。

(3)　密度の単位を答えなさい。

(4)　水の密度は何　g/cm³　か。

(5)　水より密度が小さい物質は、水に浮くか、沈むか。

(6)　質量　54 g 、体積　20 cm³　の物質の密度は何　g/cm³　か。

3　気体の集め方・発生方法　2 点 ×10 = 20 点

(1)　水にとけにくい気体を集める方法。

(2)　水にとけやすく、空気より軽い気体を集める方法。

(3)　水にとけやすく、空気より重い気体を集める方法。

(4)　二酸化マンガンにオキシドールを加えると発生する気体。

(5)　石灰石にうすい塩酸を加えると発生する気体。

(6)　亜鉛や鉄にうすい塩酸を加えると発生する気体。

(7)　塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを混ぜて加熱すると発生する気体。

(8)　空気中に一番多くふくまれる気体。

(9)　上方置換でしか集められない気体。

(10)　気体を集めるとき、はじめに出てくる気体を集めないのはなぜか。「(　)が混ざっているから」

4　気体の確かめ方・性質　2 点 ×9 = 18 点

(1)　火のついた線香を入れると激しく燃える気体。

(2)　石灰水を白くにごらせる気体。

(3)　マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃える気体。

(4)　水素が燃えると、何ができるか。

(5)　刺激臭があり、水溶液がアルカリ性を示す気体。

(6)　二酸化炭素の水溶液は、酸性・アルカリ性のどちらか。

(7)　アンモニアの水溶液に緑色の BTB 液を入れると、何色になるか。

(8)　黄緑色で有毒、漂白作用がある気体。

(9)　水溶液が塩酸になる気体。

5　選択・穴うめ問題 ①　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

(1)　有機物を加熱して石灰水が白くにごった。有機物にふくまれるものは？　　答え(　　)

ア 炭素　イ 食塩　ウ 鉄　エ 窒素

A 問題　4　物質の性質・気体・密度　選択・穴うめ問題・気体のまとめ表

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(2)　白い粉が食塩か砂糖かを加熱して見分ける方法を完成させなさい。

加熱して、こげて(①　　)なれば砂糖、こげなければ(②　　)。

(3)　「磁石につくか」で金属かどうかを調べるのが適切でない理由は？　答え(　　)

ア　鉄は磁石につかない　イ　磁石につく金属は一部だけ　ウ　金属はすべて磁石につく　エ　磁石は電気を通す

(4)　密度で物質を見分けられる理由を完成させなさい。

密度は物質の(　　)によって決まっているから。

(5)　氷が水に浮く理由はどれか。　答え(　　)

ア　氷の質量が大きい　イ　氷のほうが冷たい　ウ　氷の密度が水より大きい　エ　氷の密度が水より小さい

(6)　水素を水上置換で集められる理由はどれか。　答え(　　)

ア　においがあるから　イ　水によくとけるから　ウ　水にとけにくいから　エ　空気より重いから

(7)　アンモニアを上方置換で集める理由を完成させなさい。

水にとても(①　　)、空気より(②　　)から。

(8)　二酸化炭素を下方置換で集める理由を完成させなさい。

水に少しとけ、空気より(　　)から。

(9)　はじめに出てくる気体を集めない理由はどれか。　答え(　　)

ア　気体の温度が高い　イ　装置の中の空気が混ざる　ウ　においが強い　エ　気体の量が少ない

(10)　集めた気体が酸素であることを確かめる結果はどれか。　答え(　　)

ア　石灰水が白くにごる　イ　リトマス紙が青くなる　ウ　線香が激しく燃える　エ　ポンと音を立てて燃える

6　4 つの気体のまとめ表 ―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2 点 ×5 ＝ 10 点

	酸素	二酸化炭素	水素	アンモニア
発生方法	二酸化マンガン＋①	石灰石＋うすい塩酸	②　＋うすい塩酸	塩化アンモニウム＋水酸化カルシウム
集め方	水上置換	③（水上置換も可）	水上置換	④
確かめ方	線香が激しく燃える	⑤　が白くにごる	ポンと燃える	刺激臭・アルカリ性

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　4　物質の性質・気体・密度　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　物体と物質・有機物と無機物・金属　2 点 ×10 = 20 点

(1) 1 種類の物質でできているものを何というか。 **純粋な物質(純物質)**

(2) 2 種類以上の物質が混ざったものを何というか。 **混合物**

(3) 食塩水・空気・海水は、純粋な物質・混合物のどちらか。 **混合物**

(4) 炭素をふくむ物質を何というか。 **有機物**

(5) 有機物を加熱すると、水と何ができるか。 **二酸化炭素**

(6) 有機物以外の物質を何というか。 **無機物**

(7) 炭素をふくむが、例外的に無機物とされる気体は何か。 **二酸化炭素**

(8) デンプンにヨウ素液をつけると、何色になるか。 **青むらさき色**

(9) 金属に共通する性質のうち、たたくとうすく広がる性質。 **展性**

(10) 金属に共通する性質ではないものは、次のどれか。「電気を通す・磁石につく・光沢がある」 **磁石につく**

2　密度　2 点 ×6 = 12 点

(1) 物質 1 cm³ あたりの質量を何というか。 **密度**

(2) 密度は、質量 ÷ ( )で求める。 **体積**

(3) 密度の単位を答えなさい。 **g/cm³**

(4) 水の密度は何 g/cm³ か。 **1.0 g/cm³**

(5) 水より密度が小さい物質は、水に浮くか、沈むか。 **浮く**

(6) 質量 54 g 、体積 20 cm³ の物質の密度は何 g/cm³ か。 **2.7 g/cm³**

3　気体の集め方・発生方法　2 点 ×10 = 20 点

(1) 水にとけにくい気体を集める方法。 **水上置換(法)**

(2) 水にとけやすく、空気より軽い気体を集める方法。 **上方置換(法)**

(3) 水にとけやすく、空気より重い気体を集める方法。 **下方置換(法)**

(4) 二酸化マンガンにオキシドールを加えると発生する気体。 **酸素**

(5) 石灰石にうすい塩酸を加えると発生する気体。 **二酸化炭素**

(6) 亜鉛や鉄にうすい塩酸を加えると発生する気体。 **水素**

(7) 塩化アンモニウムと水酸化カルシウムを混ぜて加熱すると発生する気体。 **アンモニア**

(8) 空気中に一番多くふくまれる気体。 **窒素**

(9) 上方置換でしか集められない気体。 **アンモニア**

(10) 気体を集めるとき、はじめに出てくる気体を集めないのはなぜか。「( )が混ざっているから」 **空気**

4　気体の確かめ方・性質　2 点 ×9 = 18 点

(1) 火のついた線香を入れると激しく燃える気体。 **酸素**

(2) 石灰水を白くにごらせる気体。 **二酸化炭素**

(3) マッチの火を近づけると、ポンと音を立てて燃える気体。 **水素**

(4) 水素が燃えると、何ができるか。 **水**

(5) 刺激臭があり、水溶液がアルカリ性を示す気体。 **アンモニア**

(6) 二酸化炭素の水溶液は、酸性・アルカリ性のどちらか。 **酸性**

(7) アンモニアの水溶液に緑色の BTB 液を入れると、何色になるか。 **青色**

(8) 黄緑色で有毒、漂白作用がある気体。 **塩素**

(9) 水溶液が塩酸になる気体。 **塩化水素**

5　選択・穴うめ問題 ①　3 点 ×10 = 30 点(2 ページ目に続く)

(1) 有機物を加熱して石灰水が白くにごった。有機物にふくまれるものは？　答え(ア)

ア 炭素　イ 食塩　ウ 鉄　エ 窒素

A 問題 解答　4　物質の性質・気体・密度　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　　3 点 ×10 ＝ 30 点(続き)

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(2)　白い粉が食塩か砂糖かを加熱して見分ける方法を完成させなさい。

加熱して、こげて(黒く)なれば砂糖、こげなければ(食塩)。

(3)　「磁石につくか」で金属かどうかを調べるのが適切でない理由は？　　答え(イ)

ア 鉄は磁石につかない　イ 磁石につく金属は一部だけ　ウ 金属はすべて磁石につく　エ 磁石は電気を通す

(4)　密度で物質を見分けられる理由を完成させなさい。

密度は物質の(種類)によって決まっているから。

(5)　氷が水に浮く理由はどれか。　　答え(エ)

ア 氷の質量が大きい　イ 氷のほうが冷たい　ウ 氷の密度が水より大きい　エ 氷の密度が水より小さい

(6)　水素を水上置換で集められる理由はどれか。　　答え(ウ)

ア においがあるから　イ 水によくとけるから　ウ 水にとけにくいから　エ 空気より重いから

(7)　アンモニアを上方置換で集める理由を完成させなさい。

水にとても(よくとけ)、空気より(軽い)から。

(8)　二酸化炭素を下方置換で集める理由を完成させなさい。

水に少しとけ、空気より(重い)から。

(9)　はじめに出てくる気体を集めない理由はどれか。　　答え(イ)

ア 気体の温度が高い　イ 装置の中の空気が混ざる　ウ においが強い　エ 気体の量が少ない

(10)　集めた気体が酸素であることを確かめる結果はどれか。　　答え(ウ)

ア 石灰水が白くにごる　イ リトマス紙が青くなる　ウ 線香が激しく燃える　エ ポンと音を立てて燃える

6　4 つの気体のまとめ表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　　2 点 ×5 ＝ 10 点

	酸素	二酸化炭素	水素	アンモニア
発生方法	二酸化マンガン＋①	石灰石＋うすい塩酸	②　＋うすい塩酸	塩化アンモニウム＋水酸化カルシウム
集め方	水上置換	③（水上置換も可）	水上置換	④
確かめ方	線香が激しく燃える	⑤　が白くにごる	ポンと燃える	刺激臭・アルカリ性

① オキシドール(うすい過酸化水素水)　② 亜鉛(鉄・マグネシウムなどの金属)

③ 下方置換　④ 上方置換

⑤ 石灰水

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

B 問題　4　物質の性質・気体・密度　図から考える問題（有機物・密度）

氏名　　得点　　／ 100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　白い粉の見分け方　―有機物と無機物―　24 点

白い粉 A・B・C は、砂糖・デンプン・食塩のどれかである。図 1 のように加熱すると、A と B は燃えて黒くこげ、C は変化なかった。また、A は水にとけたが、B はとけなかった。

(1) A・B・C は何か。（2 点）


ヒント　こげる＝有機物（砂糖・デンプン）。水にとけるのは砂糖。

A

B

C

図 1　粉を燃やして調べる



(2) A・B のように、加熱するとこげて、二酸化炭素ができる物質を何というか。（3 点）

(3) 図 1 の③で、石灰水が白くにごった。発生した気体は何か。（3 点）

(4) 図 1 の②で、集気びんの内側に液体 P がついた。P は何か。また、P を確かめる紙は何か。（4 点）

P　　紙

(5) ③ の結果から、A・B にはどんな物質がふくまれているとわかるか。「炭素」「二酸化炭素」という語を使って書きなさい。（5 点）

ヒント　二酸化炭素は、炭素が燃えて（酸素と結びついて）できる。

(6) 有機物を 2 つ選びなさい。
ア 食塩　イ ロウ　ウ 鉄　エ エタノール　オ 二酸化炭素（3 点）

2　密度　―メスシリンダーとグラフ―　20 点

金属 P の質量は 27.0 g だった。図 2 のように P の体積をはかった。図 3 は、物質 A ～ D の質量と体積の関係である。
【密度〔g/cm³〕】アルミニウム 2.70　鉄 7.87　銅 8.96

(1) 図 2 から、P の体積は何 cm³ か。（4 点）

ヒント　入れる前と後の目もりの差（ふえた分）が P の体積。

(2) P の密度は何 g/cm³ か。（4 点）

ヒント　密度 ＝ 質量 ÷ 体積

(3) P は何という金属か。上の表から選びなさい。（3 点）

(4) 図 3 で、同じ物質と考えられるものを 2 つ選びなさい。（4 点）

ヒント　それぞれ 質量 ÷ 体積 を計算する。原点を通る同じ直線上にあるもの。

図2　メスシリンダー





図3　質量と体積



(5) 図 3 で、密度がいちばん大きいものはどれか。（3 点）

ヒント　グラフの線のかたむきが急なほど、密度が大きい。

(6) A ～ D を水（密度 1.0 g/cm³）に入れたとき、浮くものはどれか。（3 点）

ヒント　水より密度が小さいものが浮く。

B 問題　4　物質の性質・気体・密度図から考える問題(気体の集め方・発生・性質)

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　気体の集め方　20 点

図 4 は、気体の集め方 ア～ウ を表したものである。


(1) ア～ウ の集め方の名前を答えなさい。(各 2 点)

ア

イ

ウ

図 4　気体の集め方



(2) アンモニアを集めるのに適した方法を、ア～ウから選びなさい。(3 点)

ヒント　アンモニアは水にとてもとけやすく、空気より軽い。

(3) 二酸化炭素は イ で集めることができる。二酸化炭素はどんな気体か。
ア 空気より重い　イ 空気より軽い(3 点)

(4) ア の方法は、どのような性質の気体を集めるのに適しているか。「水」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　水の中を通して集めるので、水にとけてしまう気体は集まらない。

(5) ア で、はじめに出てくる気体を集めないのはなぜか。
ア 装置の中の空気がまざっているから　イ 気体が熱いから(3 点)


4　気体の発生　16 点

図 5 のように、黒い固体　X　に液体　Y　を加えると気体　Z　が発生した。Z　を集めた試験管に火のついた線香を入れると、線香が激しく燃えた。

(1) X ・ Y　は何か。(各 2 点)

X　　Y

図 5　気体の発生



(2) 気体　Z　は何か。(4 点)

ヒント　ものを燃やすはたらきがある気体。

(3) X　を石灰石、Y　をうすい塩酸にかえると、何という気体が発生するか。(4 点)

(4) (3) の気体を水にとかし、BTB　溶液を加えると何色になるか。(4 点)

ヒント　二酸化炭素の水溶液(炭酸水)は酸性。


5　アンモニアの噴水　20 点

図 6 のように、アンモニアを集めたフラスコ　P　に、スポイト　Q　の水を入れると、ビーカー　R　の水がふき上がり、赤い噴水ができた。R　の水にはフェノールフタレイン液を加えてある。

(1) 噴水が赤くなったことから、アンモニアの水溶液は何性か。(5 点)

ヒント　フェノールフタレイン液は、アルカリ性で赤色になる。

図 6　アンモニアの噴水



(2) 水がふき上がった理由を、「とける」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　アンモニアが水にとけると、フラスコの中の気体はどうなる？「～から。」で終わる。


(3) アンモニアを発生させる組み合わせはどれか。
ア 塩化アンモニウムと水酸化カルシウム　イ 亜鉛とうすい塩酸(5 点)

(4) アンモニアの水溶液に　BTB　溶液を加えると何色になるか。(5 点)

B 問題 解説　4　物質の性質・気体・密度赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　白い粉の見分け方　―有機物と無機物―　24 点

白い粉　A ・ B ・ C　は、砂糖・デンプン・食塩のどれかである。図 1 のよう
加熱すると、A と B は燃えて黒くこげ、C は変化しなかった。また、A
は水にとけたが、B はとけなかった。



(1) A ・ B ・ C　は何か。
答え:　A　砂糖　　B　デンプン　　C　食塩
考え方:こげない　C　は食塩。こげて水にとける　A　は砂糖、とけない　B　はデンプン。

(2) A ・ B　のように、加熱するとこげて、二酸化炭素ができる物質を何というか。
答え:有機物
考え方:有機物＝炭素をふくむ物質。燃えると二酸化炭素と水ができる。

(3)　図 1 の③で、石灰水が白くにごった。発生した気体は何か。
答え:二酸化炭素
考え方:石灰水が白くにごる＝二酸化炭素。

(4)　図 1 の②で、集気びんの内側に液体　P　がついた。P　は何か。また、P　を確かめる紙は何か。
答え:　P　水　紙 塩化コバルト紙
考え方:塩化コバルト紙は、水にふれると青色から赤(桃)色に変わる。

(5) ③ の結果から、A ・ B　にはどんな物質がふくまれているとわかるか。「炭素」「二酸化炭素」という語を使って書きなさい。
答え:燃えて二酸化炭素ができたので、炭素がふくまれている。
考え方:二酸化炭素ができた＝もとの物質に炭素があった。だから　A ・ B　は有機物。

(6)　有機物を 2 つ選びなさい。
ア 食塩　イ ロウ　ウ 鉄　エ エタノール　オ 二酸化炭素
答え:イ・エ
考え方:ロウ・エタノール・砂糖・紙は有機物。二酸化炭素は炭素をふくむが無機物。

2　密度　―メスシリンダーとグラフ―　20 点

金属　P　の質量は　27.0 g　だった。図 2 のように　P　の体積をはかっ
図 3 は、物質　A ～ D　の質量と体積の関係である。【密度〔 g/cm³ 〕】ア
ミニウム　2.70　鉄　7.87　銅　8.96

図2　メスシリンダー





図3　質量と体積



(1)　図 2 から、P　の体積は何　cm³　か。
答え:　10.0 cm³
考え方:　60.0 − 50.0　＝　10.0（ cm³ ）。

(2) P　の密度は何　g/cm³　か。
答え:　2.7 g/cm³
考え方:　27.0 ÷ 10.0　＝　2.7（ g/cm³ ）。

(3) P　は何という金属か。上の表から選びなさい。
答え:アルミニウム
考え方:密度　2.70 g/cm³　はアルミニウム。密度は物質ごとに決まっている。


(4)　図 3 で、同じ物質と考えられるものを 2 つ選びなさい。
答え:　B　と　C
考え方:　B　は　20 ÷ 4　＝　5.0 、C　は　40 ÷ 8　＝　5.0 。密度が同じなので同じ物質。

(5)　図 3 で、密度がいちばん大きいものはどれか。
答え:　A
考え方:　A　は　20 ÷ 2　＝　10 g/cm³　で、いちばん大きい。

(6) A ～ D　を水(密度　1.0 g/cm³)に入れたとき、浮くものはどれか。
答え:　D
考え方:　D　は　5 ÷ 10　＝　0.5 g/cm³　で、水の　1.0　より小さいので浮く。

3　気体の集め方　20 点

図 4 は、気体の集め方 ア～ウ を表したものである。



(1)　ア～ウ の集め方の名前を答えなさい。
答え:ア 水上置換法　イ 下方置換法　ウ 上方置換法
考え方:水の中で集める＝水上置換法。下に集める＝下方置換法。上に集める＝上方置換法。

(2)　アンモニアを集めるのに適した方法を、ア～ウから選びなさい。
答え:ウ
考え方:水にとけやすいのでアは　×　。空気より軽いので上方置換法(ウ)。

(3)　二酸化炭素は イ で集めることができる。二酸化炭素はどんな気体か。
ア 空気より重い　イ 空気より軽い
答え:ア
考え方:空気より重い気体は、下にたまるので下方置換法で集められる。


(4)　ア の方法は、どのような性質の気体を集めるのに適しているか。「水」という語を使って書きなさい。
答え:水にとけにくい性質の気体。
考え方:水上置換法は、水にとけにくい気体(酸素・水素など)に使う。純粋な気体が集まる。

(5)　ア で、はじめに出てくる気体を集めないのはなぜか。
ア 装置の中の空気がまざっているから　イ 気体が熱いから
答え:ア
考え方:はじめは装置の中の空気が出てくるので、しばらくしてから集める。

B 問題 解説　4　物質の性質・気体・密度赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

4　気体の発生　16 点

図 5 のように、黒い固体　X　に液体　Y　を加えると気体　Z　が発生した を集めた試験管に火のついた線香を入れると、線香が激しく燃えた。



(1) X ・ Y　は何か。
答え:　X　二酸化マンガン　　Y　オキシドール
考え方:二酸化マンガンにオキシドール(うすい過酸化水素水)を加えると酸素が発生する。


(2)　気体　Z　は何か。
答え:酸素
考え方:酸素にはものを燃やすはたらきがある。酸素自体は燃えない。

(3) X　を石灰石、 Y　をうすい塩酸にかえると、何という気体が発生するか。
答え:二酸化炭素
考え方:石灰石(貝がら)＋うすい塩酸 → 二酸化炭素。石灰水を白くにごらせる。

(4) (3) の気体を水にとかし、 BTB　溶液を加えると何色になるか。
答え:黄色
考え方: BTB　溶液は 酸性→黄色、中性→緑色、アルカリ性→青色。

5　アンモニアの噴水　20 点

図 6 のように、アンモニアを集めたフラスコ　P　に、スポイト　Q　の水を入れると、ビーカー　R　の水がふき上がり、赤い噴水ができた。 R　の水にはフェノールフタレイン液を加えてある。



(1)　噴水が赤くなったことから、アンモニアの水溶液は何性か。
答え:アルカリ性
考え方:フェノールフタレイン液が赤＝アルカリ性。

(2)　水がふき上がった理由を、「とける」という語を使って書きなさい。
答え:アンモニアが水にとても多くとけて、フラスコの中の圧力が下がったから。
考え方:アンモニアが水にとけてフラスコ内の気体が減り、圧力が下がる。そのためビーカーの水がすい上げられる。

(3)　アンモニアを発生させる組み合わせはどれか。
ア 塩化アンモニウムと水酸化カルシウム　イ 亜鉛とうすい塩酸
答え:ア
考え方:塩化アンモニウム＋水酸化カルシウムを加熱→アンモニア。亜鉛＋うすい塩酸→水素。

(4)　アンモニアの水溶液に　BTB　溶液を加えると何色になるか。
答え:青色
考え方:アンモニアの水溶液はアルカリ性。 BTB　溶液はアルカリ性で青色になる。