

Généralités

1 Exercice – Peigne de Dirac

Montrer que $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta_{2k\pi}$ définit une distribution sur $\mathbb{R}$.

2 Exercice

Montrer que l'application

$$T : \begin{cases} \mathcal{D}(\mathbb{R}) & \longrightarrow \mathbb{R} \\ \varphi & \longmapsto \int_{\mathbb{R}} \varphi(x^2) dx \end{cases}$$

définit une distribution dont on déterminera l'ordre.

3 Exercice

Montrer que l'application

$$T : \begin{cases} \mathcal{D}(\mathbb{R}) & \longrightarrow \mathbb{R} \\ \varphi & \longmapsto \int_{\mathbb{R}} \varphi'(x) e^{x^2} dx \end{cases}$$

définit une distribution dont on déterminera l'ordre.

4 Exercice

Q1. Montrer que l'application

$$T : \begin{cases} \mathcal{D}(\mathbb{R}) & \longrightarrow \mathbb{R} \\ \varphi & \longmapsto \int_0^{+\infty} \varphi'(x) \ln(x) dx \end{cases}$$

définit une distribution d'ordre au plus 1.

Q2. Soit χ_n une fonction plateau valant 1 sur $[\frac{1}{n}, 1]$ et s'annulant en dehors de $]\frac{1}{2n}, 2[$.

(a) Minorer $|T(\chi_n)|$.

(b) En déduire que T est une distribution d'ordre exactement 1.

5 Exercice

Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on définit

$$T(\varphi) = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k} \left(\varphi\left(\frac{1}{k}\right) - \varphi(0) \right).$$

Q1. Justifier que cette formule définit bien une distribution d'ordre inférieur ou égal à 1.

Q2. Prouver que T n'est pas d'ordre 0. Conclure.

6 Exercice

Soit φ une fonction de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Q1. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2} = \varphi''(0)$.

Q2. En déduire que la fonction

$$x \longmapsto \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2}$$

est intégrable sur $]0, +\infty[$.

Q3. Pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, on pose

$$T(\varphi) = \int_0^{+\infty} \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x^2} dx.$$

Montrer que T est une distribution sur $\mathbb{R}$ et calculer $x^2 T$.

7 Exercice – Partie finie de $\frac{1}{x^2}$

On considère l'application

$$P : \begin{cases} \mathcal{D}(\mathbb{R}) & \longrightarrow \mathbb{R} \\ \varphi & \longmapsto \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x^2} dx - 2 \frac{\varphi(0)}{\varepsilon} \end{cases}$$

Q1. (a) Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Montrer qu'il existe $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\varphi(x) = \varphi(0) + x\varphi'(0) + x^2\psi(x)$$

avec $\|\psi\|_{\infty} \leq \frac{1}{2} \|\varphi''\|_{\infty}$.

(b) En déduire que P est une distribution bien définie sur $\mathbb{R}$.

Q2. Montrer que $xP = V$ où V est la valeur principale de $\frac{1}{x}$. En déduire $x^2 P$.

8 Exercice

Montrer qu'il n'existe pas de fonction f continue telle que pour tout $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\delta_0(\varphi) = T_{\varphi}$.

Dérivation des distributions

9 Exercice

Montrer que $x\delta'_0 = -\delta_0$ dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

10 Exercice

Q1. Soit T_f la distribution associée à la fonction continue par morceaux $f(x) = \text{signe}(x)$.

Calculer la dérivée de T_f .

Q2. Soit T_g la distribution associée à la fonction continue $g(x) = |x|$. Calculer la dérivée de T_g .

11 Exercice – Formule des sauts

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ par morceaux. Soit $a_1 < a_2 < \dots < a_N$ une subdivision adaptée à f , c'est-à-dire que f se prolonge en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur chacun des intervalles $] -\infty, a_1]$, $[a_i, a_{i+1}]$ et $[a_N, +\infty[$. Montrer que l'on a :

$$(T_f)' = T_{f'} + \sum_{i=1}^N (f(a_i^+) - f(a_i^-)) \delta_{a_i},$$

où f' est la dérivée usuelle de f , définie hors des points a_i , et $f(a_i^\pm)$ sont les limites à droite et à gauche de f en a_i .

12 Exercice – Application de la formule des sauts

On considère la fonction

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1, \\ x^2 & \text{si } x \in [-1, 0], \\ 0 & \text{si } x \in]0, 1[, \\ 1 - x & \text{si } x \in [1, +\infty[. \end{cases}$$

- Q1. Tracer le graphe représentatif de cette fonction, puis préciser l'ensemble des points de $\mathbb{R}$ où elle est dérivable au sens usuel.
- Q2. Déterminer la dérivée de f au sens des distributions, c'est-à-dire $(T_f)'$.
- Q3. Déterminer ensuite la dérivée seconde de f au sens des distributions, $(T_f)''$.

13 Exercice

Soit $a, b \in \mathbb{R}$. On considère l'opérateur différentiel

$$P : \begin{cases} \mathcal{D}'(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \\ T & \longmapsto & T'' + aT' + b \end{cases}$$

Soit f et g deux fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ telles que

$$f'' + af' + b = g'' + ag' + b = 0,$$

$f(0) = g(0)$ et $f'(0) - g'(0) = 1$. On considère la fonction h définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \leq 0, \\ g(x) & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Soit enfin T la distribution définie par

$$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad T(\varphi) = - \int_{\mathbb{R}} h(x) \varphi(x) dx.$$

Montrer que $PT = \delta_0$, au sens des distributions.

14 Exercice

Calculer les dérivées premières et secondes des distributions suivantes :

Q1. T_f , où pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = |\cos(x)|$.

Q2. T_g où $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est la fonction 2π -périodique telle que $g(x) = x$ pour tout $x \in [0, 2\pi[$.

15 Exercice – Une équation différentielle

Q1. Soit $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Calculer $(xT)'$.

Q2. Résoudre, dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, l'équation différentielle :

$$xT' + T = 0.$$

Convergence des distributions**16 Exercice**

Soit $n \in \mathbb{N}$, on considère la suite réelle $(a_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ telle que $a_n \rightarrow a$. Montrer que

$$\delta_{a_n} \longrightarrow \delta_a \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

17 Exercice

Calculer les limites, dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, des suites de distributions suivantes :

Q1. $A_n = T_{a_n}$ où $a_n : x \mapsto \sin(nx)$.

Q2. $B_n = T_{b_n}$ où $b_n : x \mapsto nf(nx)$ avec $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$.

Q3. $C_n = \frac{1}{n} \sum_{p=0}^{n-1} \delta_{\frac{p}{n}}$.

18 Exercice

Soit la suite (f_n) définie par $f_n(x) = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } |x| \leq \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{si } |x| > \frac{1}{n}. \end{cases}$

Montrer que la suite de distributions (T_{f_n}) converge vers δ_0 .

Indication. On pourra utiliser le théorème de la moyenne pour les intégrales.