Fonctions usuelles

Exponentielle et logarithme

1 EXERCICE ●○○
Rappels du TD2b I

Résoudre les équations suivantes.

1. $\ln(x^2+1)-1=\ln(2x+1)$
2. $\ln(x)+\ln(x+3)=2\ln(2)$
3. $\ln(x)+\ln(x^2-5)=\ln(2)+\ln(x^2-3)$
4. $e^{2x}+e^x-2=0$
5. $e^x-4e^{-x}=1$
6. $(\ln x)^2+3\ln x-4=0$

2 EXERCICE ●○○
Rappels du TD2b II

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

a. $e^x<\frac{1}{4}e^{x^2}$ b. $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\geqslant 1$ c. $\frac{e^x+1}{e^x-1}\leqslant 2$

3 EXERCICE ●●○

Résoudre les équations et inéquations suivantes :

1. $x^{\sqrt{x}}=\sqrt{x^x}$
2. $x^{\frac{\sqrt{2}}{x}}=\sqrt{x}^{\sqrt{x}}$
3. $e^{\ln(|x|)}\geqslant e^{|\ln(x)|}$
4. $x^{\ln(x)}\leqslant x$

4 EXERCICE ●○○
Études de fonctions

Une étude complète d'une fonction consiste à déterminer successivement son domaine de définition, ses variations, ses limites aux bornes du domaine, puis à tracer sa courbe représentative.
Faire l'étude complète des fonctions suivantes :

1. $f:x\mapsto\frac{e^{2x}}{x^2-1}$
2. $g:x\mapsto x^{\frac{1}{x}}$
3. $h:x\mapsto\ln(1+x+x^2)$
4. $k:x\mapsto x^{\ln(x)}$
5. $m:x\mapsto(\ln(x))^{\ln(x)}$
6. $p:x\mapsto x^x$

5 EXERCICE ●●○

Montrer que pour tous $a,b>0$,

$$\tfrac{1}{2}(\ln(a)+\ln(b))\leqslant\ln\left(\tfrac{a+b}{2}\right).$$

6 EXERCICE ●●○

Montrer que pour tout entier $n\geqslant 1$, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\leqslant e$.

7 EXERCICE ●●●

Étudier la fonction $x\mapsto\frac{\ln(x)}{x}$ puis en déduire tous les couples (a,b) d'entiers tels que $2\leqslant a<b$ et $a^b=b^a$.

8 EXERCICE ●●●
Une équation atypique

Soit $\lambda>0$ et $f:x\mapsto e^{\lambda x}$. On considère l'équation

$$(E):e^{\lambda e^{\lambda x}}=x.$$

1. Étudier les variations de f.
2. Soit $x\in\mathbb{R}$. Montrer que x est solution de (E) si et seulement si $f(x)=x$.
3. Étudier les variations de $g:x\mapsto f(x)-x$ et en déduire, selon les valeurs de λ, le nombre de solutions de l'équation (E).

9 EXERCICE ●○○
Calcul de limite

Calculer la limite $\lim\limits_{x\to+\infty}(2^x+3^x)^{\frac{1}{x}}$.

10 EXERCICE ●○○
Une asymptote oblique

Soit f définie par : $f(x)=x+\ln\left(\frac{2x}{x-2}\right)$.
On considère la droite d'équation $\Delta:y=x+\ln 2$ et on pose $g(x)=x+\ln 2$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f.
2. Étudier l'existence d'asymptotes verticales pour f.
3. Montrer que $f-g$ tend vers 0 en l'infini.
4. Déterminer la position relative de la courbe représentative de f par rapport à Δ.

Trigonométrie hyperbolique

11 EXERCICE ●○○
Formules d'addition

Montrer que pour tous $x,y\in\mathbb{R}$,

1. $\mathrm{ch}(x+y)=\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{ch}(y)+\mathrm{sh}(x)\,\mathrm{sh}(y)$
2. $\mathrm{ch}(x-y)=\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{ch}(y)-\mathrm{sh}(x)\,\mathrm{sh}(y)$
3. $\mathrm{sh}(x+y)=\mathrm{sh}(x)\,\mathrm{ch}(y)+\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{sh}(y)$
4. $\mathrm{sh}(x+y)=\mathrm{sh}(x)\,\mathrm{ch}(y)-\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{sh}(y)$

12 | EXERCICE ●●○
Rappels du TD2b III

Résoudre les équations et inéquations suivantes.

1. $\mathrm{ch}(x) = \sqrt{5}$
2. $\mathrm{sh}(x) = \sqrt{35}$
3. $\mathrm{ch}(x) \leqslant \sqrt{26}$
4. $4\,\mathrm{ch}(x) + 3\,\mathrm{sh}(x) = 4$

13 | EXERCICE ●●●

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et x, y deux réels. Calculer les sommes

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{ch}(x+ky) \text{ et } S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{sh}(x+ky).$$

14 | EXERCICE ●●○
Inégalités fondamentales

Établir que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on a $\mathrm{sh}\, x \geqslant x$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{ch}\, x \geqslant 1 + \frac{x^2}{2}$.

15 | EXERCICE ●○○
Tangente hyperbolique

Démontrer que, pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\left(\frac{1+\mathrm{th}(x)}{1-\mathrm{th}(x)}\right)^n = \frac{1+\mathrm{th}(nx)}{1-\mathrm{th}(nx)}.$$

Trigonométrie réciproque

16 | EXERCICE ●●○

Soit f définie par $f(x) = \sin^2(x) + \cos(x)$.

1. Réduire l'intervalle d'étude en étudiant la périodicité et la parité.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variations sur $[0, \pi]$.
4. Tracer la courbe de f.

17 | EXERCICE ●●○
Réduction de domaine

Soit f définie par $f(x) = 2\cos(x) + \sin(2x)$. On souhaite réduire au maximum l'intervalle d'étude de f.

1. Déterminer la périodicité de f.
2. Pour $x \in \mathbb{R}$, calculer $f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ et $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$. En déduire un centre de symétrie de la courbe représentative de f.
3. Montrer qu'on peut réduire l'intervalle d'étude de f à $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.

18 | EXERCICE ●●○

Calculer $\cos(\arctan(x))$ et $\sin(\arctan(x))$ pour tout réel x.

19 | EXERCICE ●●○

Simplifier les expressions suivantes :

1. $\cos(2\arccos x)$
2. $\cos(2\arcsin x)$
3. $\sin(2\arccos x)$
4. $\cos(2\arctan x)$
5. $\sin(2\arctan x)$
6. $\tan(2\arcsin x)$

20 | EXERCICE ●●○

Simplifier l'expression $\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

21 | EXERCICE ●●○

Représenter la fonction

$$f : x \mapsto \arcsin(\sin x) + \arccos(\cos x).$$

22 | EXERCICE ●●○

Représenter la fonction $f : x \mapsto \arctan(\tan x)$.

23 | EXERCICE ●●○

Résoudre l'équation $\arcsin(\sqrt{2}x) = 2\arcsin(x)$.

24 | EXERCICE ●●●

1. Soit $k \in \mathbb{N}$. Exprimer $\arctan(k+1) - \arctan(k)$ à l'aide d'un seul $\arctan$.
2. En déduire une expression simplifiée de la suite $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} \arctan\left(\frac{1}{1+k+k^2}\right)$$

puis sa limite.