

Feuille de TD n°5

Intégrales généralisées

GÉNÉRALITÉS

1 Exercice – Intégrales en vrac

Déterminer la nature des intégrales impropres suivantes :

- | | |
|--|--|
| 1. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ | 7. $\int_0^1 \cos^2\left(\frac{1}{t}\right) dt$ |
| 2. $\int_0^1 \ln(t) dt$ | 8. $\int_0^{+\infty} 1 dx$ |
| 3. $\int_0^{+\infty} \frac{5x^2+3x+1}{3x^4+2x} dx$ | 9. $\int_0^{+\infty} \frac{t}{(1+t^2)^2} dt$ |
| 4. $\int_0^{+\infty} \ln(t) e^{-t} dt$ | 10. $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(t)}{\sqrt{e^t-1}} dt$ |
| 5. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1-x)\sqrt{x}} dx$ | 11. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^2} dt$ |
| 6. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x-1} dx$ | 12. $\int_0^{+\infty} x \sin(x) e^{-x} dx$ |

2 Exercice

Discuter la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$ selon le paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$.

3 Exercice

Discuter la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{t-\sin(t)}{t^\alpha} dt$ selon le paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. (a) Montrer qu'au voisinage de $+\infty$ on a

$$\frac{t-\sin(t)}{t^\alpha} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t^{\alpha-1}}.$$

(b) À quelle condition sur α l'intégrale est-elle convergente au voisinage de $+\infty$?

2. À quelle condition sur α l'intégrale est-elle convergente au voisinage de 0 ?

Indication. On rappelle le $DL_3(0)$ du sinus :

$$\sin(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} t - \frac{t^3}{6} + o(t^3).$$

3. Conclure.

TECHNIQUES D'INTÉGRATION

On fera très attention à la rédaction du changement de variable dans le cadre d'intégrales impropres.

4 Exercice – À propos du sinus cardinal

À l'aide d'une intégration par partie on a montré que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx$ converge.

Cependant on peut montrer que $x \rightarrow \frac{\sin(x)}{x}$ n'est pas intégrable sur $]0; +\infty[$ c'est-à-dire que $\int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx$ ne converge pas.

On rappelle que pour tous réels a et b on a

$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b).$$

1. Soit k un entier naturel. Montrer que

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx \geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_0^\pi |\sin(x)| dx.$$

2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^{(n+1)\pi} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

puis conclure.

5 Exercice – Changements de variable

1. Soit $a > 0$, montrer que l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2} dt$$

converge.

2. À l'aide du changement de variable $u = \frac{1}{t}$, montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt = 0.$$

3. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2} dt = \frac{\pi \ln(a)}{4\sqrt{a}}.$

On utilisera le changement de variable $t = \sqrt{a}u$.