## Exponentielle et logarithme

### 1 EXERCICE ●○○
**Rappels du TD3 I**

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $\ln(x^2+1)-1=\ln(2x+1)$
2. $\ln(x)+\ln(x+3)=2\ln(2)$
3. $\ln(x)+\ln(x^2-5)=\ln(2)+\ln(x^2-3)$
4. $e^{2x}+e^x-2=0$
5. $e^x-4e^{-x}=1$
6. $(\ln x)^2+3\ln x-4=0$

### 2 EXERCICE ●○○
**Rappels du TD3 II**

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

(a) $e^x<\frac{1}{4}e^{x^2}$ (b) $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)\geqslant 1$ (c) $\frac{e^x+1}{e^x-1}\leqslant 2$

### 3 EXERCICE ●○○
**Étude de fonctions I**

Étudier les fonctions

$f:x\mapsto\frac{e^{2x}}{x^2-1}$, $g:x\mapsto x^{\frac{1}{x}}$ et $h:x\mapsto\ln(1+x+x^2)$.

Une étude complète d'une fonction consiste à déterminer successivement son domaine de définition, ses variations, ses limites aux bornes du domaine, puis à tracer sa courbe représentative.

### 4 EXERCICE ●●○

Montrer que pour tous $a,b>0$,

$$\tfrac{1}{2}(\ln(a)+\ln(b))\leqslant\ln\left(\tfrac{a+b}{2}\right).$$

### 5 EXERCICE ●●○

Montrer que pour tout entier $n\geqslant 1$, $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\leqslant e$.

### 6 EXERCICE ●●●

Étudier la fonction $x\mapsto\frac{\ln(x)}{x}$ puis en déduire tous les couples $(a,b)$ d'entiers tels que $2\leqslant a<b$ et $a^b=b^a$.

### 7 EXERCICE ●○○
**Étude de fonctions II**

Faire l'étude complète des fonctions $x\mapsto x^{\ln(x)}$ et $x\mapsto(\ln(x))^{\ln(x)}$.

### 8 EXERCICE ●●●
**Une équation atypique**

Soit $\lambda>0$ et $f:x\mapsto e^{\lambda x}$. On considère l'équation

$$(E):e^{\lambda e^{\lambda x}}=x.$$

1. Étudier les variations de $f$.
2. Soit $x\in\mathbb{R}$. Montrer que $x$ est solution de $(E)$ si et seulement si $f(x)=x$.
3. Étudier les variations de $g:x\mapsto f(x)-x$ et en déduire, selon les valeurs de $\lambda$, le nombre de solutions de l'équation $(E)$.

### 9 EXERCICE ●○○
**Limite et exponentielle**

Calculer la limite $\lim\limits_{x\to+\infty}(2^x+3^x)^{\frac{1}{x}}$.

### 10 EXERCICE ●○○
**Asymptote oblique**

Soit $f$ définie par : $f(x)=x+\ln\left(\frac{2x}{x-2}\right)$.
On considère aussi la droite d'équation $\Delta:y=x+\ln 2$ et on pose $g(x)=x+\ln 2$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de $f$.
2. Étudier l'existence d'asymptotes verticales pour $f$.
3. Montrer que $f-g$ tend vers 0 en l'infini.
4. Déterminer la position relative de la courbe représentative de $f$ par rapport à $\Delta$.

## Fonctions hyperboliques

### 11 EXERCICE ●○○
**C'est à retenir par cœur ?**

Montrer que pour tous $x,y\in\mathbb{R}$,

1. $\mathrm{ch}(x+y)=\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{ch}(y)+\mathrm{sh}(x)\,\mathrm{sh}(y)$
2. $\mathrm{ch}(x-y)=\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{ch}(y)-\mathrm{sh}(x)\,\mathrm{sh}(y)$
3. $\mathrm{sh}(x+y)=\mathrm{sh}(x)\,\mathrm{ch}(y)+\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{sh}(y)$
4. $\mathrm{sh}(x+y)=\mathrm{sh}(x)\,\mathrm{ch}(y)-\mathrm{ch}(x)\,\mathrm{sh}(y)$

### 12 EXERCICE ●●○
**Rappels du TD3 III**

Résoudre les équations et inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $\mathrm{ch}(x)=\sqrt{5}$
2. $\mathrm{sh}(x)=\sqrt{35}$
3. $\mathrm{ch}(x)\leqslant\sqrt{26}$
4. $4\,\mathrm{ch}(x)+3\,\mathrm{sh}(x)=4$

## 13 EXERCICE ●●●

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x, y$ deux réels. Calculer les sommes

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{ch}(x+ky) \text{ et } S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{sh}(x+ky).$$

## 14 EXERCICE ●●○
**Inégalités fondamentales**

Établir que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on a $\operatorname{sh} x \geqslant x$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch} x \geqslant 1 + \frac{x^2}{2}$.

## 15 EXERCICE ●○○
**Tangente hyperbolique**

Démontrer que, pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\left(\frac{1+\operatorname{th}(x)}{1-\operatorname{th}(x)}\right)^n = \frac{1+\operatorname{th}(nx)}{1-\operatorname{th}(nx)}.$$

# Trigonométrie, le retour...

## 16 EXERCICE ●●○

Soit $f$ définie par $f(x) = \sin^2(x) + \cos(x)$.

1. Réduire l'intervalle d'étude en étudiant la périodicité et la parité.
2. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
3. Dresser le tableau de variations sur $[0, \pi]$.
4. Tracer la courbe de $f$.

## 17 EXERCICE ●●●
**Réduction de domaine**

Soit $f$ définie par $f(x) = 2\cos(x) + \sin(2x)$. On souhaite réduire au maximum l'intervalle d'étude de $f$.

1. Déterminer la périodicité de $f$.
2. Pour $x \in \mathbb{R}$, calculer $f\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ et $f\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$. En déduire un centre de symétrie de la courbe représentative de $f$.
3. Montrer qu'on peut réduire l'intervalle d'étude de $f$ à $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$.

## 18 EXERCICE ●●○

Calculer $\cos(\arctan(x))$ et $\sin(\arctan(x))$ pour tout réel $x$.

## 19 EXERCICE ●●○

Simplifier les expressions suivantes :

1. $\cos(2\arccos x)$
2. $\cos(2\arcsin x)$
3. $\sin(2\arccos x)$
4. $\cos(2\arctan x)$
5. $\sin(2\arctan x)$
6. $\tan(2\arcsin x)$

## 20 EXERCICE ●●○

Simplifier l'expression $\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

## 21 EXERCICE ●●○
**Ce n'est pas $2x$**

Représenter la fonction

$$f : x \mapsto \arcsin(\sin x) + \arccos(\cos x).$$

## 22 EXERCICE ●●○
**Ce n'est pas $x$**

Représenter la fonction $f : x \mapsto \arctan(\tan x)$.

## 23 EXERCICE ●●○

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\arcsin(\sqrt{2}x) = 2\arcsin(x)$.