Droites des nombres réels

Manipulation d'inégalités

1 | EXERCICE ●○○

1. Si on veut majorer $a-b$, quelles majorations et/ou minorations cherche-t-on ?
2. Si on veut majorer λa, avec $\lambda<0$. Devons-nous majorer ou minorer a au début du raisonnement ?
3. Comment devons-nous procéder pour majorer un quotient $\frac{a}{b}$?

✎ CORRECTION DE L'EXERCICE 1

1. On majore a et minore b.
2. On minore a.
3. On majore a et on minore b.

2 | EXERCICE ●○○

Soit a, b, a', b' des nombres réels tels que a, $a'\in[1;2]$ et b, $b'\in[-3;-2]$.
Donner un encadrement du quotient $\frac{a+b}{a'b'}$.

✎ CORRECTION DE L'EXERCICE 2

On encadre séparément le numérateur et le dénominateur.

Numérateur. Puisque $a\in[1,2]$ et $b\in[-3,-2]$, on a :

$$-2=1+(-3)\leqslant a+b\leqslant 2+(-2)=0.$$

Dénominateur. Puisque $a'\in[1,2]$ et $b'\in[-3,-2]$, on a $a'b'\in[-6,-2]$. En particulier $a'b'<0$, donc on peut inverser en renversant les inégalités :

$$-\tfrac{1}{2}\leqslant\tfrac{1}{a'b'}\leqslant-\tfrac{1}{6}.$$

Quotient. Comme $a+b\leqslant 0$,

$$-\tfrac{a+b}{6}\leqslant\tfrac{a+b}{a'b'}\leqslant-\tfrac{a+b}{2}.$$

Or, on a les implications $a+b\geqslant-2\implies-\frac{a+b}{2}\leqslant 1$ et $a+b\leqslant 0\implies-\frac{a+b}{6}\geqslant 0$. Ainsi, $0\leqslant\frac{a+b}{a'b'}\leqslant 1$.

3 | EXERCICE ●○○

1. Montrer l'implication

$$\begin{cases}2\leqslant a\leqslant 3\\ 1\leqslant b\leqslant 2\end{cases}\Rightarrow 2\leqslant a^2-\tfrac{2}{b}\leqslant 8.$$

2. Ordonner les nombres x, x^2, $\sqrt{x}$. Cet ordre est-il valable pour tout réel ?
3. Donner deux nombres réels a et b tels que


$$a<b \text{ et } \tfrac{1}{a}<\tfrac{1}{b}.$$

✎ CORRECTION DE L'EXERCICE 3

1. Puisque $2\leqslant a\leqslant 3$, on a $4\leqslant a^2\leqslant 9$.
Puisque $1\leqslant b\leqslant 2$, on a $\frac{1}{2}\leqslant\frac{1}{b}\leqslant 1$, soit $1\leqslant\frac{2}{b}\leqslant 2$.
Alors $4-2\leqslant a^2-\frac{2}{b}\leqslant 9-1$, donc

$$2\leqslant a^2-\tfrac{2}{b}\leqslant 8.$$

2. On compare x, x^2 et $\sqrt{x}$ selon les cas (en supposant $x\geqslant 0$ pour que $\sqrt{x}$ soit défini).



Sur $[0,1]$. On a $x^2\leqslant x\leqslant\sqrt{x}$.
Sur $[1,+\infty[$. On a $\sqrt{x}\leqslant x\leqslant x^2$.

3. Prenons $a=-2$ et $b=-1$. On a bien $a<b$, et :

$$\tfrac{1}{a}=-\tfrac{1}{2}<\tfrac{1}{b}=-1,$$

donc $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$. Cela est possible car a et b sont tous deux négatifs : le passage à l'inverse renverse l'inégalité uniquement lorsque a et b sont de même signe.

4 | EXERCICE ●○○

Montrer que pour tous $x,y\in\mathbb{R}_+$, $\sqrt{xy}\leqslant\frac{x+y}{2}$.

✎ CORRECTION DE L'EXERCICE 4

Soit $x,y\in\mathbb{R}_+$. Puisque $x,y\geqslant 0$, on a $\sqrt{x}$ et $\sqrt{y}$ bien définis, et $(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2\geqslant 0$. En développant :

$$\begin{aligned}(\sqrt{x}-\sqrt{y})^2\geqslant 0 &\iff x-2\sqrt{xy}+y\geqslant 0\\ &\iff \tfrac{x+y}{2}\geqslant\sqrt{xy}.\end{aligned}$$

De plus, l'égalité a lieu si et seulement si $\sqrt{x}=\sqrt{y}$, c'est-à-dire $x=y$.

5 | EXERCICE ●●○

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x(1-x) \leqslant \frac{1}{4}$.
2. Montrer que pour tous réels a, b, c appartenant à $[0;1]$, au moins un des réels $a(1-b)$, $b(1-c)$, $c(1-a)$ est inférieur à $\frac{1}{4}$.

✎ Correction de l'exercice 5

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. On a :
$$\begin{aligned} x(1-x) \leqslant \tfrac{1}{4} &\iff \tfrac{1}{4} - x + x^2 \geqslant 0 \\ &\iff \left(x - \tfrac{1}{2}\right)^2 \geqslant 0, \end{aligned}$$
ce qui est toujours vrai. L'égalité a lieu si et seulement si $x = \frac{1}{2}$.
2. Soit $a, b, c \in [0,1]$. On raisonne par l'absurde en supposant que
$$a(1-b) > \tfrac{1}{4}, \quad b(1-c) > \tfrac{1}{4} \text{ et } c(1-a) > \tfrac{1}{4}.$$
En multipliant ces trois inégalités membre à membre (les trois membres gauches sont positifs) : $a(1-b)b(1-c)c(1-a) > \frac{1}{64}$.
Or, d'après la question précédente appliquée à a, b et c :
$$a(1-a) \leqslant \tfrac{1}{4},\ b(1-b) \leqslant \tfrac{1}{4} \text{ et } c(1-c) \leqslant \tfrac{1}{4},$$
donc :
$$\begin{aligned} &a(1-b)b(1-c)c(1-a) \\ =&a(1-a)b(1-b)c(1-c) \\ \leqslant&\tfrac{1}{64}, \end{aligned}$$
ce qui contredit l'inégalité précédente.
Donc au moins un des trois réels est inférieur ou égal à $\frac{1}{4}$.

Valeur absolue

6 | Exercice ●○○

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $|x+1| = |2x-3|$
2. $|x+1| = 2x+1$
3. $|x| + |x+1| = 2$
4. $|2x+4| = -1$

✎ Correction de l'exercice 6

1. On distingue les cas selon le signe de $x+1$ et $2x-3$.
   - ▷ Si $x \in]-\infty, -1[$: $-(x+1) = -(2x-3)$, soit $-x-1 = -2x+3$, donc $x = 4$. Hors du domaine, pas de solution.
   - ▷ Si $x \in \left[-1, \frac{3}{2}\right[$: $x+1 = -(2x-3)$, soit $x+1 = -2x+3$, donc $3x = 2$, soit $x = \frac{2}{3}$. Valide.
   - ▷ Si $x \in \left[\frac{3}{2}, +\infty\right[$: $x+1 = 2x-3$, donc $x = 4$. Valide.

   L'ensemble solution est $\mathcal{S} = \left\{\frac{2}{3}, 4\right\}$.
2. On distingue les cas selon le signe de $x+1$.
   - ▷ Si $x \in]-\infty, -1[$: $-(x+1) = 2x+1$, soit $-3x = 2$, donc $x = -\frac{2}{3}$. Hors du domaine, pas de solution.
   - ▷ Si $x \in [-1, +\infty[$: $x+1 = 2x+1$, donc $x = 0$. Valide.

   L'ensemble solution est $\mathcal{S} = \{0\}$.
3. On distingue les cas selon le signe de x et $x+1$.
   - ▷ Si $x \in]-\infty, -1[$: $-x-(x+1) = 2$, soit $-2x-1 = 2$, donc $x = -\frac{3}{2}$. Valide.
   - ▷ Si $x \in [-1, 0[$: $-x+(x+1) = 2$, soit $1 = 2$. Pas de solution.
   - ▷ Si $x \in [0, +\infty[$: $x+(x+1) = 2$, soit $2x = 1$, donc $x = \frac{1}{2}$. Valide.

   L'ensemble solution est $\mathcal{S} = \left\{-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\}$.
4. Une valeur absolue est toujours positive, donc l'équation n'a pas de solution : $\mathcal{S} = \emptyset$.

7 | Exercice ●○○

Une inégalité fondamentale

Montrer que pour tous réels a et b on a l'inégalité
$$|ab| \leqslant \tfrac{1}{2}(a^2 + b^2).$$
À quelle condition nécessaire et suffisante a-t-on l'égalité ?

✎ Correction de l'exercice 7

Soit $a, b \in \mathbb{R}$. On a $(|a| - |b|)^2 \geqslant 0$, soit :
$$a^2 - 2|ab| + b^2 \geqslant 0 \iff \tfrac{a^2+b^2}{2} \geqslant |ab|.$$
L'égalité a lieu si et seulement si $|a| = |b|$.

8 | Exercice ●○○

Inégalité triangulaire

Soit a et b deux nombres réels vérifiant
$$2 \leqslant |a| \leqslant 4 \text{ et } 5 \leqslant |b| \leqslant 6.$$
Encadrer $|a+b|$, $|a+2b|$ et $|a-2b|$.

✎ Correction de l'exercice 8

On sait que $2 \leqslant |a| \leqslant 4$ et $5 \leqslant |b| \leqslant 6$. Par l'inégalité triangulaire et son inégalité réciproque, on a
$$\big||a| - |b|\big| \leqslant |a+b| \leqslant |a| + |b|.$$

Encadrement de $|a+b|$.
On a $|a| + |b| \leqslant 4 + 6 = 10$.
De plus, comme $-4 \leqslant |a| - |b| \leqslant -1$, par décroissance de la valeur absolue sur $]-\infty; 0]$, on a $||a| - |b|| \geqslant 1$. Ainsi,
$$1 \leqslant |a| + |b| \leqslant 10.$$

Encadrement de $|a+2b|$. On a $10 \leqslant 2|b| \leqslant 12$, donc :

$$|a+2b| \leqslant |a| + 2|b| \leqslant 4 + 12 = 16.$$

De plus, comme $-10 \leqslant |a| - 2|b| \leqslant -6$, par décroissance de la valeur absolue sur $]-\infty, 0]$, on a $||a| - 2|b|| \geqslant 6$. Donc

$$6 \leqslant |a+2b| \leqslant 16.$$

Encadrement de $|a-2b|$. Même raisonnement que pour $|a+2b|$. Donc $6 \leqslant |a-2b| \leqslant 16$.

9 | EXERCICE ●●○

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation

$$\left|x^2 - 2x + 1\right| + |x+1| \leqslant |x-2|.$$

✎ CORRECTION DE L'EXERCICE 9

On remarque que $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \geqslant 0$, donc $|x^2 - 2x + 1| = (x-1)^2$. Les autres expressions changent de signe en $x = -1$ et $x = 2$. On étudie trois cas.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	

Cas 1 : $x \in]-\infty, -1]$. L'inéquation devient :

$$\begin{aligned}
&(x-1)^2 + (-(x+1)) \leqslant -(x-2) \\
\iff &x^2 - 2x + 1 - x - 1 \leqslant -x + 2 \\
\iff &x^2 - 2x \leqslant 2 \\
\iff &x^2 - 2x - 2 \leqslant 0.
\end{aligned}$$

Les racines de $x^2 - 2x - 2 = 0$ sont $x_{-,+} = 1 \pm \sqrt{3}$. Tableau de signes :

x	$-\infty$		-1		x_-		x_+		$+\infty$
x^2-2x-2		$+$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Sur $]-\infty, -1]$, on a $x^2 - 2x - 2 > 0$.
Pas de solution sur ce cas.

Cas 2 : $x \in [-1, 2]$. L'inéquation devient :

$$\begin{aligned}
&(x-1)^2 + (x+1) \leqslant -(x-2) \\
\iff &x^2 - 2x + 1 + x + 1 \leqslant -x + 2 \\
\iff &x^2 \leqslant 0.
\end{aligned}$$

On a $x^2 \leqslant 0$ si et seulement si $x = 0$, qui appartient à $[-1, 2]$. Solution : $x = 0$.

Cas 3 : $x \in [2, +\infty[$. L'inéquation devient :

$$\begin{aligned}
&(x-1)^2 + (x+1) \leqslant x - 2 \\
\iff &x^2 - 2x + 1 + x + 1 \leqslant x - 2 \\
\iff &x^2 - 2x + 4 \leqslant 0.
\end{aligned}$$

Le discriminant est $\Delta = 4 - 16 = -12 < 0$, donc $x^2 - 2x + 4 > 0$ pour tout x. Pas de solution sur ce cas.
Conclusion. L'ensemble solution est $\mathcal{S} = \{0\}$.

Partie entière

10 | EXERCICE ●●○

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer $\lfloor \sqrt{n^2 + 3n + 4} \rfloor$.

✎ CORRECTION DE L'EXERCICE 10

Soit $n \geqslant 1$. On a $n^2 + 2n + 1 < n^2 + 3n + 4 < n^2 + 4n + 4$, soit :

$$(n+1)^2 < n^2 + 3n + 4 < (n+2)^2,$$

donc $n+1 < \sqrt{n^2 + 3n + 4} < n+2$, ainsi $\lfloor \sqrt{n^2 + 3n + 4} \rfloor = n + 1$.
Si $n = 0$, alors $\sqrt{n^2 + 3n + 4} = \sqrt{4} = 2$, donc $\lfloor \sqrt{4} \rfloor = 2$.

11 | EXERCICE ●●○

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\lfloor \sqrt{x^2 + 1} \rfloor = 2$.

✎ CORRECTION DE L'EXERCICE 11

$\lfloor \sqrt{x^2+1} \rfloor = 2$ équivaut à $2 \leqslant \sqrt{x^2+1} < 3$. Par stricte croissance de la fonction carrée sur $\mathbb{R}_+$:

$$4 \leqslant x^2 + 1 < 9 \iff 3 \leqslant x^2 < 8.$$

On a donc deux inéquations à résoudre : $x^2 \geqslant 3$ et $x^2 < 8$. L'ensemble solution est :

$$\mathcal{S} = \left[-2\sqrt{2},\ -\sqrt{3}\right] \cup \left[\sqrt{3},\ 2\sqrt{2}\right[.$$

12 | EXERCICE ●●○

Montrer que pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$,

$$\left\lfloor \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor.$$

✎ CORRECTION DE L'EXERCICE 12

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned}
\lfloor x \rfloor \leqslant x < \lfloor x \rfloor + 1 &\implies n\lfloor x \rfloor \leqslant nx < n\lfloor x \rfloor + n \\
&\implies n\lfloor x \rfloor \leqslant \lfloor nx \rfloor < n\lfloor x \rfloor + n \\
&\implies \lfloor x \rfloor \leqslant \tfrac{\lfloor nx \rfloor}{n} < \lfloor x \rfloor + 1 \\
&\implies \left\lfloor \tfrac{\lfloor nx \rfloor}{n} \right\rfloor = \lfloor x \rfloor.
\end{aligned}$$

13 | EXERCICE ●●○

Soit x un réel. On définit la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ par

$$u_n = \frac{\lfloor x\rfloor+\lfloor 2x\rfloor+\cdots+\lfloor nx\rfloor}{n^2}.$$

Donner un encadrement simple de la suite (u_n) puis en déduire sa limite.

✎ CORRECTION DE L'EXERCICE 13

Soit $x\in\mathbb{R}$ et $n\in\mathbb{N}^*$. Pour $1\leqslant k\leqslant n$, on a

$$kx-1<\lfloor kx\rfloor\leqslant kx.$$

En sommant pour k de 1 à n :

$$\sum_{k=1}^{n}(kx-1)<\sum_{k=1}^{n}\lfloor kx\rfloor\leqslant\sum_{k=1}^{n}kx,$$

soit $\frac{n(n+1)x}{2}-n<\sum_{k=1}^{n}\lfloor kx\rfloor\leqslant\frac{n(n+1)x}{2}$.
En divisant par n^2 : $\frac{(n+1)x}{2n}-\frac{1}{n}<u_n\leqslant\frac{(n+1)x}{2n}$.
Les deux membres tendent vers $\frac{x}{2}$.
D'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\frac{x}{2}$.

14 | EXERCICE ●●○

Montrer que pour tous $x,y\in\mathbb{R}$, $\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor\leqslant\lfloor x+y\rfloor$.

✎ CORRECTION DE L'EXERCICE 14

Soit $x,y\in\mathbb{R}$. On a $\lfloor x\rfloor\leqslant x$ et $\lfloor y\rfloor\leqslant y$, donc $\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor\leqslant x+y$. Ainsi, $\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor$ est un entier inférieur ou égal à $x+y$. Comme $\lfloor x+y\rfloor$ est le plus grand entier inférieur ou égal à $x+y$, on a :

$$\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor\leqslant\lfloor x+y\rfloor.$$

Partie fractionnaire

Pour tout $x\in\mathbb{R}$, on définit la partie fractionnaire de x, notée $\{x\}$, par

$$\{x\}=x-\lfloor x\rfloor.$$

15 | EXERCICE ●○○

Montrer que pour tout $x\in\mathbb{R}$,

$$0\leqslant\{x\}<1.$$

Déterminer le cas d'égalité dans l'inégalité de gauche.

✎ CORRECTION DE L'EXERCICE 15

Soit $x\in\mathbb{R}$. Par définition de la partie entière :

$$\lfloor x\rfloor\leqslant x<\lfloor x\rfloor+1$$

En retranchant $\lfloor x\rfloor$:

$$0\leqslant x-\lfloor x\rfloor<1\qquad\text{soit}\qquad 0\leqslant\{x\}<1$$

Cas d'égalité.

- ▷ Si $\{x\}=0$, alors $x=\lfloor x\rfloor\in\mathbb{Z}$.
- ▷ Réciproquement, si $x\in\mathbb{Z}$, alors x est le plus grand entier inférieur ou égal à x, donc $\lfloor x\rfloor=x$ et $\{x\}=0$.

Ainsi, $\{x\}=0$ si, et seulement si, $x\in\mathbb{Z}$.

16 | EXERCICE ●○○

k-périodicité de la partie fractionnaire

Montrer que pour tous $x\in\mathbb{R}$ et $k\in\mathbb{Z}$,

$$\{x+k\}=\{x\}.$$

✎ CORRECTION DE L'EXERCICE 16

Soit $x\in\mathbb{R}$ et $k\in\mathbb{Z}$. On a :

$$\begin{aligned}\{x+k\}&=x+k-\lfloor x+k\rfloor\\&=x+k-\lfloor x\rfloor-k\\&=x-\lfloor x\rfloor\\&=\{x\}.\end{aligned}$$

17 | EXERCICE ●●●

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\{x\}=\{x^2\}$.

✎ CORRECTION DE L'EXERCICE 17

On procède par analyse-synthèse.

Analyse.
L'équation $\{x\}=\{x^2\}$ s'écrit $x-\lfloor x\rfloor=x^2-\lfloor x^2\rfloor$, soit $x^2-x=\lfloor x^2\rfloor-\lfloor x\rfloor\in\mathbb{Z}$. Ainsi il existe $k\in\mathbb{Z}$ tel que $x^2-x-k=0$.
Le discriminant est $\Delta=1+4k\geqslant 0$, soit $k\geqslant 0$ puisque $k\in\mathbb{Z}$. Donc toute solution est de la forme :

$$x=\frac{1\pm\sqrt{1+4k}}{2},\quad k\in\mathbb{N}.$$

Ainsi $\mathcal{S}\subseteq\left\{\frac{1\pm\sqrt{1+4k}}{2},\ k\in\mathbb{N}\right\}$, mais la réciproque n'est pas immédiate.

Synthèse.
Réciproquement, si $x=\frac{1\pm\sqrt{1+4k}}{2}$ pour un certain $k\in\mathbb{N}$, alors $x^2-x=k\in\mathbb{Z}$, donc $\{x^2\}=\{x+k\}=\{x\}$.

Conclusion.

$$\mathcal{S}=\left\{\frac{1\pm\sqrt{1+4k}}{2},\ k\in\mathbb{N}\right\}.$$