

Feuille de TD n°12

Continuité

Limites de fonctions

1 Exercice – Limites en vrac ★★★

Calculer lorsqu'elles existent les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1+x^2}}{x}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2|x|}{x}$
3. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2}$
4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos(x)}{x + \sin(x)}$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 e^{-x^2}$
6. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2(x)}{1 + \cos(x)}$
7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 2|x|}{x}$
8. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$
9. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + x + 5}{5x^3 + 7x^2 + 8}$
10. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 2x} - x$

2 Exercice – Fonction périodique ★★★

Soit f une fonction T -périodique définie sur $\mathbb{R}$ possédant une limite finie en $+\infty$.

Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, f(x) = f(x + nT)$. En déduire que f est constante.

3 Exercice – Limite et partie entière I ★★★

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - [x]$. Montrer que f n'admet pas de limite en $+\infty$.

4 Exercice – Limite et partie entière II ★★★

Étudier les limites à droite en 0 des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor, \quad g : x \mapsto x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \quad \text{et} \quad h : x \mapsto x^2 \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor.$$

5 Exercice ★★★

Montrer que la fonction $x \mapsto \cos(x) + \sin(x)$ n'admet pas de limite en $+\infty$.

Continuité

6 Exercice ★★★

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$ et la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x} + b & \text{si } x \neq 0, \\ c & \text{si } x = 0, \end{cases}$$

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur a, b et c pour que f soit continue en 0.

7 Exercice – Partie entière I ★★★

Soit f la fonction définie par $f(x) = [x] + \sqrt{x - [x]}$.

1. Justifier que f est définie sur $\mathbb{R}$.

2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$.

3. On veut montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

- (a) Montrer que f est continue en 0.

- (b) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x+1) = f(x) + 1.$$

En déduire que f est continue sur $\mathbb{Z}$.

- (c) Conclure.

8 Exercice – Partie entière II ★★★

Soit f la fonction définie par $f(x) = x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$. Montrer que f n'est pas continue en 1.

Indication. On pourra s'aider de la suite $(1 + \frac{1}{n})_{n \geq 1}$.

9 Exercice – Prolongement continu I ★★★

La fonction $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ peut-elle être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$?

$$x \mapsto e^{-\frac{1}{x^2}}$$

10 Exercice – Prolongement continu II ★★★

La fonction $f : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R}$ peut-elle être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$?

$$x \mapsto \frac{1+x}{x^3+1}$$

11 Exercice – Prolongement continu III ★★★

La fonction $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ peut-elle être prolongée par continuité à $\mathbb{R}$?

$$x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

12 Exercice – Équation fonctionnelle I ★★★

On veut résoudre l'équation fonctionnelle de Cauchy : on cherche à déterminer toutes les fonctions continues $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x+y) = f(x) + f(y)$$

1. Montrer que les fonctions linéaires vérifient cette propriété.
2. Soit $r \in \mathbb{Q}$ et $x \in \mathbb{R}$. Montrer que $f(rx) = rf(x)$.
3. En déduire que pour tout $v \in \mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f(vx) = vf(x)$.
4. Conclure.

13 Exercice ★★★

Soit $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ une fonction continue. Montrer que f admet au moins un point fixe.

14 Exercice – Équation fonctionnelle II ★★★

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(0) = 1$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x)^2 = 1$.

1. Donner un exemple de fonction non constante vérifiant les hypothèses ci-dessus.
2. On suppose de plus que f est continue sur $\mathbb{R}$.
En raisonnant par l'absurde, montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = 1$.

15 Exercice – Équation fonctionnelle III ★★★

On cherche à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues en 0 telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = f(x)$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, $f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f(x)$.
Conclure.

16 Exercice ★★★

Soit f une fonction continue sur $\mathbb{R}$ qui admet des limites finies en $-\infty$ et $+\infty$. Montrer que f est bornée.

17 Exercice – Nulle sur les rationnels ★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui s'annule en tout point de $\mathbb{Q}$. Montrer que f est identiquement nulle.

18 Exercice – Composées bornées ★★★

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ sont des fonctions bornées.

19 Exercice ★★★

Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue qui ne s'annule pas. Montrer que f est de signe constant.

20 Exercice – Suite définie implicitement ★★★

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $f_n : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f_n(x) = x + \ln(x) - n = 0$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution x_n dans $\mathbb{R}_+^*$.
2. Étudier les variations des fonction f_n sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
4. Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

21 Exercice – Fonction lipschitzienne ★★★

Soit I un intervalle et $k > 0$. On dit qu'une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est k -lipschitzienne si :

$$\forall x, y \in I, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

Montrer qu'une fonction lipschitzienne sur un intervalle I est continue.

22 Exercice – Suite récurrente ★★★

Soit $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ une fonction k -lipschitzienne avec $k \in]0; 1[$.

1. Montrer que f admet un **unique** point fixe.
2. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par
$$\begin{cases} u_0 \in [0; 1] \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}.$$

Montrer que (u_n) converge vers ce point fixe.

23 Exercice ★★★

Soit f une fonction continue sur un intervalle I . On suppose que I est stable par f et que $f \circ f$ possède un point fixe. Montrer que f en possède un aussi.