

绝密 * 启用前

2017 年全国硕士研究生入学统一考试

超 越 考 研
数学（三）模拟（一）

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在答题纸指定位置上填写考生姓名、报考单位和考生编号。
2. 答案必须书写在答题纸指定位置的边框区域内，写在其他地方无效。
3. 填（书）写必须使用蓝（黑）色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔。
4. 考试结束，将答题纸和试题一并装入试题袋中交回。

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合要求的。请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上。

(1) 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处连续，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - xf(x)}{\ln(1+x^2)} = 0$ ，则 ()。

- (A) $f(x)$ 在点 $x=0$ 处不可导 (B) $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导且 $f'(0)=0$
 (C) $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导且 $f'(0)=\frac{1}{2}$ (D) $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导且 $f'(0)=-\frac{1}{2}$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 [\int_x^1 [f(t) + f(x)] dt] dx = ()$ 。

- (A) $\int_0^1 f(x) dx$ (B) $\int_0^1 xf(x) dx$ (C) $\int_0^1 (1-x)f(x) dx$ (D) $\int_0^1 (1-xf(x)) dx$

(3) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，记 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, n=1, 2, \dots$ ， θ 为常数，且 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ ，则

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n \sin^n \theta$ ()。

- (A) 发散 (B) 条件收敛 (C) 绝对收敛 (D) 敛散性不定

(4) 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{x^2 + y^2} \sin(x^2 + y^2), & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 则下列说法正确的是 ()。

- (A) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续，且偏导数 $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 均不存在
 (B) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续，且偏导数 $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 均存在
 (C) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续，但偏导数 $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 均存在
 (D) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微

(5) 已知三阶矩阵 A 满足 $A^2 = E$ ，但 $A \neq \pm E$ ，则下列关系式成立的是 ()。

- (A) $r(A+E)=1$ (B) $r(A+E)=2$
 (C) $r(A-E) \cdot [r(A-E)-2]=0$ (D) $[r(A+E)-1] \cdot [r(A-E)-1]=0$

(6) 设三阶矩阵 A 的特征值为 $0, 1, -1$ ，则下列结论中正确的个数为 ()。

- ① A 不可逆； ② A 的主对角线元素之和为 0 ；
 ③ A 的特征值 $1, -1$ 所对应的特征向量正交； ④ $Ax=0$ 的基础解系中含有两个解向量。

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(7) 设 A, B, C 为三个随机事件，则 $\overline{A \cup B - A \cup C} = ()$ 。

- (A) $\overline{B} \cup C$ (B) $\overline{A}(\overline{B} \cup C)$ (C) $\overline{A} \overline{B} \cup C$ (D) $A \cup \overline{B} \cup C$

(8) 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(1, 2; 1, 4; \frac{1}{2})$, 且 $P\{aX + bY < 1\} = \frac{1}{2}$, $\text{Cov}(X, aX + bY) = 0$, 则 ().

- (A) $a = -1, b = 1$ (B) $a = 1, b = 1$ (C) $a = 0, b = \frac{1}{2}$ (D) $a = 3, b = -1$

二、填空题: 9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(9) 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某个邻域内二阶可导, 其反函数为 $y = \varphi(x)$, 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + x - 1}{x^2} = 1$, 则 $\varphi''(1) =$ _____.

(10) 设函数 $f(x) = \begin{cases} (x+1)^2, & x \leq 0, \\ e^{-x^2}, & x > 0, \end{cases}$ 则曲线 $y = \int_0^x f(t)dt$ 的拐点个数为 _____.

(11) 设方程 $f(u^2 - x^2, u^2 - y^2, u^2 - z^2) = 0$ 确定了 u 为 x, y, z 的非零函数, 其中 f 为可微函数, 且 $f'_1 + f'_2 + f'_3 \neq 0$, 则当 $xyz \neq 0$ 时, $\frac{u}{x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{u}{y} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{u}{z} \frac{\partial u}{\partial z} =$ _____.

(12) 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则将极坐标下二次积分

$$\int_0^{\frac{\pi}{6}} d\theta \int_0^1 f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{2 \sin \theta}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

化为直角坐标系下的二次积分为 _____.

(13) 设 A 是三阶实对称矩阵, 若存在正交阵 $Q = (q_1, q_2, q_3)$, 使得 $Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 3 & \\ & & 4 \end{pmatrix}$, 则 $A - q_1 q_1^T$

的特征值是 _____.

(14) 设随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$, $g(x)$ 为单调递减函数, 其反函数为 $g^{-1}(x)$, 则 $Y = g(X)$ 的分布函数 $F_Y(y) =$ _____.

三、解答题: 15~23 小题, 共 94 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15) (本题满分 10 分) (I) 当 $x > 0$ 时, 证明: $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$;

(II) 利用 (I) 的结论, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n^2})(1 + \frac{2}{n^2}) \cdots (1 + \frac{n}{n^2})$.

(16) (本题满分 10 分) (I) 如果 $y = xe^x$ 为微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的解, 求常数 p, q ;

(II) 求微分方程 $y'' + py' + qy = xe^{\lambda x}$ 的通解, 其中 λ 为常数.

(17) (本题满分 10 分) 求函数 $z = f(x, y) = 3xy - 7x - 3y$ 在由抛物线 $y = 5 - x^2$ 与直线 $y = 1$ 所围成的有界闭区域 D 上的最大值与最小值.

(18) (本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'(a)(b-a) < f(b) - f(a) < 2[f(\frac{a+b}{2}) - f(a)]$

(I) 记 $F(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, 证明存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $F(x_0) = 0$;

(II) 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{\xi - a}$.

(19) (本题满分 10 分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} xy^2, & x^2 + y^2 \geq 2y, \\ \sqrt{x^2 + y^2}, & \text{其他}, \end{cases} D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, x \leq y \leq 2\}$,

求 $I = \iint_D f(x, y) d\sigma$.

(20) (本题满分 11 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & 1 \\ a+1 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & 0 \\ a & a \end{pmatrix}$, 且 $a \neq b$. 讨论 a 与 b 取何值时, 矩阵方程 $AX = B$ 有解? 在 $AX = B$ 有解时, 求其解.

(21) (本题满分 11 分) 设 A, B, C 均为三阶矩阵, 且 $AB = -B$, $CA^T = C$. 其中 $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$,

$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. (I) 求 A ; (II) 证明对任意的 3 维列向量 ξ , 必有 $A^{100}\xi = \xi$.

(22) (本题满分 11 分) 在区间 $[0, 3]$ 上随机地取一个实数 X . 若 $0 \leq X \leq 1$, 则随机变量 Y 在 $[0, X]$ 上服从均匀分布, 若 $1 < X \leq 3$, 则 Y 在 $[X, 3]$ 上服从均匀分布, (I) 求 (X, Y) 的概率密度函数 $f(x, y)$; (II) 求 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

(23) (本题满分 11 分) 设总体 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < 0 \text{ 或 } y < 0, \\ p(1 - e^{-\lambda y^2}), & 0 \leq x < 1, y \geq 0, \\ 1 - e^{-\lambda y^2}, & x \geq 1, y \geq 0. \end{cases}$

其中 p, λ 为未知参数, 且 $0 < p < 1, \lambda > 0$. (I) 分别求 X 和 Y 的概率分布;

(II) 利用来自总体 X 的简单随机样本 (X_1, X_2, \dots, X_n) , 求 p 的矩估计量 \hat{p}_M ;

(III) 利用来自总体 Y 的简单随机样本 (Y_1, Y_2, \dots, Y_n) , 求 λ 的极大似然估计量 $\hat{\lambda}_L$.

绝密 * 启用前

2017 年全国硕士研究生入学统一考试

超 越 考 研
数学（三）模拟（二）

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在答题纸指定位置上填写考生姓名、报考单位和考生编号。
2. 答案必须书写在答题纸指定位置的边框区域内，写在其他地方无效。
3. 填（书）写必须使用蓝（黑）色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔。
4. 考试结束，将答题纸和试题一并装入试题袋中交回。

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合要求的。请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上。

(1) 设有曲线 $y = e^{\frac{1}{x}} \arctan \frac{|x|}{x-1}$ ，则下列结论不正确的是 ()。

(A) 曲线有水平渐近线 $y = \frac{\pi}{4}$

(B) 曲线有水平渐近线 $y = -\frac{\pi}{4}$

(C) 曲线有铅直渐近线 $x = 0$

(D) 曲线有铅直渐近线 $x = 1$

(2) 当 $0 < a < \frac{1}{2e}$ 时，方程 $ax^2 = \ln x$ 的实根个数为 ()。

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

(3) 设区域 D 是由直线 $x = \frac{\pi}{4}$, $y = -1$ 及曲线 $y = \tan x$ 所围成， D_1 是 D 位于第三象限的部分，则

$$\iint_D (xy + x \tan xy) dx dy = ()。$$

(A) $2 \iint_{D_1} xy dx dy$

(B) $2 \iint_{D_1} x \tan xy dx dy$

(C) $4 \iint_{D_1} (xy + x \tan xy) dx dy$

(D) 0

(4) 设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续，且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$ ，则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()。

(A) 可微且必取极值

(B) 可微但未必取极值

(C) 不可微但必取极值

(D) 不可微但未必取极值

(5) 设 A 为 n 阶方阵，将 A 的第二行加到第一行，再将第二列减去第一列得到矩阵 B ，则 A, B ()。

(A) 等价未必相似

(B) 等价且相似

(C) 行向量组等价

(D) 列向量组等价

(6) 设 A 为四阶实对称矩阵，其特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 2$, $\lambda_4 = 3$ ，相应的特征向量依次为

p_1, p_2, p_3, p_4 ，且 p_1, p_2 线性无关，令 $P = (4p_4, 5p_3, p_1 + p_2, p_1 - p_2)$ ，则 $P^{-1}AP = ()$ 。

(A) $\begin{pmatrix} 4 & & & \\ & 5 & & \\ & & 2 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 4 & & & \\ & 5 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 2 & \\ & & & 3 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 3 & & & \\ & 2 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$

(7) 设随机变量 X 和 Y 的概率分布分别为 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix}$, $Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}$, 且 X 与 Y 不相关,

则随机事件 $\{X=0\}$ 与 $\{Y=-1\}$ ().

- (A) 互不相容 (B) 相互对立 (C) 相互独立 (D) 不相互独立

(8) 设随机变量 (X, Y) 在区域 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上服从均匀分布, $Z = \begin{cases} 1, & X+Y \leq 1, \\ X+Y, & X+Y > 1, \end{cases}$ 则

$EZ = ()$.

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) 1 (D) $\frac{7}{6}$

二、填空题:9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(9) 设函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$, 其中 $z = z(x, y)$ 由方程 $xz + e^{yz} = e - 1$ 所确定, 则 $du|_{(-1,1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(10) 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(x) + \frac{2x}{x^2+1} \int_0^x f(t)dt = 1$, 则 $\int_0^1 f(x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(11) 设函数 $\varphi(x) = \int_0^x \frac{\ln(1-t)}{t} dt$, 则 $\varphi(x) + \varphi(-x) - \frac{1}{2}\varphi(x^2) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(12) 利用变换 $u = x, v = \frac{y}{x}$, 可把方程 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$ 化为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(13) 设 A 为四阶实对称阵, $r(A - 4E) = 1$, A 的各行元素之和为 0, 则 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(14) 设随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从参数为 1 的指数分布, 则 $P\{XY - X - Y < -1\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题:15~23 小题, 共 94 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15) (本题满分 10 分) 设函数 $z = f(x-y, f(x, y))$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 且 f 在点 $(1, 1)$

处取得极小值 $f(1, 1) = 0$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,1)}$.

(16) (本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义. (I) 若 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 并取得最值, 证明 $f'(x_0) = 0$; (II) 若 $f(x)$ 为周期 $T (T > 0)$ 的可导周期函数, 证明存在 $\xi_1, \xi_2 \in [0, T), \xi_1 \neq \xi_2$, 使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$.

(17) (本题满分10分) 在抛物线 $y=1-x^2$ 上求一点 $P(x_0, y_0)$ ($0 < x_0 < 1$), 使抛物线与它在 P 点处的切线及两个坐标轴所围图形的面积最小, 并求最小面积.

(18) (本题满分10分) 计算二重积分 $\iint_D [xy + (x^2 + y^2)^{-\frac{5}{2}}] d\sigma$, 其中 D 是由直线 $y=x$, $y=1$ 及圆弧 $x^2 + y^2 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 所围成的区域.

(19) (本题满分10分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1) \cdot 2^n} (x-1)^n$ 的收敛域及和函数.

(20) (本题满分11分) 设 A 为三阶实方阵, 三维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 满足 $A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2$, $A\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_3 = \alpha_3$, $\alpha_3 \neq 0$, (I) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; (II) 证明 A 必不为实对称矩阵.

(21) (本题满分11分) 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1}A^*P$, 其中 E 为三阶单位阵,

A^* 为 A 的伴随矩阵, 求 B^T 的特征值与特征向量.

(22) (本题满分11分) 设随机变量 X 和 Y 相互独立且同分布, X 的分布律为

$$P\{X=k\} = p(1-p)^{k-1}, \quad k=1, 2, \dots,$$

(I) 求已知 $X+Y=n$ ($n \geq 2$) 条件下, X 的分布律; (II) 求 $P\{X+Y \geq n\}$ ($n \geq 2$).

(23) (本题满分11分) 设 (X_1, X_2, \dots, X_9) 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, \bar{X} 和 S^2 分

别表示样本均值和样本方差. (I) 判断统计量 $\frac{9\bar{X}^2}{S^2}$ 服从什么分布, 并说明理由. (II) 求 $E[(\bar{X}S^2)^2]$.

绝密 * 启用前

2017 年全国硕士研究生入学统一考试

超 越 考 研
数学（三）模拟（三）

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在答题纸指定位置上填写考生姓名、报考单位和考生编号。
2. 答案必须书写在答题纸指定位置的边框区域内，写在其他地方无效。
3. 填（书）写必须使用蓝（黑）色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔。
4. 考试结束，将答题纸和试题一并装入试题袋中交回。

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合要求的。请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上。

(1) 设函数 $y = f(x)$ 在点 $x = 0$ 处的增量 Δy 满足 $\Delta y = 1 - e^{2\Delta x} + \Delta x \sin \Delta x$ ，则当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时， Δy 是 $dy|_{x=0}$ 的 ()。

- (A) 等价无穷小 (B) 同阶但不等价的无穷小 (C) 高阶无穷小 (D) 低阶无穷小

(2) 关于定积分的如下结论

① $\int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)} dx = \frac{a}{2}$ ，其中 $f(x)$ 为正值连续函数， $a > 0$ ；

② $\int_0^1 \sqrt[3]{1-x^5} dx = \int_0^1 \sqrt[5]{1-x^3} dx$ ，

则有 ()。

- (A) ①②均正确 (B) ①②均不正确 (C) ①正确，②不正确 (D) ①不正确，②正确

(3) 设有无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ，则下列结论正确的是 ()。

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 中至少有一个收敛

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 1$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 中至少有一个发散

(C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛可推出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

(D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散可推出 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散

(4) 设 $I_1 = \iint_D (\sin^2 x + \cos^2 y) d\sigma$ ， $I_2 = \iint_D (\sin x^2 + \cos y^2) d\sigma$ ， $I_3 = \iint_D (\sin^2 x + \cos y^2) d\sigma$ ，其

中 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ ，则 I_1, I_2, I_3 三者的大小关系为 ()。

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$ (B) $I_3 < I_2 < I_1$ (C) $I_1 < I_3 < I_2$ (D) $I_2 < I_3 < I_1$

(5) 齐次线性方程组 $Bx = 0$ 的解都是 $Ax = 0$ 的解的一个充分条件为 ()。

- (A) B 的列向量都由 A 的列向量线性表示 (B) A 的列向量都由 B 的列向量线性表示
(C) B 的行向量都由 A 的行向量线性表示 (D) A 的行向量都由 B 的行向量线性表示

超 越 考 研

(6) 设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T$, $\beta = (b_1, b_2, b_3)^T$, α, β 线性无关, 则二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)(b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)$$

的规范型为 ().

- (A) y_1^2 (B) $y_1^2 + y_2^2$ (C) $y_1^2 - y_2^2$ (D) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

(7) 设 $n (n > 3)$ 个乒乓球中有 3 只黄球, $n-3$ 只白球, 将其随机放入编号为 $1, 2, \dots, n$ 的 n 个盒子中, 一个盒子放入一个球. 现从第 1 号盒子开始逐个打开, 直到出现两个黄球为止. 记 X 为所打开的盒子数, 则 $EX = ()$.

- (A) $\frac{n-2}{2}$ (B) $\frac{n-1}{2}$ (C) $\frac{n}{2}$ (D) $\frac{n+1}{2}$

(8) 设 (X_1, X_2, \dots, X_4) 是来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的简单随机样本, $Y = \frac{X_1^2 + X_2^2}{X_3^2 + X_4^2}$. 对于给定的

$\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 y_α 满足 $P\{|Y| < y_\alpha\} = \alpha$, 则有 ().

- (A) $y_\alpha y_{1-\alpha} = 1$ (B) $y_\alpha + y_{1-\alpha} = 1$ (C) $y_{\frac{\alpha}{2}} y_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1$ (D) $y_{\frac{\alpha}{2}} y_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1$

二、填空题: 9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(9) 设函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 则 $f^{(100)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(10) $\int_{-1}^1 x(1+x^{2017})(e^x - e^{-x})dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

(11) 曲线 $y = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+x^2 - e^{\lambda x}}$ 及直线 $y = \frac{1}{2}x$ 及 $x=1$ 围成平面图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

(12) 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数均存在, 且 $f'_x(x_0, y_0) = 1$, $f'_y(x_0, y_0) = 2$, 则极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h, y_0) - f(x_0, y_0 - 3h)}{h} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

(13) 若 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, E 为三阶单位矩阵, 则 $(E + A + A^2)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(14) 设随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} g(x), & |x| \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ Y 的密度函数为 $f_Y(y) = \begin{cases} g(-y), & |y| \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$

其中 $g(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 若 $DX = 1$, $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 则由切比雪夫不等式得 $P\{|X+Y| < 2\} \geq \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题: 15~23 小题, 共 94 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15) (本题满分 10 分) 设 $x \geq a \geq 1$, 证明: (I) $\ln a \geq \frac{2(a-1)}{a+1}$; (II) $a(x+1) \ln a \geq (a+x)(a-1)$.

(16) (本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 可导, 且满足条件 $f'(x) = \frac{1}{2}g(x)$, $g'(x) = \frac{1}{2}f(x)$,

$f(0) = 0$, $g(x) \neq 0$. (I) 求 $y = \frac{f(x)}{g(x)}$ 的表达式; (II) 求曲线 $y = \frac{f(x)}{g(x)} (x \geq 0)$ 绕直线 $y=1$ 旋转一周

所生成立体的体积.

(17) (本题满分 10 分) 已知 $df(x, y) = -(1+e^y) \sin x dx + (\cos x - 1 - y)e^y dy$, $f(0, 0) = 2$, 求函数 $f(x, y)$ 的极值.

(18) (本题满分 10 分) 计算积分 $I = \int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{(1+e^{\frac{x-1}{x}})(1+x^2)}$.

(19) (本题满分 10 分) 计算 $\iint_{x^2+y^2 \leq \frac{3}{16}} \min\{\sqrt{\frac{3}{16}-x^2-y^2}, 2(x^2+y^2)\} dx dy$.

(20) (本题满分 11 分) 已知三阶方阵 A 的第一行元素为 a, b, c ($a \neq 0$), 且 $AB = O$, 其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 2 \\ 3 & 6 & 10 & 4 \end{pmatrix}. \text{ 记 } \xi_1 = \begin{pmatrix} -b \\ a \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -c \\ 0 \\ a \end{pmatrix}. \text{ 证明: (I) } \xi_1, \xi_2 \text{ 都为线性方程组 } Ax = 0 \text{ 的解; (II)}$$

B 的列向量组与 ξ_1, ξ_2 等价.

(21) (本题满分 11 分) 已知 A 为三阶实对称矩阵, $r(A) = 2$, $AB = 2B$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

(I) 求正交阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角阵; (II) 求 A^n .

(22) (本题满分 11 分) 设随机变量 X, Y, Z 相互独立, 且 X 和 Y 均服从 $N(0, 1)$, Z 的分布律为

$$P\{Z=0\} = P\{Z=1\} = \frac{1}{2}, T = (X^2 + Y^2)Z, \text{ (I) 求 } T \text{ 的分布函数 } F_T(t); \text{ (II) 求 } ET.$$

(23) (本题满分 11 分) 设 (X_1, X_2, \dots, X_n) 是来自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, (I) 问常数 k_1

取何值时, $E(k_1 \sum_{i=1}^n |X_i|) = \sigma$? (II) 问常数 k_2 取何值时, $E(k_2 (\sum_{i=1}^n |X_i|)^2) = \sigma^2$?

绝密 * 启用前

2017 年全国硕士研究生入学统一考试

超越考研

数学（三）模拟（四）

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在答题纸指定位置上填写考生姓名、报考单位和考生编号。
2. 答案必须书写在答题纸指定位置的边框区域内，写在其他地方无效。
3. 填（书）写必须使用蓝（黑）色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔。
4. 考试结束，将答题纸和试题一并装入试题袋中交回。

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合要求的。请将所选选项前的字母填在答题纸指定位置上。

(1) 设函数 $f(x) = \frac{\sin x \cos \frac{\pi}{2}x}{|x|(x^2 + x - 2)}$ ，则 $f(x)$ 的可去间断点、跳跃间断点、第二类间断点分别为 ()。

(A) $x = -2, x = 0, x = 1$

(B) $x = 0, x = 1, x = -2$

(C) $x = 0, x = -2, x = 1$

(D) $x = 1, x = 0, x = -2$

(2) 方程 $\int_{-1}^x te^{\cos t} dt = 0$ 的实根个数为 ()。

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(3) 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 则下列结论正确的个数为 ()。

①沿直线 $y = kx$, k 为任意实数, 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} f(x, y)$ 存在; ②极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ 存在;

③偏导数 $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 存在且相等;

④ $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续。

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(4) 设函数 $f(x)$ 单调连续, $f(0) = 0$, $\varphi(x)$ 为 $f(x)$ 的反函数, 则对任意的 t , 有 ()。

(A) $\int_0^t \varphi(x) dx = \int_0^t f(x) dx$

(B) $\int_0^{f(t)} \varphi(x) dx = \int_0^{t} f(x) dx$

(C) $\int_0^{\varphi(t)} f(x) dx + \int_0^t f(x) dx = t\varphi(t)$

(D) $\int_0^{f(t)} \varphi(x) dx + \int_0^t f(x) dx = tf(t)$

(5) 设 A 合同于 $B = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$, 则 ()。

(A) $|A| = |B|$

(B) $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值

(C) A 为对称阵

(D) A 必合同于单位矩阵

(6) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵 ($n > m$), $r(A) = m$, B 是 $n \times (n - m)$ 矩阵, $r(B) = n - m$ 且 $AB = O$, 若 η 是 $Ax = 0$ 的解, 则线性方程组 $By = \eta$ ()。

(A) 无解

(B) 有无穷多解

(C) 有唯一解

(D) 解的情况不能确定

(7) 设 A, B 为两个随机事件, $0 < P(A) < 1$, 则必有 $1 - P(B|\bar{A})$ ()。

(A) $= P(B|A)$

(B) $\leq \frac{1 - P(B)}{P(A)}$

(C) $\leq 1 - \frac{P(B)}{P(A)}$

(D) $\leq 1 - \frac{P(\bar{A}|B)}{P(A)}$

(8) 设随机变量 $X \sim U[0, \frac{3}{2}]$, $Y = [X]$, 其中 $[\cdot]$ 表示取整函数, 则 X 和 Y 的相关系数为 ().

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{6}}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

二、填空题: 9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(9) 设 $f(x)$ 是以 4 为周期的奇函数, 且 $f'(0) = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x^3) + f(x^2)}{x - 2} =$ _____.

(10) $\int e^x \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} dx =$ _____.

(11) 设 $u = xye^{x+y}$, 若 m, n 为自然数, 则有 $\frac{\partial^{m+n} u}{\partial x^m \partial y^n} =$ _____.

(12) 设 $D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, y \leq -x\}$, 求 $\iint_D \frac{x}{(1+x^2)y^2} d\sigma =$ _____.

(13) 设 A 是 3 阶矩阵, 若线性方程组 $Ax = (3, 3, 3)^T$ 的通解为 $k_1(-1, 2, -1)^T + k_2(0, -1, 1)^T + (1, 1, 1)^T$,

其中 k_1, k_2 是任意常数, 则 A 的特征值为 _____.

(14) 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 均服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布, $X = \min\{\max\{X_1, X_2\}, X_3\}$,

则当 $0 \leq x \leq 1$ 时, X 的密度函数为 $f_X(x) =$ _____.

三、解答题: 15~23 小题, 共 94 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15) (本题满分 10 分) 设非负函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 $f''(x) \leq 0$, 且 $f(x)$ 在点 $x = x_0 \in [a, b]$ 处取得最大值. (I) 对任意的 $x \in [a, b]$, 证明 $f(x_0) \leq f(x) + f'(x)(x_0 - x)$; (II) 对任意的 $x \in [a, b]$,

证明 $f(x) \leq \frac{2}{b-a} \int_a^b f(t) dt$.

(16) (本题满分 10 分) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z^5 - xz^4 + yz^3 = 1$ 确定的隐函数, 求 $dz|_{(0,0)}$,

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)}$.

(17) (本题满分 10 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 的和.

(18) (本题满分 10 分) 某公司第 t 年有净资产 $W = W(t)$ (万元), 且资产以每年 0.05 的速度连续增长. 同时, 公司每年支付职工工资 300 万元.

(I) 建立净资产 $W(t)$ 所满足的一阶微分方程;

(II) 如果净资产的初始值为 W_0 , 求出 $W(t)$ 的表达式;

(III) 讨论当 W_0 分别为 5000 万元, 6000 万元, 7000 万元时, 净资产 $W(t)$ 的变化特征.

(19) (本题满分 10 分) 设 $\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y} = 1$, $\left. \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \right|_{(x, 0)} = 2x$, $f(0, y) = y^2$, 计算 $\iint_D f(x, y) d\sigma$,

其中 D 是由圆 $x^2 + y^2 = 4$ 和 $(x+1)^2 + y^2 = 1$ 所围成的平面区域.

(20) (本题满分 11 分) 已知齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系为 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$, $Bx = 0$ 的

基础解系为 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的非零公共解.

(21) (本题满分 11 分) 已知三阶矩阵 A 满足 $|A - E| = |A - 2E| = |A + E| = a$.

(I) 当 $a = 0$ 时, 求 $|A + 3E|$;

(II) 当 $a = 2$ 时, 求 $|A + 3E|$.

(22) (本题满分 11 分) 设随机变量 $X_i \sim U[0, 1]$, $i = 1, 2, 3, 4$, $N \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$, 且

X_1, X_2, \dots, X_4, N 相互独立, $Y = X_1 + \dots + X_N$, 求 EY .

(23) (本题满分 11 分) 某电子元件的寿命服从参数为 λ 的指数分布 (单位: 小时), λ 未知, 从中任取 n 只进行检测, 结果有 m ($m < n$) 只电子元件寿命不超过 k 小时.

(I) 求 λ 的矩估计值 $\hat{\lambda}_M$;

(II) 求 λ 的极大似然估计值 $\hat{\lambda}_L$.

绝密 * 启用前

2017 年全国硕士研究生入学统一考试

超 越 考 研
数学（三）模拟（五）

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 答题前，考生须在答题纸指定位置上填写考生姓名、报考单位和考生编号。
2. 答案必须书写在答题纸指定位置的边框区域内，写在其他地方无效。
3. 填（书）写必须使用蓝（黑）色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔。
4. 考试结束，将答题纸和试题一并装入试题袋中交回。

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合要求的。请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上。

(1) 设 $f(x)$ 为正值连续偶函数， $F(x) = \int_0^x t^2 f(x-t) dt$ ，则下列结论中正确的个数为 ()。

- ① $F(x)$ 为单增的奇函数； ② 点 $(0,0)$ 为 $y = F(x)$ 唯一的拐点；
③ $F'(x)$ 为非负的凹函数； ④ $F'(x)$ 只在点 $x = 0$ 处取得最小值。

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

(2) 下列级数中绝对收敛的是 ()。

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \pi \sqrt{n^2+1}}{n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n}}$
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{n^3} + \frac{\cos n\pi}{n} \right)$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{(n!)^2}$

(3) 设 $I_1 = \int_0^{\sqrt{\pi}} \cos x^2 dx$, $I_2 = \int_0^{\pi} \sqrt{x} \cos x dx$ ，则以下结论正确的是 ()。

(A) $I_1 > 0, I_2 > 0$ (B) $I_1 > 0, I_2 < 0$ (C) $I_1 < 0, I_2 > 0$ (D) $I_1 < 0, I_2 < 0$

(4) 设 $I_1 = \int_0^{+\infty} \max\left\{\frac{1}{\sqrt{x}}, \frac{1}{x^2}\right\} dx$, $I_2 = \int_0^{+\infty} \min\left\{\frac{1}{\sqrt{x}}, \frac{1}{x^2}\right\} dx$ ，则 ()。

(A) I_1 和 I_2 都收敛 (B) I_1 和 I_2 都发散 (C) I_1 收敛, I_2 发散 (D) I_1 发散, I_2 收敛

(5) 设 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = 2A + 3B$ ，则必有 ()。

- (A) $A - 3E$ 可逆, $B - 2E$ 不可逆 (B) $A - 3E$ 不可逆, $B - 2E$ 可逆
(C) $A - 3E$, $B - 2E$ 都不可逆 (D) $A - 3E$, $B - 2E$ 都可逆

(6) 设 A 为三阶反对称非零矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则有 ()。

(A) $r(A^*) = 3$ (B) $r(A^*) = 2$ (C) $r(A^*) = 1$ (D) $r(A^*) = 0$

(7) 设随机事件 A, B, C 两两独立, 其概率均为 p ($0 < p < 1$), 若 $A \cup B \cup C = \Omega$, 且 $AB \subset C$, 则 ()。

(A) $p = \frac{1}{2}$ (B) $p = \frac{1}{3}$ (C) $p = \frac{1}{4}$ (D) p 的取值不确定

(8) 设随机变量 X 的方差存在, 则下列结论中, 正确的个数为 ().

- ① $|EX| \leq E|X| \leq \sqrt{E(X^2)}$; ② $|EX| \leq \sqrt{E(X^2)} \leq E|X|$;
③ $E|X - EX| \leq \sqrt{DX} \leq \sqrt{E(X^2)}$; ④ $\sqrt{DX} \leq \sqrt{E(X^2)} \leq E|X - EX|$.

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

二、填空题: 9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(9) 设函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$, 其中 $z = z(x, y)$ 由函数 $xz + e^{yz} = 3$ 所确定, 则 $du|_{(2,0,1)} =$ _____.

(10) 设函数 $p(x) = \max\{x, 1\}$, 则微分方程 $y' + p(x)y = x$ 的通解为 _____.

(11) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $xz = \varphi(yz)$ 确定, $x - y\varphi' \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

(12) $\int_{-1}^1 dy \int_{\sqrt{2-y^2}}^{1+\sqrt{1-y^2}} (\sqrt{x^2 + y^2} + y^3) dx =$ _____.

(13) 设三阶方阵 A 与 B 相似, $A^2 - 3A + 2E = O$, 且 $|B| = 2$, 则 $\begin{vmatrix} (A+E)^{-1} & O \\ O & 2B^* \end{vmatrix} =$ _____.

(14) 设随机变量 $X \sim P(100)$, 则用中心极限定理计算 $P\{80 < X < 110\} =$ _____.

($\Phi(1) = 0.841, \Phi(2) = 0.977$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数.)

三、解答题: 15~23 小题, 共 94 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15) (本题满分 10 分) (I) 求 $\cos(\sin x)$ 的带有皮亚诺余项的四阶麦克劳林公式;

(II) 设函数 $f(x) = 1 - \cos(\sin x) + \alpha \ln(1 + x^2)$, 其中 α 是参数, 试讨论当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x 的多少阶无穷小? 请说明理由.

(16) (本题满分 10 分) 设函数 $u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 若 $u(0, y) = \ln(1 + y), u(x, 0) = \sin x$,

$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial u}{\partial x} = 0$, 求 $u(x, y)$.

(17) (本题满分 10 分) 数列 $\{x_n\}$ 定义如下: $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \sqrt{x_n^2 + \frac{1}{n^2}})$, $n = 1, 2, \dots$. 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛.

(18) (本题满分 10 分) 设当 $0 \leq x < 1$ 时, 函数 $f(x) = (1-x)\ln(1+x)$. 当 $k \leq x < k+1$ 时,

$f(x) = a_k f(x-k)$, $k=1, 2, \dots$. (I) 求常数 a_k ($k=1, 2, \dots$), 使得 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导; (II) 求曲线 $y = f(x)$ ($x \geq 0$) 与 x 轴所围平面图形的面积 A .

(19) (本题满分 10 分) 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $xy = \int_0^z \frac{dt}{\sqrt{1+e^{2t}}}$ 确定, 证明:

$$(I) \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2; \quad (II) x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}.$$

(20) (本题满分 11 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, X 是二阶方阵, E 是二阶单位阵, 问方程 $AX - XA = E$

是否有解? 若有解, 求满足方程 $AX - XA = E$ 的所有 X , 若无解, 说明理由.

(21) (本题满分 11 分) 设 A 为三阶实对称阵, $r(A)=1$, $\lambda_1=9$ 是 A 的一个特征值, 对应的一个特征向量为 $\xi_1 = (1, -2, 2)^T$. (I) 问 $\eta = (-1, 2, 0)^T$ 是否为线性方程组 $Ax = 0$ 的解? 说明理由; (II) 求线性方程组 $Ax = 0$ 的通解; (III) 求矩阵 A .

(22) (本题满分 11 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = ke^{-\lambda|x|}$, $-\infty < x < +\infty$, $\lambda > 0$. 令 $Y = |X|$,

(I) 求常数 k ; (II) 求 $D(XY)$; (III) 求 (X, Y) 的分布函数.

(23) (本题满分 11 分) 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ 是来自总体 $X \sim B(1, 0.2)$ 的简单随机样本.

(I) 问 $\sum_{i=1}^{10} X_i$ 和 $\sum_{i=1}^{10} X_i^2$ 分别服从何分布?

(II) 计算 $P\{\bar{X} \leq \frac{1}{10}\}$ 和 $P\{S^2 = \frac{5}{18}\}$, 其中 \bar{X} 为样本均值, S^2 为样本方差.