

$$G_3 = \frac{1}{A_3} = \frac{1}{15} = 0.066667 \text{ S}$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} = 0.142857 \text{ S}$$

Детские системы с полосообразной матрицей

$$\varphi = (AG_B A^T)^{-1} (AJ_B - AG_B E_B)$$

После расчета позыки.

$$\rho_{N_2} = 77.429 \nabla$$

$$p_{13} = 127\ 419\ 7$$

$$p_{14} = 50 \nabla$$

$$\varphi_9 = 85\,484\text{ V}$$

$$\rho_3 = 150 \nabla$$

$\rho_1 = 27.429 \text{ V}$

$$\varphi_5 = 50^\circ$$

$\rho_7 = 97\,742\, \text{V}$

близко к стволу и таким ветвям

$$I_2 = \frac{\phi_1 - \phi_2 + E_2}{R_2} = \frac{27.409 - (97.742) + 50}{9} = -2.258 \text{ A}$$

$$I_0 = (\varphi_7 - \varphi_4) G_0 = (97\,742 - (85\,484)) \cdot 0.2 = 2\,452 \text{ A}$$

$$J_0 = J_0 = 4 \Delta$$

$$I_1 = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{R_1} = \frac{97742 - (150)}{6} = 871 \text{ A}$$

$$I_{e_1} = 871 \text{ A}$$

$$I_s = \frac{V_1 - V_2}{R_c} = \frac{27.419 - (85.484)}{20} = -2.903 \text{ A}$$

$$I_s = \frac{\varphi_4 - \varphi_s}{R_s} = \frac{BS 484 - (500)}{10} \rightarrow 548 A$$

$$I_3 = \frac{\varphi_1 - \varphi_3 + \varepsilon_3}{R_3} = \frac{27.419 - (50) + 100}{15} = 5.161 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{\varphi_2 - \varphi_3 + E_4}{R_4} = \frac{0 - (50) + 50}{2} = 0 \text{ A}$$

3 Рассчитать токи во всех ветвях цепи и кинетических токов

Сравнить с результатами расчета по п2

Рассчитайте по уравнению 110 D-галактон-8-эпимера