

华中科技大学转专业数学考试

重制版

目录

1.转专业数学考试指南·····	2
2.2021 年转专业数学考试真题及参考答案·····	4
3.2020 年转专业数学考试真题及参考答案·····	11
4.2019 年转专业数学考试真题及参考答案·····	16
5.2018 年转专业数学考试真题及参考答案·····	20
6.2017 年转专业数学考试真题及参考答案·····	25
7.2016 年转专业数学考试真题（均为前些年原题，略去）	
8.2015 年转专业数学考试真题及参考答案·····	29
9.2014 年转专业数学考试真题及参考答案·····	32
10.2013 年转专业数学考试真题及参考答案·····	35
11.2012 年转专业数学考试真题及参考答案·····	39
12.2011 年转专业数学考试真题及参考答案·····	43

转专业数学考试指南

首先老生常谈地强调一遍,转专业数学统考虽然名字上叫微积分,实际上更偏向于数学分析,计算题偏少而证明题偏多,难度也非常之高,更具体地可以去群文件翻看历年的转专业数学考试真题,就会有大概的了解了。另外转专业数学统考为小众考试,没有考试大纲,全凭数院老师随性出题,考试范围每年都不一定,基本和工科微积分(即微积分一)的进度持平,大概是到不定积分为止,学习数学分析的同学务必要加快进度自行预习。另外着重强调的是务必要把历年真题吃透,早年数院老师偷懒,原题隔几年反复出(群文件没有16年数学题的原因就是这样,题目在其他年份试卷(包括之后的)里全部出现了,因此没有整理),现在不像以前那么懒了,但是也会有对原题微改的“新题”,因而真题务必掌握技巧,转专业数学考试为选拔性考试,难度高是显而易见的,需要尽可能多拿这些易得的分。

此外,大家没有必要去打印店找所谓转专业真题了,他们很多卷子就是本群整理然后流出的,直接下载群文件去打印就足够了,答案也是学长学姐一个一个找+自己做的,没必要多花冤枉钱了。

后面贴一手早年飞神的数学考试准备指南和我的总结,大家参考即可

关于用哪本书的问题

首先声明，裴砖指的是裴礼文编著的《数学分析中的典型问题与方法》，看好多人都在问。

然后，关于哪本书好，比如裴砖，蒲和平，陈兆斗，这三本书哪本好，这种问题统一回答一下：没有更好这么一说。这三本书你只要吃透一本，数学竞赛都不在话下，何况这转专业考试。如果是抱着哪本书上有原题这种想法建议放弃，只能说18年之前的题大部分能在裴砖上找到，蒲和平陈兆斗相对少一些。但19年就考的都是之前的老题，所以想做参考书碰原题是不太现实的，原题还是做往年真题为好，题库没有谁说得准一定是哪些题。

顺便说一下，这三本书，都是习题类型的书，上面对于概念定理等的讲解不够详细，建议还是先看同济的高等数学或者启明的一元分析看定理概念这些细节(觉得自己有能力的数学分析也可以)。把概念定理细节弄清楚了再看习题效果更好。转专业考试改卷会比较注重细节的。

同济的高等数学见群文件。

(BY wsy)

数学考试准备参考资料（基础与进阶）：

华中科技大学《微积分学》上册 + 华中科技大学《微积分学习辅导》

同济《高等数学》

华中科技大学《一元分析学》（较难）

往年原题（必看，群文件 - 转专业统一数学考试真题及参考答案）

裴礼文《数学分析中的典型问题与方法》（较难）

周民强《数学分析习题演练 第一册》

数学考试准备提示：转专业考试偏重数学分析（推理证明），在基础部分选择一份教材学习基本知识后，推荐继续使用进阶资料刷题学习，不必在此处推荐的不同教材间纠结，完成度比较重要。

(by  jj)

2021 转专业数学考试真题

1、填空题

(1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \arctan \left(\frac{1}{k^2 + k + 1} \right) =$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{f(x)}{\tan x} \right)}{2^x - 1} = 8$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} =$

(3) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n^4} + 2\sqrt[n]{n^2} - 3}{\sqrt[n]{n^2} - 3\sqrt[n]{n} + 2} =$

(4) 设 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且满足方程

$$g(x) + g(y) = g\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right), g(x) =$$

(5) 求 $x = a \cos t + b \sin t, y = a \sin t - b \cos t$, 则 $\frac{d^m x}{dt^m} \cdot \frac{d^n y}{dt^n} - \frac{d^n x}{dt^n} \cdot \frac{d^m y}{dt^m} =$

2、设 $\{\theta_n\} \neq 0$ ，且满足 $\theta_n^2 - \theta_{n-1} \cdot \theta_{n+1} = 1 (n=1, 2, 3 \cdots)$ ，证明存在一个实数，使得对所有 $n \geq 1$ ，有 $\theta_{n+1} = \lambda \theta_n - \theta_{n-1}$ 。

3、设 $f(x)$ 定义在 $x=0$ 的某个邻域上， $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x} = 0$ ，

证明： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 。

4. 已知函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内有二阶导数， $f(0) = f'(0) = 0$ ， $|f''(x)| \leq |f(x)| + |f'(x)|$ ，证明：存在 $\delta > 0$ ，使得在 $(-\delta, \delta)$ 内 $f(x) \equiv 0$ 。

5、设可微函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调减少，如果当 $x \in (0, +\infty)$ 时 $0 < |f(x)| < |f'(x)|$ 成立，证明：当 $x \in (0, 1)$ 时，必有 $x \cdot f(x) > \frac{1}{x} f\left(\frac{1}{x}\right)$ 。

2021 年转专业数学试题参考答案

1 (1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} [\arctan(k+1) - \arctan k] = \lim_{n \rightarrow \infty} [\arctan(n+1) - \arctan 0] = \frac{\pi}{2}$$

(2)

上式易化为: $\frac{f(x)}{\ln 2 \cdot x^2} = 8$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 8 \ln 2$

(3)

$$\begin{aligned} \sqrt[n]{n} = t \rightarrow 1 (n \rightarrow \infty), \text{原式} &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^4 + 2t^2 - 3}{t^2 - 3t + 2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t^2 - 1)(t^2 + 3)}{(t-1)(t-2)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{(t+1)(t^2 + 3)}{t-2} = -8 \end{aligned}$$

(4)

由 $g(x) + g(y) = g(\sqrt{x^2 + y^2})$, 令 $x = y = 0$, 可得 $g(0) = 0$ 再令 $y = 0$, 可得 $g(x) = g(|x|)$ 可得偶函数. 下面考虑 $x, y > 0$ 的情况:

$$g(\sqrt{x^2}) + g(\sqrt{y^2}) = g(\sqrt{x^2 + y^2}), \text{令 } h(x) = g(\sqrt{x}) (x > 0)$$

$$h(x^2) + h(y^2) = h(x^2 + y^2), \text{令 } x' = x^2, y' = y^2$$

$$\text{则 } h(x') + h(y') = h(x' + y') \rightarrow h(x') = kx', \text{ 即 } h(x) = kx.$$

$$g(\sqrt{x}) = kx \rightarrow g(x) = kx^2 (x > 0).$$

由偶函数可知, $g(x) = kx^2 (x \in \mathbb{R})$. 其中 $k = g(1)$.

(5)

$$\text{令 } x = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos t + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin t \right) = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(t - \alpha),$$

$$\text{同理令 } y = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin t - \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos t \right) = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(t - \alpha).$$

用 Leibniz 公式可得答案: $(a^2 + b^2) \sin \frac{n-m}{2} \pi$

2. 证明: 由题 $\theta_{n+1}^2 - \theta_n \cdot \theta_{n+2} = 1, \theta_n^2 - \theta_{n-1} \cdot \theta_{n+1} = 1,$

做差得: $\theta_{n+1}^2 + \theta_{n-1} \cdot \theta_{n+1} - \theta_n^2 - \theta_n \cdot \theta_{n+2} = 0 \rightarrow \theta_{n+1}(\theta_{n-1} + \theta_{n+1}) = \theta_n(\theta_n + \theta_{n+2})$

$$\rightarrow \frac{\theta_{n+1}}{\theta_n + \theta_{n+2}} = \frac{\theta_n}{\theta_{n-1} + \theta_{n+1}} = \lambda = \frac{\theta_1}{\theta_0 + \theta_2}$$

3. 证明: 已知 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x| < \delta$ 时, 有 $\left| \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right)}{x} \right| < \frac{\varepsilon}{3}$. 亦即

$$-\frac{\varepsilon}{3}|x| < f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) < \frac{\varepsilon}{3}|x|$$

将 x 替换为 $\frac{x}{2^k}$, 得

$$-\frac{\varepsilon}{3} \cdot \frac{1}{2^k} |x| < f\left(\frac{x}{2^k}\right) - f\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right) < \frac{\varepsilon}{3} \cdot \frac{1}{2^k} |x| \quad (k = 0, 1, 2, \dots, n).$$

相加 (注意到 $\sum_{k=0}^n \left[f\left(\frac{x}{2^k}\right) - f\left(\frac{x}{2^{k+1}}\right) \right] = f(x) - f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right)$) 得

$$-\frac{\varepsilon}{3} \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} |x| < f\left(\frac{x}{2^k}\right) - f\left(\frac{x}{2^{n+1}}\right) < \frac{\varepsilon}{3} \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} |x|.$$

令 $n \rightarrow \infty$, 取极限得 $-\frac{2\varepsilon}{3}|x| \leq f(x) \leq \frac{2\varepsilon}{3}|x|$ (因 $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = 2$), 故

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon$$

4. 法一: 证明: 考察区间 $\left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$ 上的函数 $|f(x)| + |f'(x)|$, 并假定它

在 $x_0 \in \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$ 处取到最大值 M .

$f(x_0) = f''(\xi_0) \frac{x_0}{2}, f'(x_0) = f''(\eta_0) x_0$, 其中 ξ_0, η_0 位于 x_0 和 0 之间. 从而有

$$M = |f(x_0)| + |f'(x_0)| = \left| f''(\xi_0) \right| \frac{x_0^2}{2} + \left| f''(\eta_0) \right| x_0$$

$$\begin{aligned}
&\leq \frac{|f''(\xi_0)| + |f''(\eta_0)|}{4} \\
&\leq \frac{|f(\xi_0)| + |f'(\xi_0)| + |f(\eta_0)| + |f'(\eta_0)|}{4} \\
&\leq \frac{M}{2}
\end{aligned}$$

故 $M=0$, 得证.

法二: 取 $\delta = \frac{1}{2}$, $\because f(x), f'(x) \in C\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, 由闭区间连续函数的有界性

可知: $\exists M_1, M_2 > 0$, s.t.

$|f(x)| < M_1, |f'(x)| < M_2, \therefore |f''(x)| \leq |f(x)| + |f'(x)| < M_1 + M_2$, 即 $|f''(x)|$ 有上界.

由确界原理可知, $|f''(x)|$ 有上确界, 记为 $S (S \geq 0)$.

由上确界的定义可知: $\exists x_1 \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, s.t. $|f''(x_1)| > S - \varepsilon, (\forall \varepsilon > 0)$.

下面用反证法说明 $S > 0$ 不成立: 若 $S > 0$, 取 $\varepsilon = \frac{1}{8}S > 0$, 则

$$|f''(x_1)| > \frac{7}{8}S,$$

$$\because f(x_1) \quad (\text{Taylor}) = f(0) + f'(0)x_1 + \frac{1}{2}f''(\xi)x_1^2, \xi \in (0, x_1),$$

$$f'(x_1) \quad (\text{Lagrange}) = f'(0) + x_1 f''(\eta), \eta \in (0, x_1)$$

$$\text{故 } \frac{7}{8}S < |f''(x_1)| \leq |f(x_1)| + |f'(x_1)| = \frac{1}{2}|f''(\xi)|x_1^2 + |x_1||f''(\eta)| \leq \frac{5}{8}S \Rightarrow S < 0, \text{ 与假设相悖, 不可能, 舍去.}$$

设相悖, 不可能, 舍去.

$$\because S \geq 0, \therefore S = 0$$

$$\text{即 } |f''(x)| = 0, \therefore f''(x) = 0, \therefore f'(x) \equiv f'(0) = 0 \Rightarrow f(x) \equiv f(0) = 0, x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right].$$

错解: 考虑区间 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$, 在该区间上有 $|f''(x)| \leq |f(x)| + |f'(x)|, x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$,

$$\text{则 } |f'(x)| = \left| \int_0^x f''(t) dt \right| \leq \int_0^x |f''(t)| dt \leq \int_0^x (|f(t)| + |f'(t)|) dt$$

$$\text{又因 } |f(x)| = \left| \int_0^x f'(t) dt \right| \leq \int_0^x |f'(t)| dt, \int_0^x |f(t)| dt + \int_0^x |f'(t)| dt = |f(\theta)|x + \int_0^x |f'(t)| dt$$

(积分中值定理)

$$= x \int_0^\theta |f'(t)| dt + \int_0^x |f'(t)| dt \leq x \int_0^x |f'(t)| dt + \int_0^x |f'(t)| dt = (x+1) \int_0^x |f'(t)| dt$$

记 $f'(x)$ 在 $(0, x)$ 上最大值点为 ε

$$|f'(\varepsilon)| \leq (\varepsilon+1) \int_0^\varepsilon |f'(t)| dt \leq (\varepsilon+1)\varepsilon |f'(\varepsilon)| \leq \frac{3}{4} |f'(\varepsilon)|$$

$|f'(\varepsilon)| = 0, |f'(x)| = 0, x \in (0, \frac{1}{2}), f(x) = 0$, 同理可将此情况推广到 $(-1, 1)$ 上.

错误原因在于使用牛顿-莱布尼茨公式时要求 $f''(t)$ 在 $t \in (0, x)$ 上连续, 此处由已知条件无法得出.

5. 首先我们给出 $f(x) < 0$ 的证明, (由介值定理, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上不变号)

$$g(x) \triangleq xf(x) - \frac{1}{x} f\left(\frac{1}{x}\right), g'(x) = xf'(x) + f(x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x^3} f'\left(\frac{1}{x}\right) < 0$$

$g(x) > g(1) = 0$, 原命题成立。

下面给出 $f(x) > 0$ 的证明:

$$\Leftrightarrow \text{证明: } x \in (0, 1), \frac{f\left(\frac{1}{x}\right)}{f(x)} < x^2 \text{ 或 } \ln \frac{f\left(\frac{1}{x}\right)}{f(x)} < 2 \ln x. \text{ 因 } f(x) \text{ 严格递减,}$$

$f'(x) < 0$, 有 $f'(x) = -|f'(x)|$,

$$\ln \frac{f\left(\frac{1}{x}\right)}{f(x)} = \ln f\left(\frac{1}{x}\right) - \ln f(x) \xrightarrow{\text{Lagrange定理}} \frac{f'(\xi)}{f(\xi)} \left(\frac{1}{x} - x\right).$$

注意到 $0 < f(x) < |f'(x)| = -f'(x), \frac{f'(x)}{f(x)} < -1, \frac{1}{x} - x > 0 (0 < x < 1)$.

接下来只需证: $x - \frac{1}{x} < 2 \ln x (0 < x < 1)$. 【求导, 显然】

$$\text{故 } \ln \frac{f\left(\frac{1}{x}\right)}{f(x)} < x - \frac{1}{x} < 2 \ln x (0 < x < 1).$$

错解: 由题可知, $f'(x) < 0, 0 < f(x) < -f'(x)$, 故 $\frac{-f'(x)}{f(x)} > 1$, 所以

$$\ln \frac{f(x)}{f\left(\frac{1}{x}\right)} = -\int_x^{\frac{1}{x}} \frac{f'(t)}{f(t)} dt > \int_x^{\frac{1}{x}} dt = \frac{1}{x} - x, x \in (0, 1)$$

$$\text{故 } \frac{f(x)}{f\left(\frac{1}{x}\right)} > e^{\frac{1}{x}-x}, \text{ 又 } e^{\frac{1}{x}-x} > \frac{1}{x^2}$$

$$\text{可得 } x \cdot f(x) > \frac{1}{x} f\left(\frac{1}{x}\right), x \in (0, 1).$$

错误原因在于使用牛顿-莱布尼茨公式时要求 $\frac{f'(t)}{f(t)}$ 在 $t \in \left(x, \frac{1}{x}\right)$ 上

连续, 此处由已知条件无法得出.

2020 转专业数学考试真题

1. 设 $f(x)$ 是 R 上的有界实函数, 且 $f\left(x+\frac{1}{11}\right)+f\left(x+\frac{1}{12}\right)=f(x)+f\left(x+\frac{23}{132}\right)$

$(\forall x \in R)$, 求证: $f(x)$ 是周期函数。

2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i = A$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - a_{n-1}) = 0$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{3}} \left[(x+1)^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{2}{3}} \right]$

4. 求在 R 上满足方程 $f(2020x) + f(2019x) = 2022x + 2021$ 的连续解 $f(x)$

5. 讨论 $f(x)=[x]\sin \pi x$ 的连续性与可导性 ($[x]$ 表示不超过 x 的最大整数)

6. 计算 $\frac{d^n}{dx^n}\left(\frac{1}{x^2+a^2}\right)\Big|_{x=0}$ (n 是任意正整数)

(注: 原题没有 $x=0$, 但那样无法正常求解, 怀疑打印错误, 此处加上, 后会附上不考虑此条件的解法)

7. 设 $f(x)\in C[0,1]\cap D(0,1)$, $f(0)=0$, $f(1)=1$, 求证: 在 $(0,1)$ 内存在不同的 ξ, η , 使 $f'(\xi)f'(\eta)=1$

8. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导, 且 $\lim_{x\rightarrow 0}\left(1+x+\frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}=e^3$, 证明: $f''(0)=4$

2020 转专业数学试题参考答案

1. 设 $F(x) = f\left(x + \frac{1}{11}\right) - f(x)$, 则 $F\left(x + \frac{1}{12}\right) = F(x)$, 故 $F(x)$ 以 $\frac{1}{12}$ 为周期, 也以

1 为周期, $\therefore F(x+1) = F(x)$, 即 $f\left(x + \frac{1}{11}\right) - f(x) = f\left(x + \frac{12}{11}\right) - f(x+1)$

$f(x+1) - f(x) = f\left(x + \frac{12}{11}\right) - f\left(x + \frac{1}{11}\right)$, $f(x+1) - f(x)$ 以 $\frac{1}{11}$ 为周期, 也以 1

为周期, 可得 $f(x+n) - f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} [f(x+i+1) - f(x+i)] = (n-1)[f(x+1) - f(x)]$

$f(x+1) - f(x) = \frac{f(x+n) - f(x)}{n-1}$, 令 $n \rightarrow \infty$, $\because f(x)$ 有界, $f(x+1) - f(x) = 0$

$\therefore f(x)$ 以 1 为周期

2. $S_{n-1} = \sum_{i=1}^{n-1} a_i = na_n - \sum_{i=2}^n i(a_i - a_{i-1}) - a_1$ (Abel 变换)

$a_n = \frac{S_{n-1}}{n} + \frac{\sum_{i=2}^n i(a_i - a_{i-1}) + a_1}{n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_{n-1}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_{n-1}}{n-1} = A$, 由 Stolz 定理,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=2}^n i(a_i - a_{i-1}) + a_1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - a_{n-1}) = 0$, $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$

3. 原式 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{\frac{2}{3}} - \left(1 - \frac{1}{x}\right)^{\frac{2}{3}} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[1 + \frac{2}{3} \frac{1}{x} - \left(1 - \frac{2}{3} \frac{1}{x}\right) + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = \frac{4}{3}$

4. 考虑 $f(\alpha x) + f(\beta x) = ax + b$

$\alpha > \beta$, 则由 $f(x) + f\left(\frac{\beta}{\alpha}x\right) = ax \frac{1}{\alpha} + b$ 可知

$$\begin{aligned}
f(x) &= ax \frac{1}{\alpha} + b - f\left(\frac{\beta}{\alpha}x\right) \\
&= ax \frac{1}{\alpha} + b - \left[ax \frac{\beta}{\alpha^2} + b - f\left(\frac{\beta^2}{\alpha^2}x\right) \right] \\
&= ax \frac{1}{\alpha} - ax \frac{\beta}{\alpha^2} + f\left(\frac{\beta^2}{\alpha^2}x\right) = \cdots = \frac{ax}{\alpha} \left(1 - \frac{\beta}{\alpha} + \frac{\beta^2}{\alpha^2} - \cdots \pm \frac{\beta^{2n}}{\alpha^{2n}} \right) + b - f\left(\frac{\beta^{2n+1}}{\alpha^{2n+1}}x\right).
\end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 我们有 $f(x) = \frac{ax}{\alpha} \frac{1}{1 + \beta/\alpha} + \frac{b}{2} = \frac{a}{\alpha + \beta}x + b$.

5. 用定义, 在 R 上连续, 在 $x=n$ 处不可导, 其余地方可导

6. 方法 1: 由泰勒公式 $\frac{1}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a^2} \frac{1}{1 + \frac{x^2}{a^2}} = \frac{1}{a^2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x^2}{a^2} \right)^n = \frac{1}{a^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{a^{2n}} x^{2n}$

再由泰勒展开的唯一性, 故当 n 为奇数, $\frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{1}{x^2 + a^2} \right) \Big|_{x=0} = 0$

当 n 为偶数, $\frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{1}{x^2 + a^2} \right) \Big|_{x=0} = \frac{(-1)^{\frac{n}{2}}}{a^{n+1}} n!$

方法 2: $(a^2 + x^2)y = 1$, 由莱布尼兹: $(x^2 + a^2)y^{(n)} + 2nxy^{(n-1)} + n(n-1)y^{(n-2)} = 0$

$x=0, a^2 y^{(n)} + n(n-1)y^{(n-2)} = 0$, 由递推可得答案。

当没有 $x=0$ 时, 此时只能引入复数做

$$\begin{aligned}
\frac{1}{x^2 + a^2} &= \frac{1}{2ai} \left(\frac{1}{x - ai} - \frac{1}{x + ai} \right) \\
\text{原式} &= \frac{1}{2ai} \left(\frac{1}{x - ai} - \frac{1}{x + ai} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{2ai} \left[\frac{1}{(x - ai)^{n+1}} - \frac{1}{(x + ai)^{n+1}} \right] = \frac{(-1)^n n!}{2ai} \frac{(x + ai)^{n+1} - (x - ai)^{n+1}}{(x^2 + a^2)^{n+1}}
\end{aligned}$$

考虑: $x + ai = \sqrt{a^2 + x^2} \left(\frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} + \frac{ai}{\sqrt{a^2 + x^2}} \right)$

$$\begin{aligned}
&= r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta}, \sin \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}} \\
&\Rightarrow (x \pm ai)^{n+1} = r^{n+1} e^{\pm i(n+1)\theta} \left(r = \sqrt{a^2 + x^2} \right) \\
&\frac{(x+ai)^{n+1} - (x-ai)^{n+1}}{2ai} = \frac{r^{n+1} [e^{i(n+1)\theta} - e^{-i(n+1)\theta}]}{2ai} = \frac{r^{n+1} \sin(n+1)\theta}{a} \\
&\Rightarrow \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{1}{x^2 + a^2} \right) = \frac{(-1)^n n!}{a} \frac{\sin(n+1)\theta}{\left[\sqrt{a^2 + x^2} \right]^{n+1}}
\end{aligned}$$

7. 分析 (1) 只需将 $[0,1]$ 分成两个区间, 使 $f(x)$ 在两个区间各用一次微分中值定理, 设分点为 $x_0 \in (0,1)$, 由

$$f(x_0) - f(0) = f'(\xi)(x_0 - 0), f(1) - f(x_0) = f'(\eta)(1 - x_0) \quad (0 < \xi < x_0 < \eta < 1), \text{ 得}$$

$$f'(\xi) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0}, f'(\eta) = \frac{1 - f(x_0)}{1 - x_0}$$

$$\text{则 } f'(\xi)f'(\eta) = 1 \Leftrightarrow \frac{f(x_0)}{x_0} \cdot \frac{1 - f(x_0)}{1 - x_0} = 1. \Leftrightarrow x_0 \text{ 是方程 } f(x)[1 - f(x)] = x(1 - x)$$

的根. 所以取 x_0 是方程 $f(x) = 1 - x$ 的根即可.

证明 (1) 令 $F(x) = f(x) - 1 + x$, 则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且

$$F(0) = -1 < 0, F(1) = 1 > 0, \text{ 由介值定理知, 存在 } x_0 \in (0,1) \text{ 使得 } F(x_0) = 0,$$

即 $f(x_0) = 1 - x_0$. 在 $[0, x_0]$ 和 $[x_0, 1]$ 上对 $f(x)$ 分别应用拉格朗日中

值定理, 知存在两个不同的点 $\xi \in (0, x_0)$, $\eta \in (x_0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(x_0) - f(0)}{x_0 - 0}, f'(\eta) = \frac{f(1) - f(x_0)}{1 - x_0}. \text{ 于是}$$

$$f'(\xi)f'(\eta) = \frac{f(x_0)}{x_0} \cdot \frac{1 - f(x_0)}{1 - x_0} = \frac{1 - x_0}{x_0} \cdot \frac{x_0}{1 - x_0} = 1.$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right) = 3, \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(x + \frac{f(x)}{x} \right) = 3, \text{ 即 } \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 2$$

$$\text{由泰勒公式 } f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2),$$

$$\therefore f(0) = f'(0) = 0, \quad f''(0) = 4$$

2019 转专业数学考试真题

1. 设函数 $y = f(x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$ 的图像关于 $x = 2019$, $x = 2020$ 均对称, 请判断函数 $y = f(x)$ 是什么性质的函数, 并说明你的判断

2. 设 $a_n > 0, b_n > 0$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) > 0$, 证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$ 存在

3. 计算不定积分 (1) $\int \frac{x^2+1}{x^4-x^2+1} dx$ (2) $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}} dx$

4. (1) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内具有二阶导数且存在相等的最大值, $f(a) = g(a), f(b) = g(b)$ 。证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f''(\xi) = g''(\xi)$

(2) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导且 $f(a) = f(b) = 0$

证明: $\exists \alpha \in (a, b)$ 使得 $f'(\alpha) + \alpha f(\alpha) = 0$

5. 设 $n \in \mathbb{N}^*$, $f(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n (x^2 - 1)^n}{dx^n}$, 计算 $f(1)$ 、 $f(-1)$

6. $f(x)$ 有连续导数且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f'(x)}{1 - e^{-x}} = 1$, 问 $f(0)$ 为何值时, $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极值, 并说明它是极大值还是极小值

7. 设 $f(x): I \rightarrow \mathbb{R}$ 是任一函数, $x_0 \in I$, 证明: $f(x)$ 在 x_0 处可导的充要条件是: 存在一个函数 $g(x): I \rightarrow \mathbb{R}$, 使:

(1) $f(x) - f(x_0) = g(x)(x - x_0), \forall x \in I$

(2) $g(x)$ 在 x_0 处连续且 $f'(x_0) = g(x_0)$

2019 转专业数学试题参考答案

1. 周期函数, $T=2$, 偶函数, 对称轴为 $x=k$ (我觉得这个题说出周期就可以了)

2. 证明 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) = 2\delta > \delta > 0$, 则存在 $N \in \mathbf{N}$, 当 $n \geq N$ 时, 有:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \cdot \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} > \delta \Rightarrow \frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} > \delta a_{n+1}, \quad \text{即 } a_{n+1} < \frac{1}{\delta} \left(\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \right)$$

$$\text{于是: } \sum_{n=N}^m a_{n+1} \leq \frac{1}{\delta} \sum_{n=N}^m \left(\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} \right) \leq \frac{1}{\delta} \left(\frac{a_N}{b_N} - \frac{a_{m+1}}{b_{m+1}} \right) \leq \frac{1}{\delta} \frac{a_N}{b_N}$$

因而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和有上界, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2013 转专业考试原题)

$$3. \int \frac{x^2+1}{x^4-x^2+1} dx = \int \frac{\frac{1}{x^2}+1}{x^2-1+\frac{1}{x^2}} dx = \int \frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+1} = \arctan(x-\frac{1}{x}) + C$$

$$\begin{aligned} \int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}} dx &= 2x\sqrt{e^x-1} - 4 \int \frac{e^x-1}{e^x} d\sqrt{e^x-1} = 2x\sqrt{e^x-1} - 4\sqrt{e^x-1} + 4 \int \frac{1}{e^x} d\sqrt{e^x-1} \\ &= 2x\sqrt{e^x-1} - 4\sqrt{e^x-1} + 4 \arctan \sqrt{e^x-1} + C \end{aligned}$$

4.(1) 当同时取最大值时, 有 $f(x_0) = g(x_0)$. 不同时取最大值, 设 $f(x_1), g(x_2)$

最大, 由介值定理 $(f(x_1) - g(x_1))(f(x_2) - g(x_2)) < 0$, $\exists x_3, f(x_3) = g(x_3)$. 三个零点用三次罗尔定理可得.

(2) $h(x) = e^{\frac{1}{2}x^2} f(x)$, 对用罗尔定理. 学过微分方程一眼就够了.

5. 解: 因 $(x^2-1)^n = (x-1)^n(x+1)^n$, 令 $u(x) = (x-1)^n, v(x) = (x+1)^n$, 则

$$u(1) = u'(1) = \cdots = u^{(n-1)}(1) = 0, u^{(n)}(1) = n!, v(1) = 2^n;$$

$$v(-1) = v'(-1) = \cdots = v^{(n-1)}(-1) = 0, v^{(n)}(-1) = n!, u(-1) = (-1)^n 2^n,$$

$$\text{所以, } f(1) = \frac{1}{2^n n!} [v^{(n)}(1)u(1) + nv^{(n-1)}(1)u'(1) + \cdots + v(1)u^{(n)}(1)] = \frac{1}{2^n n!} \cdot 2^n \cdot n! = 1$$

$$\begin{aligned} f(-1) &= \frac{1}{2^n n!} [u^{(n)}(-1)v(-1) + nu^{(n-1)}(-1)v'(-1) + \cdots + u(-1)v^{(n)}(-1)] \\ &= \frac{1}{2^n n!} \cdot (-1)^n 2^n \cdot n! = (-1)^n. \end{aligned}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f'(x)}{1 - e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^x \frac{f(x) + f'(x)}{1 - e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x f(x))'}{1 - e^{-x}} = 1$$

$$\text{由洛必达法则 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x f(x)}{\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f'(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f'(x)}{1 - e^{-x}} = 1$$

$$f(0) = 0, \text{由极限保号性, } (e^x f(x))' > 0, x > 0; (e^x f(x))' < 0, x < 0$$

$$e^x f(x) > f(0) = 0, \text{故是极小值}$$

$$7. \text{证 必要性. 已知 } f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A \text{ 存在 表明函数}$$

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, & \text{当 } x \neq x_0 \text{ 时,} \\ A, & \text{当 } x = x_0 \text{ 时} \end{cases} \quad \text{在 } x = x_0 \text{ 处连续, (1) 式成立,}$$

$$f'(x_0) = g(x_0).$$

充分性.

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0),$$

故 $f'(x_0)$ 存在. (2014 转专业数学原题)

2018 转专业数学考试真题

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + b^n + 2^{-n} b^{2n})^{\frac{1}{n}} (b > 0)$

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[x]{\cos \sqrt{x}}$

3. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \arctan \frac{2}{k^2}$

4. 已知 $f(x)$ 、 $g(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的非常值连续可微函数,

$$f(x+y) = f(x)f(y) - g(x)g(y), \quad g(x+y) = f(x)g(y) + g(x)f(y)$$

且 $f'(0) = 0$ 。求证: $f(x)^2 + g(x)^2 = 1$ 。

5. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可微, 试证: $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续的充要条件是:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |h| < \delta, \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right| < \varepsilon, \text{ 对一切 } x \in [a, b]$$

成立。

6. 设 $f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x$, 求证:

(1) 对任意自然数 n , 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $[0, \frac{\pi}{3})$ 内有唯一根;

(2) 设 $x_n \in [0, \frac{\pi}{3})$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{3}$

2018 转专业数学试题参考答案

1. 当 $0 < b < 1$, 原式 = 1

当 $b = 1$, 原式 = 1

当 $1 < b < 2$, 原式 = $b \lim_{n \rightarrow \infty} \left(b^{-n} + \left(\frac{b}{2} \right)^n + 1 \right)^{\frac{1}{n}} = b$

当 $b = 2$, 原式 = 2

当 $b > 2$, 原式 = $\frac{b^2}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + 2^{-n} b^{-2n} + 2^{-n} b^{-n} \right)^{\frac{1}{n}} = \frac{b^2}{2}$

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n + c^n} = \max \{a, b, c\} \right)$$

$$2. \text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x}{2} + o(x) \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln \left(1 - \frac{x}{2} + o(x) \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{-\frac{x}{2} + o(x)}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}$$

$$3. \text{对于 } n \geq 1, \text{ 有 } \arctan \frac{1}{n} - \arctan \frac{1}{n+2} = \arctan \frac{\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}}{1 + \frac{1}{n(n+2)}} = \arctan \frac{2}{(n+1)^2}$$

$$\sum_{k=2}^n \arctan \frac{2}{k^2} = \sum_{k=1}^{n-1} \arctan \frac{2}{(k+1)^2} = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\arctan \frac{1}{k} - \arctan \frac{2}{k+1} \right)$$

$$= \arctan 1 + \arctan \frac{1}{2} - \arctan \frac{1}{n} - \arctan \frac{1}{n+1}$$

令 $n \rightarrow \infty$ 便得

$$\sum_{n=2}^{\infty} \arctan \frac{2}{n^2} = \arctan 1 + \arctan \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4} + \arctan \frac{1}{2}$$

$$\text{故 } S = \frac{\pi}{4} + \arctan 2 + \arctan \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \pi$$

.

$$4. f(x) = f(x)f(0) - g(x)g(0) \quad g(x) = f(x)g(0) + g(x)f(0)$$

$$f(x) + g(x) = f(x)(f(0) + g(0)) + g(x)(f(0) - g(0))$$

$$f(x)(1 - f(0) - g(0)) = g(x)(f(0) - g(0) - 1)$$

因为 $f(x)$ 、 $g(x)$ 为非常值函数，所以 $f(0) + g(0) = 1$ $f(0) - g(0) = 1$

$$f(0) = 1 \quad g(0) = 0$$

$$f'(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x+t) - f(x)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)(f(t) - f(0))}{t} - \frac{g(x)(g(t) - g(0))}{t} \right) \\ = -g'(0)g(x)$$

$$g'(x) = g'(0)f(x)$$

$$\therefore (f^2(x) + g^2(x))' = 0, f^2(x) + g^2(x) = C, f^2(0) + g^2(0) = 1$$

$$\therefore f^2(x) + g^2(x) = 1$$

5. 证明 1° 必要性. 因 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，因此一致连续，即

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，当 $x', x'' \in [a, b]$ $|x' - x''| < \delta$ 时，便有 $|f'(x')$

$-f'(x'')| < \varepsilon$. 由此 $0 < h < \delta$ 时，任何 $x \in [a, b]$ ，有

$$\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right| = |f'(\xi) - f'(x)| \quad (\xi \in (x, x+h)) < \varepsilon$$

(因为 $|\xi - x| < h < \delta$)

2° 充分性. 已知 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，当 $0 < h < \delta$ 时，

$$\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) \right| < \varepsilon, (\forall x \in [a, b]). \quad \text{因此, } \forall x_0 \in [a, b], 0 < h < \delta \text{ 时, 只}$$

要 $x_0 + h \in [a, b]$ ，便有

$$\left| f'(x_0 + h) - f'(x_0) \right| = \left| f'(x_0 + h) - \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right| \\ \leq \left| f'(x_0 + h) - \frac{f(x_0 + h - h) - f(x_0 + h)}{-h} \right| + \left| \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right| < 2\varepsilon.$$

所以 $f'(x)$ 在 x_0 处连续. 由 x_0 的任意性, 知 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。

$$6.(1) f'_n(x) < 0$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos x_n}{1 - \cos x_n} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n = \frac{1}{2}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{3}$$

2017 转专业数学考试真题

1. 证明数列 $1, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{5}{8}, \frac{8}{13}, \dots$ 存在极限 (不可用单调有界必有极限的结论来证), 且求出该极限。

2. 给定一个数列 $\{x_n\} (n=1, 2, \dots)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x_{n-2}) = 0$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_n - x_{n-1})}{n} = 0.$$

3. 设 $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ f'(0), & x = 0 \end{cases}$, $f(0) = 0$, $f(x)$ 在 \mathbb{R} 上存在二阶导, 问 $g(x)$ 在

\mathbb{R} 上是否存在连续导数, 存在请证明, 不存在请说明理由。

4. 设 $f(x): I \rightarrow R$ 是任一函数, $x_0 \in I$, 证明: $f(x)$ 在 x_0 处可导的充要条件

是: 存在一个函数 $g(x): I \rightarrow R$, 使:

$$(1) f(x) - f(x_0) = g(x)(x - x_0), \forall x \in I$$

$$(2) g(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 处连续且 } g(x_0) = f'(x_0)$$

5. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某领域内有连续的一阶导数, 且 $f'(0) = 0$,

$f''(0)$ 存在, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x^3}$

6. 求最小正数, 使得: $(1 + \frac{1}{x})^{(x+\alpha)} > e (x > 0)$

2017 转专业数学参考答案

1. 记方程 $x^2 + x - 1 = 0$ 的根为 x_0 ($x_0 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$)

$$x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n}$$

$$|x_{n+1} - x_0| = \left| \frac{1}{1+x_n} - x_0 \right| = \left| \frac{x_0^2 + x_0}{1+x_n} - x_0 \right| = \left| \frac{x_0}{1+x_n} \right| |x_n - x_0|$$

$$\because x_n > 0, \therefore \left| \frac{x_0}{1+x_n} \right| < x_0$$

$$\therefore |x_n - x_0| < x_0^{n-1} |x_1 - x_0| \rightarrow 0$$

2. 任给 $\varepsilon > 0$, 则存在自然数 N , 使 $n > N$ 时, 有 $|x_n - x_{n-2}| < \frac{\varepsilon}{2}$.

$$\begin{aligned} x_n - x_{n-1} &= [(x_n - x_{n-2}) - (x_{n-1} - x_{n-3})] + [(x_{n-2} - x_{n-4}) - (x_{n-3} - x_{n-5})] + \cdots + [(x_{N+1} - x_{N-1}) - (x_N - x_{N-1})] |x_n - x_{n-1}| \\ &\leq (n-N) \frac{\varepsilon}{2} + |x_N - x_{N-1}| \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 则有 $\frac{|x_n - x_{n-1}|}{n} \rightarrow 0$, 从而得证.

(本题也可用 *stolz* 公式解)

3 连续, 证明如下

$$g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}, x \neq 0$$

$$g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f'(0)x + \frac{f''(0)x^2}{2} + o(x^2)}{x} - f'(0)}{x} = \frac{f''(0)}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(f'(0) + f''(0)x + o(x)) - (f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)x^2}{2} + o(x)^2)}{x^2} = \frac{f''(0)}{2}$$

$\therefore g(x)$ 在 0 处也连续, $g(x)$ 连续

4 证 必要性. 已知 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A$ 存在, 表明函数

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}, & \text{当 } x \neq x_0 \text{ 时,} \\ A, & \text{当 } x = x_0 \text{ 时} \end{cases} \quad \text{在 } x = x_0 \text{ 处连续, (1) 式成立,}$$

$$f'(x_0) = g(x_0).$$

充分性.

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = (\text{式(1)}) \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = (g \text{ 在 } x_0 \text{ 连续}) g(x_0),$$

故 $f'(x_0)$ 存在.

5 由微分中值定理, 存在 $\ln(1+x) < t < x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(t)(x - \ln(1+x))}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{f'(t) - f'(0)}{t} \times \frac{t}{x} \right) = \frac{1}{2} f''(0)$$

($\lim_{x \rightarrow 0} \frac{t}{x}$ 由夹挤准则可得为 1)

6. 取对数: $\alpha > \frac{1}{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)} - x$, 令 $x = \frac{1}{t}$, $f(t) = \frac{1}{\ln(1+t)} - \frac{1}{t}$. 利用 $f(t)$ 单调

性得出 $f(t) < f(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{\ln(1+t)} - \frac{1}{t} \right] = \frac{1}{2}$ (2013 转专业考试原题)

2015 转专业数学考试真题

1. 不要跟错题过不去

2. 用三种方法计算数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n$

3. 设 $n \in N^*$, $f(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n (x^2 - 1)^n}{dx^n}$, 计算 $f(1)$ 、 $f(-1)$

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导函数 $f'(x)$, 对 (a, b) 内任意 α , 是否可找到 x_1, x_2 ($x_1 < \alpha < x_2$), 使得 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\alpha)$ 成立。若成立证明, 若不成立请举出反例。

5. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某领域内有连续的一阶导数, 且 $f'(0) = 0$, $f''(0)$ 存在, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x^3}$

6. 计算不定积分 $\int \frac{x^2 + 1}{x^4 - x^2 + 1} dx$

7. 计算不定积分 $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$

8. 设 $f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x$, 求证:

(1) 对任意自然数 n , 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $[0, \frac{\pi}{3})$ 内有唯一根;

(2) 设 $x_n \in [0, \frac{\pi}{3})$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{3}$

2015 转专业数学试题参考答案

2. 法一：泰勒展开

法二：夹挤准则 $\frac{1}{n} < \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n-1}$

法三： $\frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}$ 作指数

3. $(x^2 - 1)^n = (x+1)^n(x-1)^n$ ，莱布尼兹公式

4. $x^3, \sin x$ 在 0 处均为反例

5. 由微分中值定理，存在 $\ln(1+x) < t < x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(t)(x - \ln(1+x))}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{f'(t) - f'(0)}{t} \cdot \frac{t}{x} \right) = \frac{1}{2} f''(0)$$

($\lim_{x \rightarrow 0} \frac{t}{x}$ 由夹挤准则可得为 1)

$$6. \int \frac{x^2+1}{x^4-x^2+1} dx = \int \frac{\frac{1}{x^2}+1}{x^2-1+\frac{1}{x^2}} dx = \int \frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+1} = \arctan(x-\frac{1}{x}) + C$$

$$7. \int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}} dx$$

$$\begin{aligned} &= 2x\sqrt{e^x-1} - 4 \int \frac{e^x-1}{e^x} d\sqrt{e^x-1} = 2x\sqrt{e^x-1} - 4\sqrt{e^x-1} + 4 \int \frac{1}{e^x} d\sqrt{e^x-1} \\ &= 2x\sqrt{e^x-1} - 4\sqrt{e^x-1} + 4 \arctan \sqrt{e^x-1} + C \end{aligned}$$

8. (1) $f'_n(x) < 0$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos x_n}{1 - \cos x_n} = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n = \frac{1}{2}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{3}$$

2014 转专业数学考试真题

1. 证明: 若对 $\forall x, y \in (-\infty, +\infty)$, 有 $|f(x) - f(y)| = |x - y|$, 且 $f(0) = 0$, 则 $f(x + y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in (-\infty, +\infty)$

2. 用三种方法计算极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n$

3. 设 n 是正整数, $f(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n (x^2 - 1)^n}{dx^n}$ 计算 $f(1)$ 和 $f(-1)$

4. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有连续的一阶导数, 且 $f'(0) = 0, f''(0)$ 存在, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x^3}$

5. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有定义, 对任意 $x, y \in (0, +\infty)$ 有 $f(xy) = f(x)f(y)$ 且 $f'(1) = n > 0$, 求 $f(x)$

6. 计算不定积分 $\int \frac{x^2 + 1}{x^4 - x^2 + 1} dx$

7 计算不定积分 $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$

8. 设 $\mu \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负, 且 $f''(x) \leq 0, x \in [0, 1]$, 证明:

$$f(t) \geq \mu f(s), \forall t \in [\mu, 1 - \mu], \forall s \in [0, 1]$$

2014 转专业数学参考答案

1. 带入 $f(0)=0$ 可知 $|f(x)|=|x|$ 。注意到 f 为单射, 这两个条件

蕴含着 $f(x)=\pm x$ 假设 $f(1)=1$, 则 $|f(x)-f(1)|=|f(x)-1|$, 现考虑

$x>0$ 。如果有一个 $f(x_0)<0$, 则 $f(x_0)=-x_0$, 则

$|f(x_0)-f(1)|=|-x_0-1|=|x_0-1|$ 。此方程只有唯一解 $x_0=0$, 矛盾。因此

$f(x)>0, x>0$ 。此时由于单射, $f(x)<0, x<0$ 。综上即可知有

$f(x)=x$; 当 $f(1)=-1$, 类似可证 $f(x)=-x$, 于是最终有

$$f(x+y)=f(x)+f(y)$$

5.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left(x\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)\right)-f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x)f\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)-f(x)}{\Delta x} \\ &= f(x) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)-1}{\Delta x} = \frac{f(x)}{x} \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)-1}{\frac{\Delta x}{x}} = \frac{f(x)}{x} f'(1) = n \frac{f(x)}{x} \end{aligned}$$

解得 $f(x)=x^n (x>0)$

8. 令 $m=\frac{t-\mu s}{1-\mu}$, 则易得 (自己证去) $m \in (0,1)$ 。可知 f 连续, 故:

$$f''(x) \leq 0 \Leftrightarrow \forall x_1, x_2 \in [0,1], \forall \lambda \in (0,1) \text{ 有: } f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$$

带入可知:

$$f(t) = f(\mu s + (1-\mu)m) \geq \mu f(s) + (1-\mu)f(m) \geq \mu f(s)$$

2013 转专业数学考试真题

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi\sqrt{n^2+n})$

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt[3]{\cos\sqrt{x}}$

3. 设 $a_n > 0, b_n > 0$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}) > 0$, 证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$ 存在

4. 证明: 若函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 存在数列 $\{x_n\}, x_n \in [a, b]$

$g(x_n) = f(x_{n+1}) \quad n = 1, 2, \dots$, 则 $f(x) = g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有解

5 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = \ln \cos t \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$ 确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{4}}$

6. 求最小正数 α , 使得 $(1+\frac{1}{x})^{x+\alpha} > e \quad (x > 0)$

7. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$, 又 $\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_n$ 是满足 $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = 1$ 的正数。证明: 在 $(0,1)$ 中存在互不相同的数

$\beta_1, \beta_2 \cdots \beta_n$ 满足 $\frac{\alpha_1}{f'(\beta_1)} + \frac{\alpha_2}{f'(\beta_2)} + \cdots + \frac{\alpha_n}{f'(\beta_n)} = 1$

2013 转专业数学试题参考答案

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi\sqrt{n^2+n})$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi\sqrt{n^2+n} - n\pi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2\left(\frac{n\pi}{\sqrt{n^2+n}+n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2\left(\frac{\pi}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}\right) = \sin^2 \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1}\right) = 1 \end{aligned}$$

$$2. \text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x}{2} + o(x)\right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln\left(1 - \frac{x}{2} + o(x)\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{-\frac{x}{2} + o(x)}{x}} = e^{-\frac{1}{2}}$$

3. 证明 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}\right) = 2\delta > \delta > 0$, 则存在 $N \in \mathbf{N}$, 当 $n \geq N$ 时, 有:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \cdot \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} > \delta \Rightarrow \frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}} > \delta a_{n+1}, \text{ 即 } a_{n+1} < \frac{1}{\delta} \left(\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\right)$$

$$\text{于是: } \sum_{n=N}^m a_{n+1} \leq \frac{1}{\delta} \sum_{n=N}^m \left(\frac{a_n}{b_n} - \frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\right) \leq \frac{1}{\delta} \left(\frac{a_N}{b_N} - \frac{a_{m+1}}{b_{m+1}}\right) \leq \frac{1}{\delta} \frac{a_N}{b_N}$$

因而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和有上界, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

4. 证: 反证法. 如果结论不成立, 则连续函数 $F(x) = f(x) - g(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒不为零. 于是 $F(x)$ 恒大于零或恒小于零. 不妨设恒有 $F(x) > 0$, 则它在 $[a, b]$ 上的最小值 $m > 0$. 由

$$f(x_{n+1}) = g(x_n) = g(x_n) - f(x_n) + g(x_{n-1})$$

继续递推得到

$$f(x_{n+1}) = g(x_n) = [g(x_n) - f(x_n)] + [g(x_{n-1}) - f(x_{n-1})] + \cdots + [g(x_2) - f(x_2)] + g(x_1)$$

因此

$$\begin{aligned} f(x_1) - f(x_{n+1}) &= [f(x_n) - g(x_n)] + [f(x_{n-1}) - g(x_{n-1})] + \cdots + [f(x_2) - g(x_2)] \\ &= F(x_n) + F(x_{n-1}) + \cdots + F(x_2) \geq (n-1)m \end{aligned}$$

\$

可推出 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$, 这与 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界矛盾.

$$5. \frac{dy}{dx} = -t \cos t, \frac{d^2 y}{dx^2} \bigg|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{8} \pi$$

$$6. \text{取对数: } \alpha > \frac{1}{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)} - x, \text{ 令 } x = \frac{1}{t}, f(t) = \frac{1}{\ln(1+t)} - \frac{1}{t}. \text{ 利用 } f(t) \text{ 单调}$$

$$\text{性得出 } f(t) < f(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{\ln(1+t)} - \frac{1}{t} \right] = \frac{1}{2}$$

$$7. \text{设 } y_k = \sum_{i=1}^k X_i, \text{ 由介值定理, } \exists x_k, y_k = f(x_k), \text{ 令 } x_0 = 0, x_n = 1$$

$$\text{由中值定理, } \exists \beta_i, \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} = f'(\beta_i), \therefore \frac{y_{i+1} - y_i}{f'(\beta_i)} = x_{i+1} - x_i$$

令 $i = 0, 1, \dots, n-1$ 并累加得证

2012 转专业数学考试真题

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$

2. 证明：对任意 $x, y \in R$ 有 $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^2$ 则对每个 $n \in N, \forall a, b \in R$, 有: $|f(a) - f(b)| \leq \frac{1}{n} |a - b|^2$ 。

3. 设 $a_n > 0, b_n > 0$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1} b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) > 0$ 证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k$ 存在

4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{x-1}}$ 。

5. $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有定义, 对于任意 $x, y \in (0, +\infty)$ 有:

$f(xy) = f(x)f(y), f'(1) = n > 0$, 求 $f(x)$ 。

6. 求最小正数 a , 使得: $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+a} > e (x > 0)$ 。

7. 计算不定积分 $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$ 。

8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 又

有 $\sum_{k=1}^n \alpha_k = 1$, 且 $\alpha_k > 0$ 。这么: 在 $(0, 1)$ 中存在互不相同的数

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 使得:

$$\frac{\alpha_1}{f'(\beta_1)} + \frac{\alpha_2}{f'(\beta_2)} + \dots + \frac{\alpha_n}{f'(\beta_n)} = 1$$

2012 转专业数学试题参考答案

1.

法一. 注意斯特林公式 (Stirling's approximation):

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \text{ 可得答案 1.}$$

法二. 利用夹挤准 (考虑 n^n 的放缩)

法三. 对于 α^β 进行求解, 利用取对数换成 $e^{\beta \ln \alpha}$, 此题研究分了的

变化, 可以用 Stolz 定理求解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n!}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n! - \ln(n-1)!}{n^2 - (n-1)^2} = 0$

2.

取 $\lim \Delta x = 0, y = x + \Delta x$, 可得 $|f(x) - f(x + \Delta x)| = (\Delta x)^2, f(x)$ 连续;

$\frac{|f(x) - f(x + \Delta x)|}{|\Delta x|} = \Delta x$, 进行分类讨论可知 $f(x)$ 可导。注意到此题

$$f'(x) = 0 \Rightarrow f(x) \equiv C.$$

3.

(此题略微超纲, 涉及级数相关的知识)

网页搜索: 库默尔判别法。

4.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{e^x - 1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)}{e^x - 1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln\left(1 - \frac{x}{2} + o(x)\right)}{x + o(x)}} = e^{\frac{-1}{2}}$$

5.

取 $y = \frac{x + \Delta x}{x}, \lim \Delta x = 0$, 则有 $f(x \cdot y) = f\left(x \cdot \frac{x + \Delta x}{x}\right) = f(x)f\left(\frac{x + \Delta x}{x}\right)$

$\Rightarrow f(x+\Delta x)-f(x)=f(x)\left[1-f\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)\right]$, 由题条件易得 $f(1)=1$, 则

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=f(x)\frac{f(1)-f\left(1+\frac{\Delta x}{x}\right)}{\frac{\Delta x}{x}\cdot x}=f(x)\frac{f'(1)}{x}$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{n}{x}\Rightarrow(\ln(f(x)))'=n(\ln x)'\Rightarrow f(x)=x^n \quad (f(1)=1).$$

6.

取对数: $\alpha > \frac{1}{\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)} - x$, 令 $x=\frac{1}{t}, f(t)=\frac{1}{\ln(1+t)} - \frac{1}{t}$. 利用 $f(t)$ 单调性

$$\text{得出 } f(t) < f(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[\frac{1}{\ln(1+t)} - \frac{1}{t} \right] = \frac{1}{2}$$

7. 分部换元就好了, 不定积分没意思。

8. $y_0=0, y_i=\sum_{k=1}^i \alpha_k, 0=y_0 < y_1 < \dots < y_n=1, t_0=0, t_n=1$ 在 $[0,1]$ 上对 $f(x)$ 介值

定理得到 $f(t_1)=y_1$ 以及 $[t_1,1]$ 上介值定理, 最后得到 $f(t_i)=y_i$

在任意一个区间上 $[t_{i-1}, t_i]$ 上有拉格朗日中值: $\frac{y_i - y_{i-1}}{f'(\beta_i)} = t_i - t_{i-1}$ 求和得

到答案。

2011 转专业数学考试真题

1. 证明：若对任意 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ 有 $|f(x) - f(y)| \leq (x - y)^2$ ，则对每个 $n \in \mathbb{N}$,

$$\forall a, b \in (-\infty, +\infty), |f(a) - f(b)| \leq \frac{1}{n}(a - b)^2$$

2. 设 $x_n = (1+a)(1+a^2) \cdots (1+a^{2^n})$ 其中 $|a| < 1$ ，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(x+1)}{x} \right)^{\frac{1}{e^x - 1}}$

4. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续， $f(0) = 1$, $g(x) = \int_0^{\sin x} f(tx^2) dt$ ，求 $g'(x)$

并求 $g'(0)$

5. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有定义，对任意 $x, y \in (0, +\infty)$ 有 $f(xy) = f(x)f(y)$ ，且

$f'(1) = n > 0$ ，求 $f(x)$

6. 计算不定积分 $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}} dx$

7. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$, 又 $\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_n$ 是满足 $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = 1$ 的正数。证明: 在 $(0,1)$ 中存在互不相同的数

$\beta_1, \beta_2 \cdots \beta_n$ 满足 $\frac{\alpha_1}{f'(\beta_1)} + \frac{\alpha_2}{f'(\beta_2)} + \cdots + \frac{\alpha_n}{f'(\beta_n)} = 1$

8. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可微, $f(0)=0, 0 \leq f'(x) \leq 1$, 则

$$\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \geq \int_0^1 f^3(x) dx$$

9. 证明: 对任意正整数 n , 有 $\frac{2}{3}n\sqrt{n} < \sqrt{1} + \sqrt{2} + \cdots + \sqrt{n} < \frac{4n+3}{6}\sqrt{n}$

2011 转专业数学试题参考答案

1. 取 $\lim \Delta x = 0, y = x + \Delta x$, 可得 $|f(x) - f(x + \Delta x)| = (\Delta x)^2, f(x)$ 连续:

$\frac{|f(x) - f(x + \Delta x)|}{|\Delta x|} = \Delta x$, 进行分类讨论可知 $f(x)$ 可导。注意到此题

$$f'(x) = 0 \Rightarrow f(x) \equiv C.$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-a} (1-a)(1+a)(1+a^2) \cdots (1+a^{2^n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1-a} (1-a^{2^{n+1}}) = \frac{1}{1-a}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{e^x-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right)}{e^x-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln\left(1-\frac{x}{2}+o(x)\right)}{x+o(x)}} = e^{-\frac{1}{2}}$$

$$4. g(x) = \frac{1}{x^2} \int_0^{x^2 \sin x} f(tx^2) d(tx^2)$$

$$g'(x) = -\frac{2}{x^3} \int_0^{x^2 \sin x} f(tx^2) d(tx^2) + \frac{1}{x^2} f(x^2 \sin x) (x^2 \cos x + 2x \sin x)$$

$$g'(0) = \frac{g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2 \sin x} f(tx^2) d(tx^2)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2 \sin x) (x^2 \cos x + 2x \sin x)}{3x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2 \sin x) (x^2 \cos x + 2x \sin x)}{3x^2} = f(0) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 \cos x + 2x \sin x)}{3x^2} = 1$$

$$5. \text{取 } y = \frac{x + \Delta x}{x}, \lim \Delta x = 0, \text{ 则有 } f(x \cdot y) = f\left(x \cdot \frac{x + \Delta x}{x}\right) = f(x) f\left(\frac{x + \Delta x}{x}\right)$$

$$\Rightarrow f(x + \Delta x) - f(x) = f(x) \left[1 - f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) \right], \text{ 由题目条件易得 } f(1) = 1, \text{ 则}$$

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f(x) \frac{f(1) - f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{\frac{\Delta x}{x} \cdot x} = f(x) \frac{f'(1)}{x}$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{n}{x} \Rightarrow (\ln(f(x)))' = n(\ln x)' \Rightarrow f(x) = x^n \quad (f(1) = 1.)$$

$$6. \int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x - 1}} dx$$

$$= 2x\sqrt{e^x - 1} - 4 \int \frac{e^x - 1}{e^x} d\sqrt{e^x - 1} = 2x\sqrt{e^x - 1} - 4\sqrt{e^x - 1} + 4 \int \frac{1}{e^x} d\sqrt{e^x - 1}$$

$$= 2x\sqrt{e^x-1} - 4\sqrt{e^x-1} + 4\arctan\sqrt{e^x-1} + C$$

7. 设 $y_k = \sum_{i=1}^k X_i$, 由介值定理, $\exists x_k, y_k = f(x_k)$, 令 $x_0 = 0, x_n = 1$ 由中值

定理, $\exists \beta_i, \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} = f'(\beta_i), \therefore \frac{y_{i+1} - y_i}{f'(\beta_i)} = x_{i+1} - x_i$ 令 $i = 0, 1, \dots, n-1$ 并

累加得证

8. 证明 因为 $0 < f'(x) \leq 1, f(0) = 0$, 则 $f(x) > f(0) = 0$.

令 $F(t) = \left(\int_0^t f(x) dx \right)^2 - \int_0^t f^3(x) dx, t \in [0, 1]$. 则 $F(0) = 0$, 且

$$F'(t) = f(t) \left(2 \int_0^t f(x) dx - [f(t)]^2 \right) \triangleq f(t)G(t)$$

其中 $G(t) = 2 \int_0^t f(x) dx - [f(t)]^2$, 则 $G(0) = 0$ 和 $G'(t) = 2f(t)[1 - f'(t)] \geq 0$,

因此 $G(t) \geq 0$. 于是 $F'(t) = f(t)G(t) \geq 0$, 所以 $F(t) \geq 0$, 特别 $F(1) \geq 0$. 所

以原不等式成立.

9. 证明 对于正整数 K 及 $K-1 \leq x < K$, 我们有 $\sqrt{K} > \sqrt{x}$,

所以 $\sqrt{K} > \int_{K-1}^K \sqrt{x} dx$, 相加则得

$$\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n} > \int_0^n \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} n^{3/2}.$$

因为 \sqrt{x} 为严格上凸函数, 则对应于区间 $[K-1, K]$ 上的

曲边梯形面积 大于对应弦的梯形面积 (附图 2.5), 即

$$\frac{1}{2}(\sqrt{K-1} + \sqrt{K}) < \int_{K-1}^K \sqrt{x} dx$$

所以

$$\begin{aligned} \sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n} &= \frac{1}{2}(\sqrt{0} + \sqrt{1}) + \frac{1}{2}(\sqrt{1} + \sqrt{2}) + \dots + \frac{1}{2}(\sqrt{n-1} + \sqrt{n}) + \frac{1}{2}\sqrt{n} \\ &< \int_0^n \sqrt{x} dx + \frac{1}{2}\sqrt{n} = \frac{4n+3}{6}\sqrt{n} \end{aligned}$$



附图 2.5