

# 华中科技大学 2023-2024 学年第二学期“微积分（一）”考试试卷（A 卷）

一、单项选择题（每小题 3 分，6 个小题共 18 分，将结果涂在答题卡上。）

1. 已知直线  $L_1: x+1=y=\frac{z-1}{2}$  和  $L_2: x=\frac{y+1}{3}=\frac{z-2}{3}$ ，则这两直线的位置关系是【 】.

A. 相交 B. 平行 C. 重合 D. 异面

答案：A

解析：

由于两直线的方向向量分别为  $\tau_1: \{1,1,2\}$  和  $\tau_2: \{1,3,3\}$ ，显然不平行，故两直线不可能平行，更不可能重合，所以答案 B, C 错误.

在两直线上分别取点  $M_1: (-1,0,1)$ ，和  $M_2: (0,-1,2)$ ，所以  $\overrightarrow{M_1M_2}: \{1,-1,1\}$ ，从而混合积

$$[\tau_1, \tau_2, \overrightarrow{M_1M_2}] = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \text{ 故两直线共面，所以两直线相交. 故选 A.}$$

2. 设函数  $F(x,y,z) = xy - z \ln y + e^{xz} - 1$  在点  $P(0,1,1)$  附近满足方程  $F(x,y,z) = 0$ ，则下列说法错误的是【 】.

A.  $F(x,y,z)$  在  $P$  点可微 B.  $\frac{\partial y}{\partial z}(P) = 0$  C.  $\frac{\partial y}{\partial x}(P) = -2$  D.  $\frac{\partial x}{\partial y}(P) = \frac{1}{2}$

答案：C

解析：

由于  $F_x(x,y,z) = y + ze^{xz}$ ， $F_y(x,y,z) = x - \frac{z}{y}$ ， $F_z(x,y,z) = -\ln y + xe^{xz}$  处处连续，故  $F(x,y,z)$  在  $P$  点

可微；且  $F_x(P) = 2$ ， $F_y(P) = -1$ ， $F_z(P) = 0$ ；所以

$$\frac{\partial y}{\partial z}(P) = -\frac{F_z(P)}{F_y(P)} = 0, \quad \frac{\partial y}{\partial x}(P) = -\frac{F_x(P)}{F_y(P)} = 2, \quad \frac{\partial x}{\partial y}(P) = -\frac{F_y(P)}{F_x(P)} = \frac{1}{2}.$$

所以 C 是错误的，故选 C.

3. 设  $D$  是  $xy$  面上以点  $(1,1), (-1,1), (-1,-1)$  为顶点的三角形区域， $D_1$  是  $D$  在第一象限的部分，则

$$\iint_D (xy + \cos x \sin y) d\sigma = \text{【 】}.$$

A.  $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y d\sigma$  B.  $2 \iint_{D_1} xy d\sigma$  C.  $\iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) d\sigma$  D. 0

答案：A

解析：因为区域  $D$  可以分为以  $x$  轴对称的区域和以  $y$  轴对称的区域的并，故考虑二重积分的偶倍奇零.

由于  $xy$  既是  $x$  的奇函数，又是  $y$  的奇函数，所以  $\iint_D xy d\sigma = 0$ ；

而  $\cos x \sin y$  是  $x$  的偶函数，而是  $y$  的奇函数，所以  $\iint_D \cos x \sin y d\sigma = 2 \iint_{D_1} \cos x \sin y d\sigma$ ；

从而由积分的分项性质可知

$$\iint_D (xy + \cos x \sin y) d\sigma = \iint_D xy d\sigma + \iint_D \cos x \sin y d\sigma = 2 \iint_{D_1} \cos x \sin y d\sigma.$$

所以 A 选项正确.

4. 已知函数  $f(x) = 1 - x$  ( $0 \leq x \leq \pi$ ),  $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$  ( $-\infty < x < +\infty$ ), 其中  $b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx$

( $n = 1, 2, \dots$ ), 则  $S(-\frac{\pi}{2}) =$  【   】.

A.  $-\frac{\pi}{2} - 1$  B.  $-\frac{\pi}{2} + 1$  C.  $\frac{\pi}{2} - 1$  D.  $\frac{\pi}{2} + 1$

答案: C

解析:

由于  $S(x)$  是以  $2\pi$  为周期的奇函数, 所以  $S(-\frac{\pi}{2}) = -S(\frac{\pi}{2}) = -(1 - \frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} - 1$ .

5. 设  $\Gamma$  是球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  与平面  $x + y + z = 0$  的交线, 则  $\oint_{\Gamma} (y + 2z) ds =$  【   】.

A.  $\pi$  B.  $2\pi$  C.  $-\pi$  D. 0

答案: D

解析:

由轮换对称性可知  $\oint_{\Gamma} x ds = \oint_{\Gamma} y ds = \oint_{\Gamma} z ds$ , 以及等量代换得

$$\oint_{\Gamma} (y + 2z) ds = \oint_{\Gamma} (x + y + z) ds = 0.$$

6. 关于级数的描述, 下列命题中正确的是 【   】.

A. 若  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  收敛. B. 若  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  收敛.  
C. 若  $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$  收敛. D. 若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$  收敛, 则  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n}$  收敛.

答案: D

解析:

A 错误, 反例:  $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ ; B 错误, 反例为  $u_n = \frac{1}{n}$ ; C 错误, 反例为  $u_n = \frac{1}{n}, v_n = -\frac{1}{n}$ ;

D 正确, 因为  $\frac{|a_n|}{n} \leq \frac{1}{2}(a_n^2 + \frac{1}{n^2})$ , 故由正项级数的比较审敛法可知结论成立.

二、填空题 (每小题 4 分, 4 个小题共 16 分, 将计算结果写在答题卡上.)

7. 设球面  $S: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$  ( $R > 0$ ), 则  $\oiint_S (\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4}) dS =$  \_\_\_\_\_.

答案:  $\frac{13}{9} \pi R^4$ .

解析: 由轮换对称性知  $\oiint_S x^2 dS = \oiint_S y^2 dS = \oiint_S z^2 dS$ ,

和等量代换, 有

$$\oiint_S (\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4}) dS = \frac{13}{36} \oiint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{13}{36} R^2 \cdot 4\pi R^2.$$

8. 曲线  $\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ 2x^2 + 2y^2 - z^2 = 0 \end{cases}$  在点  $P_0(1,1,2)$  的法平面方程为\_\_\_\_\_.

答案:  $y = x$

解析:

已知曲线的切矢量为  $\{2, 2, -1\} \times \{1, 1, -1\} = \{-1, 1, 0\}$ , 故所求法平面为

$$-(x-1) + (y-1) = 0, \text{ 化简为 } y = x.$$

9. 设矢量函数  $\{x^{2023} + 2xy^3, ax^2y^2 - y^{2024}\}$  在整个  $xoy$  平面内是某一函数的梯度, 则  $a =$ \_\_\_\_\_.

答案:  $a = 3$

解析: 根据已知, 可得

$$\frac{\partial}{\partial y}(x^{2023} + 2xy^3) = \frac{\partial}{\partial x}(ax^2y^2 - y^{2024}), \text{ 即 } 6xy^2 = 2axy^2, \text{ 所以 } a = 3.$$

10. 幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!2^n} x^{2n+1}$  的和函数为\_\_\_\_\_.

答案:  $xe^{-x^2/2}, -\infty < x < \infty$

解析:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!2^n} x^{2n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{-x^2}{2}\right)^n = xe^{-x^2/2}, -\infty < x < \infty.$$

三、基本计算题 (每小题 7 分, 6 个小题共 42 分, 必须写出主要计算过程.)

11. 一直线过点  $B(1,2,3)$  且与矢量  $\vec{s}(6,6,7)$  平行, 求点  $A(3,4,2)$  到此直线的距离  $d$ .

解 1  $\overrightarrow{AB} = \{2, 2, -1\}$ , 所求距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{AB} \times \vec{s}|}{|\vec{s}|} = \frac{1}{11} \left\| \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & -1 \\ 6 & 6 & 7 \end{vmatrix} \right\| = \frac{1}{11} |\{20, -20, 0\}| = \frac{20\sqrt{2}}{11}.$$

解 2 此直线的参数方程为

$$x = 1 + 6t, y = 2 + 6t, z = 3 + 7t, -\infty < t < +\infty;$$

则 B 到直线上的任一点的距离的平方为

$$d(t)^2 = (2-6t)^2 + (2-6t)^2 + (-1-7t)^2 = 121t^2 - 34t + 9 = 121\left(t - \frac{17}{121}\right)^2 + \frac{800}{121} \geq \frac{800}{121},$$

故根据点到直线的距离的定义可知, 所求距离为

$$d = \min d(t) = \sqrt{\frac{800}{121}} = \frac{20\sqrt{2}}{11}.$$

12. 设二元函数  $z = (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{x}{y}}$ , 求  $dz$  以及  $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(0,1)}$ .

解 因为偏导数  $z_x = 2xe^{-\arctan \frac{x}{y}} - (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{x}{y}} \frac{1/y}{1+(x/y)^2} = (2x-y)e^{-\arctan \frac{x}{y}}$ ,

和  $z_y = 2ye^{-\arctan \frac{x}{y}} - (x^2 + y^2)e^{-\arctan \frac{x}{y}} \frac{-x/y^2}{1+(x/y)^2} = (2y+x)e^{-\arctan \frac{x}{y}}$  处处连续, 所以函数处处可微, 且

$$dz = e^{-\arctan \frac{x}{y}} [(2x-y)dx + (2y+x)dy].$$

$$\text{其次, 有 } \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(0,1)} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{z_x(0,y) - z_x(0,1)}{y} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{-y+1}{y-1} = -1.$$

或者

$$\text{由 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^{-\arctan \frac{x}{y}} \left[ -1 - (2x-y) \frac{-x}{x^2 + y^2} \right], \text{ 可得 } \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(0,1)} = -1.$$

13. 求曲线积分  $I = \int_L (y^2 - \cos y)dx + x \sin y dy$ , 其中有向曲线  $L$  为沿着正弦曲线  $y = \sin x$ , 由点  $O(0,0)$  到点  $A(\pi,0)$ .

解 1 (凑微分法) 因为  $I = \int_L (y^2 - \cos y)dx + x \sin y dy = \int_L y^2 dx - \int_L d(x \cos y)$ ,

$$\int_L y^2 dx = \int_0^\pi \sin^2 x dx = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}, \quad \int_L d(x \cos y) = (x \cos y) \Big|_{(0,0)}^{(\pi,0)} = \pi,$$

$$\text{所以 } I = -\frac{\pi}{2}.$$

解 2 (Green 法) 补曲线  $L_1: y=0, x: \pi \rightarrow 0$ . 记  $D = \{(x,y) | 0 \leq y \leq \sin x, 0 \leq x \leq \pi\}$ , 则利用格林公式有

$$\begin{aligned} I &= \int_{L+L_1} (y^2 - \cos y)dx + x \sin y dy - \int_{L_1} (y^2 - \cos y)dx + x \sin y dy \\ &= -\iint_D (-2y)dx dy + \int_{L_1} dx \\ &= \int_0^\pi dx \int_0^{\sin x} 2y dy - \int_0^\pi dx \\ &= -\frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

解 3 (参数化) 因为  $I = \int_0^\pi [\sin^2 x - \cos(\sin x) + x \sin(\sin x)] \cos x dx$ ,

$$\int_0^\pi x \sin(\sin x) \cos x dx = -x \cos(\sin x) \Big|_0^\pi + \int_0^\pi \cos(\sin x) dx = -\pi + \int_0^\pi \cos(\sin x) dx,$$

$$\int_0^\pi \sin^2 x dx = \frac{\pi}{2},$$

$$\text{所以 } I = -\frac{\pi}{2}.$$

14. 求由曲面  $2z = x^2 + y^2$  和  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  所围成的立体区域  $\Omega$  的体积  $V$ .

解 1 (投影法或先一后二法)

$V$  在  $xy$  面的投影区域为  $D = \{(x, y) | 0 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$ , 则  $V: (x, y) \in D, \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ , 故

$$V = \iint_D dx dy \int_{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}^{\sqrt{x^2+y^2}} dz = \iint_D [\sqrt{x^2+y^2} - \frac{1}{2}(x^2+y^2)] dx dy = 2\pi \int_0^2 \left(r - \frac{1}{2}r^2\right) r dr = \frac{4\pi}{3}.$$

解 2 (截面法或先二后一法)

$$V = \int_0^2 dz \iint_{D_z} dx dy = \pi \int_0^2 (2z - z^2) dz = \frac{4\pi}{3}.$$

解 3 (柱面坐标 1, 先  $z$  后  $r$ )

因为  $V: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq 2, \frac{1}{2}r^2 \leq z \leq r$ , 所以

$$V = 2\pi \int_0^2 r dr \int_{\frac{1}{2}r^2}^r dz = 2\pi \int_0^2 \left(r - \frac{1}{2}r^2\right) r dr = \frac{4\pi}{3}.$$

解 4 (柱面坐标 1, 先  $r$  后  $z$ )

因为  $V: 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq 2, z \leq r \leq \sqrt{2z}$ , 所以

$$V = 2\pi \int_0^2 dz \int_z^{\sqrt{2z}} r dr = 2\pi \int_0^2 \left(z - \frac{1}{2}z^2\right) dz = \frac{4\pi}{3}.$$

15. 设  $S$  是上半球面  $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$  与锥面  $z = \sqrt{x^2+y^2}$  围成的闭曲面的外侧。 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$  是  $S$  外法线的方向余弦, 求积分

$$I = \iiint_S [(x^3 + z^2) \cos \alpha + (y^3 + x^2) \cos \beta + (z^3 + y^2) \cos \gamma] dS.$$

解 记  $S$  围成的区域为  $\Omega$ . 则

$$I = \oiint_S (x^3 + z^2) dy dz + (y^3 + x^2) dz dx + (z^3 + y^2) dx dy \quad (\text{转化为 II 型曲面积分})$$

$$= 3 \iiint_{\Omega} (x^3 + y^2 + z^2) dx dy dz \quad (\text{Gauss 公式转化为三重积分})$$

$$= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 \rho^4 d\rho \quad (\text{球面坐标系下积分})$$

$$= 3 \cdot 2\pi \cdot \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \frac{1}{5} = \frac{3(2-\sqrt{2})}{5} \pi. \quad (\text{计算})$$

16. 将函数  $f(x) = \frac{1}{(4-x)^2}$  展开成关于  $x$  的幂级数, 并求  $f^{(20)}(0)$ .

解 因为  $f(x) = \left(\frac{1}{4-x}\right)'$ , 和  $\frac{1}{4-x} = \frac{1}{4} \frac{1}{1-x/4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{4^{n+1}}, |x| < 4$ , (公式)

$$\text{故 } f(x) = \left(\frac{1}{4-x}\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{4^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)x^n}{4^{n+2}}, \quad |x| < 4. \quad (\text{逐项求导})$$

进而有  $f^{(20)}(0) = 20! \cdot \frac{21}{4^{22}} = \frac{21!}{4^{22}}$ . (注意公式  $f^{(n)}(0) = n! a_n$ )

注意：如果直接展开幂级数，需要证明余项趋于零，否则扣 2 分；没有收敛域扣 1 分。

四、综合题（每小题 7 分，2 个小题共 14 分，必须写出主要过程。）

17. 设函数  $u = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ ，空间曲线  $L: x = t, y = 2t^2, z = -2t^4$ ， $P_0(1, 2, -2)$  为曲线  $L$  上的一点，求  $u$  在点  $P_0$

处沿着曲线  $L$  的切向量方向（增大的方向） $\vec{l}$  的方向导数  $\left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_{P_0}$ ，并求函数  $u$  在点  $P_0$  处的最大变化率。

解 注意  $P_0(1, 2, -2)$  对应的  $t_0 = 1$ ，此时  $\vec{l} = \{1, 4, -8\}$  且  $\vec{l}^\circ = \frac{1}{9}\{1, 4, -8\}$ 。

$$\text{记 } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \text{ 则 } u_x = \frac{1}{r} - \frac{x^2}{r^3}, u_y = -\frac{xy}{r^3}, u_z = -\frac{xz}{r^3}.$$

由于函数  $u(x, y, z)$  的一阶偏导在  $P_0(1, 2, -2)$  点处连续，所以

$$\left. \frac{\partial u}{\partial \vec{l}} \right|_{P_0} = \frac{1}{9} \left( \frac{\partial u}{\partial x}(P_0) \cdot 1 + \frac{\partial u}{\partial y}(P_0) \cdot 4 + \frac{\partial u}{\partial z}(P_0) \cdot (-8) \right) = \frac{1}{9} \left( \frac{8}{27} + \frac{(-2)}{27} \cdot 4 + \frac{2}{27} \cdot (-8) \right) = -\frac{16}{243}.$$

$$\text{函数 } u \text{ 在点 } P_0 \text{ 处的最大变化率为 } |\nabla u(P_0)| = \sqrt{\left(\frac{8}{27}\right)^2 + \left(\frac{(-2)}{27}\right)^2 + \left(\frac{2}{27}\right)^2} = \frac{6\sqrt{2}}{27}.$$

18. 设函数  $f(x, y)$  的全微分为  $df(x, y) = (2ax + by)dx + (2by + ax)dy$  ( $a, b$  为常数)，且  $f(0, 0) = -3$ ， $f_x(1, 1) = 3$ ，

求点  $(-1, -1)$  到曲线  $f(x, y) = 0$  上的点的距离的最大值。

分析：前半部分积分域路径无关，求解全微分方程；后半部分求条件极值。

解 由题意可知

$$f_x(x, y) = 2ax + by, f_y(x, y) = 2by + ax,$$

所以  $f_{xy}(x, y) = 2a = f_{yx}(x, y) = 2b$ ，即  $a = b$ ；

再由条件  $f_x(1, 1) = 3$ ，可知  $2a + b = 3$ ，从而  $a = b = 1$ 。

$$\text{进而 } f_x(x, y) = 2x + y, f_y(x, y) = x + 2y, df(x, y) = (2x + y)dx + (2y + x)dy = d(x^2 + xy + y^2),$$

也就是

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + C. \text{ 将 } f(0, 0) = -3 \text{ 代入，可得 } f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3.$$

点  $(-1, -1)$  到曲线  $f(x, y) = 0$  上的点的距离的最大值的转化为函数  $d^2(x, y) = (x+1)^2 + (y+1)^2$  在条件  $f(x, y) = 0$  下的条件极值。

$$\text{设 } L(x, y, \lambda) = (x+1)^2 + (y+1)^2 + \lambda(x^2 + xy + y^2), \text{ 令 } \nabla L(x, y, \lambda) = \vec{0}, \text{ 即}$$

$$\begin{cases} L_x = 2(x+1) + 2\lambda x + \lambda y = 0, \\ L_y = 2(y+1) + 2\lambda y + \lambda x = 0, \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + xy - 3 = 0. \end{cases}$$

可解得驻点为  $(1,1)$ ,  $(-1,-1)$ ,  $(-1,2)$ ,  $(2,-1)$ , 代入有  $d^2(1,1)=8$ ,  $d^2(-1,-1)=0$ ,  $d^2(2,-1)=d^2(-1,2)=9$ ,

比较后可知所求距离的最大值为  $d(2,-1)=d(-1,2)=3$ .

五、证明题 (每小题 5 分, 2 个小题共 10 分, 必须写出主要过程.)

19. 设  $D = \{(x,y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ , 证明:  $1 \leq \iint_D (\cos y^2 + \sin x^2) dx dy \leq \sqrt{2}$ .

证法 1 由轮换对称性, 可知

$$\iint_D (\cos y^2 + \sin x^2) dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (\cos y^2 + \sin x^2 + \cos x^2 + \sin y^2) dx dy;$$

由于  $1 \leq \sin x^2 + \cos x^2 = \sqrt{2} \sin(x^2 + \frac{\pi}{4}) \leq \sqrt{2}$ ,  $1 \leq \sin y^2 + \cos y^2 \leq \sqrt{2}$ ,

所以由积分的比较性质知,  $1 = \iint_D dx dy \leq \iint_D (\cos y^2 + \sin x^2) dx dy \leq \sqrt{2} \iint_D dx dy = \sqrt{2}$ .

证法二

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (\cos y^2 + \sin x^2) dx dy = \int_0^1 \cos y^2 dy + \int_0^1 \sin x^2 dx \\ &= \int_0^1 (\cos x^2 + \sin x^2) dx = \sqrt{2} \int_0^1 \sin\left(x^2 + \frac{\pi}{4}\right) dx, \end{aligned}$$

$$\text{当 } 0 \leq x \leq 1 \text{ 时, } \frac{\sqrt{2}}{2} \leq \sin(x^2 + \frac{\pi}{4}) \leq 1$$

所以  $1 \leq I \leq \sqrt{2}$ .

20. 设  $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$  ( $n=2,3,\dots$ ), 证明:  $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$  收敛.

证 由于  $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + o(x)$ ,  $x \rightarrow 0$ , 所以当  $n \rightarrow \infty$  时, 有

$$a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+(-1)^n/n}} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{(-1)^n}{n} + o\left(\frac{(-1)^n}{n}\right)\right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^{3/2}} + o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right),$$

由交错级数的 Leibniz 审敛法可知  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$  收敛;

又由于  $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^{3/2}} - o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right) \sim \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^{3/2}}$ , 且  $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^{3/2}}\right)$  收敛, 可知  $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{n^{3/2}} - o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)\right)$  收敛,

故由级数的线性性质知,  $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$  收敛.

$$\begin{aligned}\text{证法二} \quad S_{2n} &= \sum_{k=2}^{2n+1} a_k = \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{2n+1}} - \frac{1}{\sqrt{2n}} \\ &= \left( \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + \left( \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{4}} \right) + \cdots + \left( \frac{1}{\sqrt{2n+1}} - \frac{1}{\sqrt{2n}} \right) < 0,\end{aligned}$$

$$\text{又 } S_{2n} = -\frac{1}{\sqrt{2}} + \left( \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} \right) + \left( \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{6}} \right) + \cdots + \left( \frac{1}{\sqrt{2n-1}} - \frac{1}{\sqrt{2n}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2n+1}} > -\frac{1}{\sqrt{2}},$$

所以  $\{S_{2n}\}$  单调递减有下界, 故  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n}$  存在.

$$\text{因为 } S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+2}, \text{ 而 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+3}} = 0, \text{ 所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n},$$

因而  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  存在, 故级数  $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$  收敛.