

Muskat von Alexandria

Alte, weiße Traubensorte aus Griechenland, die nachweislich 1799 auch in der Wetterau angebaut wurde und hier unter den Namen *Zibeben-Muskateller*, *Muskateller von Jerusalem* und *Alexandrinischer Muskateller* bekannt war.

Herkunft und Verbreitung

Der Muskat von Alexandria gehört zur großen Muskatellerfamilie und ist eine natürliche Kreuzung aus:

Elternteil 1: Heptaklio (= Axina a tres bias)

Elternteil 2: Maskat à petits grains blanc (Gelber Muskateller, Zeile 8)

Beide Elternteile sind alte Rebsorten, die schon in der Antike in Griechenland und Sardinien gezogen worden sind. Axina á tres bias ist eine einheimische Rebsorte Sandiniens.



Quelle: _ Pierre Viala et Victor Vermorel: [Ampélographie: Traité général de viticulture](#), Paris 1905, Bd.

Merkmale und Nutzung

Die Blüte der Rebe hat als Zwitter männliche und weibliche Fortpflanzungsorgane.

Spätreifend, etwa Anfang Oktober, ca. dreieinhalb Wochen nach dem Gutedel. Er bildet große Trauben mit großen Beeren, mit einem meist enorm hohen Zuckergehalt. Die süßen Beeren werden als Tafeltrauben verwendet und zu Rosinen getrocknet, der Traubensaft wird trocken als Weißwein und süß als Süß- und Dessertwein mit einem intensiven Muskatgeschmack gekeltert. Das Aroma des Weins ist geprägt von Düften nach Aprikose, Birne, Jasmin, Melone, Orangenblüte und Pfirsich.

Weitere Informationen

Die Rebsorte ist ausgesprochen hitze- und trockenheitsresistent. Weltweit betrug 2010 die Anbaufläche 26.515 Hektar und ist damit die bedeutendste Traubensorte zur Produktion von Rosinen. In der Flora der Wetterau heißt es 1799: „Er wird nicht immer bei uns reif und erfordert gelinde Winter und warme Mauern, oder Wände der Häuser, wenn er gedeihen soll“.



Standort im Rebsortenarchiv: **Zeile 3**