

土壤属性图质控问题反馈—邢台市襄都区

一、成果组织形式反馈

1、成果组织形式、目录结构应按规范要求进行命名，如水系是 SHX。

第三次全国土壤普查成果库.gdb

DCYD

DL

DLTB2023

SX

TRLX

XJQY

XJXZQ

类型	目录结构和名称
文件夹	——行政区划代码6位+县级行政区名称//如“110108北京市海淀区”

邢台市 > 130500邢台市 > 130502襄都区 > 属性图 > 在 属性图 中搜索

2、提交的所有成果中存在部分内容缺失。

文字成果

文件夹

文档

文档

文字成果

——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf

——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc

属性图 > 成果数据 > 文字成果 在 文字成果 中搜索


排序

查看

预览

名称	修改日期	类型
130502襄都区土壤属性与制图专题报告	2026/6/30 14:09	DOCX 文档
~\$0502襄都区土壤属性与制图专题报告	2026/9/6 19:55	DOCX 文档

3、文件夹中提交的数据库的环境变量格式不对，应该为 tif 格式。




二、数据与数据库成果反馈

1、三普样点的样点数据存在空值，若有需要应在报告中说明。

水稻性总	电导率	有机质	全氮	全磷	全钾	有效磷	速效钾	速效磷	有效硅	有效铁	有效锰	有效铜	有效锌
<空>	<空>	17.7	1.13	0.73	15.5	3	<空>	147	<空>	<空>	<空>	<空>	<空>
0.305	0.0845	18.9	1.3	0.73	14.6	12.9	551	216	9.72	8.16	13.9	0.58	0.42
0.48	0.104	13.6	0.88	1.3	22.5	25.9	1170	157	4.02	5.2	4.48	0.79	2.31
0.417	0.0926	12.6	0.75	0.73	18.3	1.91	832	91.6	3.51	5.32	3.31	0.74	0.37
0.514	0.111	26.6	1.35	0.77	17.4	2.88	184	160	13.4	24.5	15.9	0.34	0.21
0.415	0.109	10.4	0.61	0.81	22.7	3.78	994	178	16.9	5.6	7.82	1.06	1.58
0.588	0.13	9.1	0.73	0.85	21.8	17.9	1017	111	1.78	7.94	4.38	0.77	0.94
0.454	0.098	18.3	1.22	1.04	18.6	12.7	445	172	10.9	11.5	17.6	0.16	0.16
0.409	0.0907	20.3	1.13	1.83	18.6	32.9	906	89	2.89	9.52	5.71	1.1	4.3
0.471	0.101	14.7	0.86	0.85	21	4.32	850	109	2.28	5.21	4.06	1.22	0.71
0.491	0.106	26.7	1.15	2.24	19	28.4	1088	102	4.79	8.84	4.43	2.45	2.7
0.463	0.0994	12.3	0.65	0.76	32.8	2.17	779	132	20	17.9	9.08	0.42	0.92
0.393	0.0908	14.3	0.88	0.98	16.6	3.25	346	210	17.3	6.8	7.46	0.34	0.32
0.489	0.114	20.8	1.53	1.12	19.9	1.09	1045	150	23.5	6.79	11.3	1.27	1.89
0.32	0.108	32.2	1.23	1.67	20.2	53	853	85.7	10.4	7.08	3.41	0.04	3.68
<空>	<空>	10.2	0.62	0.61	22.5	2.48	<空>	117	<空>	<空>	<空>	<空>	<空>
0.281	0.104	25.6	1.53	0.75	16.1	3.7	670	222	10.9	6.85	14	0.59	0.56
0.522	0.114	23.4	1.44	1	19.2	14	839	98.1	6.51	8.04	3.76	0.77	1.34
0.492	0.106	26.6	1.4	0.71	18	15.6	899	156	10.6	7.23	11	0.64	0.48

2、三普样点中数据不符合正态分布。




2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；


要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



4、成果数据（第三次全国土壤普查成果库）——提交的数据中道路数据坐标系不符合要求。




5、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

土壤属性	计量单位	采样时间	样本数据	参与建模环境变量数量	参与建模环境变量名称	遥感数据源
pH		2023.9-2024.8	194	9	TZ, 太阳辐射量, SWCI, 地形起伏度, dlbt, 地形起伏范围, 地形湿度指数, 平面曲率, 汇流动力指数	Landsat系
阳离子交换量	cmol/kg	2023.9-2024.8	194	11	填注dem, TZ, FVC, 汇流动力指数, 地形湿度指数, dlbt, 地形起伏度, 剖面曲率, 地形起伏范围, 坡向, 平面曲率	Landsat系
有机质	g/kg	2023.9-2024.8	194	8	NDMI, 降雨量, dlbt, 地表粗糙度, TZ, 地形湿度指数, 汇流动力指数, 剖面曲率	Landsat系
全氮	g/kg	2023.9-2024.8	194	8	降雨量, NDMI, TZ, 地形湿度指数, 地表粗糙度, dlbt, 汇流动力指数, 地形起伏范围	Landsat系
全磷	g/kg	2023.9-2024.8	194	10	太阳辐射量, FVC, 汇流动力指数, 平面曲率, 坡度, 地形湿度指数, dlbt, 地形起伏范围, 坡向, 剖面曲率	Landsat系

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。


三、图件成果反馈

1、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致。




土壤耕作层厚度分级面积统计表（单位：亩）						
土地利用	耕作层厚度分级（cm）					总计
	>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0	
水田			150			150
水浇地		7898	142874	14266		165038
旱地		2270	4946	1248		8464
总计		10169	147970	15514		173652

2、数字化图件成果——分级图中缺少注记。




3、图件的县级行政区边界未显示晕线，图件不规范，如土壤全钾含量分布图中无晕线，标准晕线画法如下图。



4、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。

🗑️ 排序 ▾ 查看 ▾ 设置为背景 ... 预览



5、图面表达（图件信息缺失）——除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。



四、文字成果反馈

1、报告（制图过程）——报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

图 40·有效锌正态分布检验。

3·环境变量制备与筛选。

(1) 环境变量的收集与制备。

地形因子使用的数据来源于地理空间数据云中的 ASTER·GDEM 数据集，空间分辨率为 30·m。将该数据进行镶嵌、投影和裁剪操作，完成上述预处理流程后，将处理后的数据作为基础，进一步挖掘信息。通过 ArcGIS 软件提取填注 dem、坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形湿度指数、地形粗糙度、地形起伏度、地形起伏范围、汇流动力指数。

气象数据来源于资源环境科学与数据平台和国家青藏高原科学数据中心，均为多年平均数据，原始分辨率为 1·km，通过插值加密为 30·m 分辨率。

土地利用数据来源于 2023 年国土变更调查数据，将地类图斑数据，按水田（0101）、水浇地（0102）、旱地（0103）、园地（02）、林地（03）、草地（04）和其他类进行划分。

土壤类型数据来源于下发的第三次土壤普查的土壤类型图，依据三普土种字

段，得到土种栅格图。

遥感指数数据来源于地理空间数据云的 Landsat·8 遥感影像，通过波段计算，得到相关的指数集，包括 SWCI、FVC、NDVI、MSAVI、MNDWI、NDMI 等。

为便于后续建模，使用 ArcGIS10.8 软件，将上述所有环境变量空间分辨率

2、报告（历史变化及成因）——报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型；此外，还需提供历史制图，若无历史制图，在对比分析中进行简要说明二普样点信息，并说明详细出处。

(4) 历史变化及成因分析。

土壤志历史数据农田地速效钾均值为 125.2·mg/kg，三普提升至 142.29·mg/kg，增量为 17.09·mg/kg，增幅为 13.65%；果园速效钾均值为 97·mg/kg，三普提升至 139.45·mg/kg，增量为 42.45·mg/kg，增幅为 43.76%。这一增长主要得益于钾肥施用的普及，随着市场对作物品质要求提升，果树、蔬菜等经济作物的钾肥投入量显著增加；秸秆还田比例提高，通过秸秆腐解持续向土壤释放速效钾；商品有机肥与农家肥的施用也补充了钾素输入；同时，深耕与轮作优化了土壤孔隙度，减少了钾素淋失，促进了土壤矿物钾的有效释放，共同支撑了速效钾含量的提升。