

河北省土壤类型图成果质控意见-邢台市 130502 襄都区

县（市、区）	130502 襄都区	提交单位	天津华勘检验测试有限公司
--------	------------	------	--------------

第一部分 土壤分类

1、省级三普土壤类型清单中不存在以下土种，请核实。

从输入中提取到 24 个土种名称，正在比对...

✖ 不存在的有（共 4 个）：

1. 壤底姜石灰性潮土

2. 砂底黏泥砂质石灰性褐土

3. 砂壤体黏泥砂质石灰性褐土

4. 轻砾砂质石灰性冲积新积土

2、检查土壤三普土壤类型成果图，省级分类清单无该土属/土种，请核查。

土壤分类核查结果

✓ 上图类型与分类清单检查

检查完成

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 9 个问题

2. 图斑 18：省级分类清单无该土种

3. 图斑 19：省级分类清单无该土种

4. 图斑 43：省级分类清单无该土种

5. 图斑 50：省级分类清单无该土种

6. 图斑 103：省级分类清单无该土属

7. 图斑 117：省级分类清单无该土种


✓ 土壤类型面积统计

第二部分 制图过程

1、缺少 MJ 和 XZM 字段，请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断，依据《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》

第三部分 制图结果

1、未进行建成区扣除。



2、推测制图部分已给出虚点的选择原则，且较详细，但缺少虚点对土壤类型代表性的证明示例。

个，保证每个土种至少 5 个样点。

本次推测制图点位共布设 1131 个。其中，实际调查观测点 453 个（包括二普剖面点 346 个、三普剖面样点 4 个、野外校核点位 103 个）。采样实际调查样点数量较少，不足每个土种至少 5 个样点，需同二普土壤图上拾取土壤类型典型点作为补充性样本点。对二普土壤图上每个土种的所有图斑区域进行关键成土因素变量（如高程、坡度、母质等）的数据频率分布分析，得到每个关键环境协同变量的典型数值区间，映射到地理空间，得到每个环境协同变量的典型区域分布范围图层，空间求交，得到该土种的典型环境条件分布区或多个斑块，提取斑块中心点位置作为该土种的典型虚点。具体布点原则如下：

以“成土因素决定土壤类型与属性”为核心逻辑，严格遵循以下原则，确保与实际土壤分布特征相符。


①成土因素主导原则：虚点必须落在该土种关键成土因素的“典型数值区间”内。例如石灰性褐土通常分布于“高程 200-500m、坡度 5-15° 的丘陵阶地，母质为洪冲积物”，则虚点需同时满足这三个条件，避免脱离实际成土环境。

②图斑完整性原则：虚点需落在该土种的完整图斑内，且远离图斑边界（距离 $\geq 50m$ ），避免跨土种混合区域。

③与实际调查点互补原则：虚点需补充实际调查点（453 个）覆盖不足的区域，且与已有调查点的成土条件保持一致。

3、已给出两轮环境变量重要性排序图，但缺少合理性评述，且变量缩写含义未注明。


2.选取环境变量为 JW、SW、QW、SD、FS、NDVI、JS、DEM、B5 时，卡帕系数为 0.738，总体精度为 0.780，环境变量重要性排序结果、土壤类型推测结果和不确定性分析结果如下：



图·28·第二轮推测制图环境变量重要性排序图

4、推测制图土种结果图，按照 GBT+36501 土壤制图 125000_150000_1100000 中国土壤图用色和图例规范要求，潮土应用黄绿色。

第二轮推测制图土种结果图



土壤类型图成果质控意见

土类的设置色系和推荐色调见表 B.1。

表 B.1 60 个土类的设置色系和推荐色调表


土类	色系	推荐色调	土类	色系	推荐色调
砖红壤	红	暗红	石灰(岩)土	褐	黄褐
赤红壤	红	正红	火山灰土	褐	正褐
红壤	红	粉红	紫色土	紫	正紫
黄壤	黄	金黄	磷质石灰土	紫	青紫
黄棕壤	棕	黄棕	粗骨土	紫	暗紫
黄褐土	褐	黄褐	石质土	褐	正褐
棕壤	棕	红棕	草甸土	绿	蓝绿
暗棕壤	褐	正褐	潮土	绿	黄绿

绿	黄绿	黄绿 1	
绿	黄绿	黄绿 2	
绿	黄绿	黄绿 3	
绿	黄绿	黄绿 4	
绿	黄绿	黄绿 5	
绿	黄绿	黄绿 6	
绿	黄绿	黄绿 7	


5、报告中已从土类、亚类、土属、土种四个层面对推测制图结果进行了对比分析，并区分了“分布基本一致”和“分布区域存在部分偏差”的类型，区分了“一致”和“存在偏差”的土种，但未明确突出最优和最劣情况。

第四部分 图面表达


1、轮廓线应外粗内细




2、断面图未对应垂直标记。



3、注记应用经纬度注记。



4、图例使用错误，为什么乡镇界线和道路是一样的图例；政府驻地专有符号使用错误；缺少等高线请按照《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055—2019)进行设定，请逐一检查并修正。



参考：

地物名称	式样	色值说明	地物名称	式样	色值说明
高速铁路		R255 G0 B0 C0M100Y100K0	高速铁路		R255 G0 B C0M100Y1
铁路		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	铁路		R0 G0 B0 C0M0Y0K
高速公路		R235G136B70 C0M50Y80K0	高速公路		R255 G0 B C0M100Y1
国道		R255G247B58 C0M0Y80K0	国道		R221G19B C0M100Y0
省道		R242G174B146 C0M30Y35K0	省道		R145G96B C0M50Y50
县乡道		R164G107B90 C0M50Y50K30	县乡道		R221G19B C0M100Y0
农村道路		R145G96B81 C0M50Y50K40	农村道路		R145G96B C0M50Y50
高速铁路		R255 G0 B0 C0M100Y100K0	林带		R0 G146B C100M0Y1
铁路		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	长城		R96G93B9 C0M0Y0K

地物名称	式样	色值说明	地物名称	式样	色值说明
国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	首都		R255 G0 B0 C0M100Y100K0
未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	省级行政中心		R255G0B0 C0M100Y100K0
省、自治区、直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	地级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	县级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	乡、镇、街道		R0 G0 B0 C0M0Y0K100

5、图面缺少河流水库铁路等注记。

8.4 注记

8.4.1 注记内容

- (1) 土壤类型标记根据图幅内容，按照分类层次进行标记。高级分类单元标记土壤类型按照对应分类系统检索表进行标注。基层分类单位按照各制图区域亚类编号后用顺序号续编。县级土壤土标记不宜跨越4个及以上分类层级，对于过于复杂分类层次的标记，可根据分类层级按照编码顺序号。顺序号可采用罗马数据、阿拉伯数字和小写字母分别标记，用下划线分割，并在图例中对顺序号进行说明。对于图斑较小，采用引线标记；面积分布范围过大的制图单元，可以进行多次标记。
- (2) 建成区所在市（地）、县（区）、乡（镇）政府驻地名称。
- (3) 铁路站场、民用机场、港口码头、公路与铁路（及其不同方向的通达地名）名称。
- (4) 重大水利设施名称。
- (5) 河流、湖泊、水库、干渠、海域的名称。
- (6) 国家公园、自然保护区、自然公园的名称。
- (7) 其他重要地物名称。

6、面积统计表缺少汇总，注意县域面积要和三调一致。

土地利用现状类型面积统计表											
土种	面积（亩）	水浇地		旱地		水田		园地		林地	
		面积（亩）	比例	面积（亩）	比例	面积（亩）	比例	面积（亩）	比例	面积（亩）	比例
均黏壤石灰性潮土	3251	133	4.09%	16	0.49%			19	0.58%	258	7.94%
均壤质石灰性潮土	156146	46659	29.88%	483	0.31%			3858	2.47%	16395	10.50%
均砂壤石灰性潮土	42604	17352	40.73%	1841	4.32%			1406	3.30%	3546	8.32%
壤底姜石灰性潮土	3207	485	15.12%	4	0.12%			126	3.93%	100	3.12%
壤底黏石灰性潮土	1906	84	4.41%					160	8.39%	168	8.81%
壤体黏石灰性潮土	588	27	4.59%					42	7.14%	46	7.82%
壤体砂石灰性潮土	532	8	1.50%					27	5.08%	155	29.14%
砂壤底黏石灰性潮土	344	29	8.43%					16	4.65%	177	51.45%
均壤质泥砂质潮褐土	80763	35680	44.18%	614	0.76%	13	0.02%	2562	3.17%	9429	11.67%
均砂壤泥砂质潮褐土	28225	9177	32.51%	4544	16.10%	116	0.41%	696	2.47%	3983	14.11%
均砂质泥砂质潮褐土	17619	1520	8.63%	58	0.33%			386	2.19%	5378	30.52%
壤底黏泥砂质潮褐土	10133	752	7.42%	35	0.35%			167	1.65%	262	2.59%
砂壤底黏泥砂质潮褐土	844	200	23.70%					142	16.82%	90	10.66%
均壤质泥砂质石灰性褐土	76950	35596	46.26%	464	0.60%	21	0.03%	2902	3.77%	10023	13.03%
均砂壤泥砂质石灰性褐土	21594	11377	52.69%	257	1.19%			691	3.20%	1648	7.63%
均砂质泥砂质石灰性褐土	387	88	22.74%					3	0.78%	120	31.01%
壤底黏泥砂质石灰性褐土	14172	2279	16.08%	41	0.29%			691	4.88%	1842	13.00%
壤底砂泥砂质石灰性褐土	750	457	60.93%					111	14.80%	74	9.87%
壤体砂泥砂质石灰性褐土	8189	3482	42.52%	1	0.01%			219	2.67%	2617	31.96%
砂底黏泥砂质石灰性褐土	4721	1044	22.11%	20	0.42%			180	3.81%	1136	24.06%
砂壤底黏泥砂质石灰性褐土	298	59	19.80%	9	3.02%			59	19.80%	72	24.16%
砂壤体黏泥砂质石灰性褐土	1257	163	12.97%	9	0.72%			17	1.35%	369	29.36%
轻砾砂质石灰性冲积新积土	225	52	23.11%	20	8.89%						
砂质固定草甸风沙土	4121	397	9.63%	313	7.60%	1	0.02%			44	1.07%
										34	0.83%

第五部分 报告质量

1、面积数据需核实。

技术报告：襄都区，隶属于河北省邢台市，是邢台市的中心城区，位于河北省南部、邢台市中部，东与任泽区、南和区接壤，西与信都区毗邻，南濒沙河市，北与内丘县相连，总面积 122.51 平方千米

122.51×1500=183765 亩

但是技术报告和工作报告的土种合计面积为 478825 亩

灰性褐土、固定草甸风沙土、石灰性冲积新积土和 24 个土种。
表·7 三普土种信息一览表

序号	土类	亚类	土属	土种	面积（亩）
1	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均黏壤石灰性潮土	3251
2				均壤质石灰性潮土	156145
3				壤底姜石灰性潮土	3207
4				壤底黏石灰性潮土	1906
5				壤体黏石灰性潮土	588
6				壤体砂石灰性潮土	532
7			砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	42604
8				砂壤底黏石灰性潮土	344
9	风沙土	草甸风沙土	固定草甸风沙土	砂质固定草甸风沙土	4121
10	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	80764
11				均砂壤泥砂质潮褐土	28226
12				均砂质泥砂质潮褐土	17619
13				壤底黏泥砂质潮褐土	10133
14				砂壤底黏泥砂质潮褐土	844
15		石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	76950
16				均砂壤泥砂质石灰性褐土	21593
17				均砂质泥砂质石灰性褐土	387
18				壤底黏泥砂质石灰性褐土	14172
19				壤底砂泥砂质石灰性褐土	750
20				壤体砂泥砂质石灰性褐土	8189
21				砂底黏泥砂质石灰性褐土	4721
22				砂壤底黏泥砂质石灰性褐土	298
23				砂壤体黏泥砂质石灰性褐土	1256
24	新积土	冲积土	石灰性冲积新积土	轻砾砂质石灰性冲积新积土	225
合计					478825

2、表层样点数量不一致，工作报告 300 个，技术报告 195 个，请核实。

数据库以 GDB 格式存储，栅格数据以 Geotiff 格式存储，国家大地 2000 坐标系。

（1）基础数据

①行政区、居民点、道路、水系等基础地理数据。

②土壤三普样点数据，包括 13 个剖面样点和 300 个表层样点的物理、化学性状和剖面形态学调查信息等。


③土壤三普样点数据，包括 13 个剖面样点和 300 个表层样点的物理、化学性状和剖面形态学调查信息等。

③三普表层样点数据。表层土壤属性在部分情况下一定程度上可辅助区分某些土壤类型，可以利用与土壤分类相关的表层调查数据，土壤三普表层调查数据包括每个表层样点的坐标位置、土壤有机质含量、砾石体积含量、碳酸钙含量、pH、砂粒、粉粒、黏粒含量、质地类型、盐分、碱化度等指标数据。土壤三普在襄都区共采集了表层样的数据 195 个。


4.2.1.2 已有传统土壤图

第六部分 其他

1、缺少自查表扫描件，mxd 文件保存时未设置相对路径；未提交 layout 包（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）。



2、预测结果不确定性图位置存放错误，应在 process 数据集中。




3、重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果位置存放错误，应放置在 PROCESS 数据集中；history 数据集缺少二普土壤样点数据。



内容	• 土壤二普县级土种志剖面样点矢量数据
	• 原土壤二普县级土壤图矢量数据
	• 分类校准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据
	• 二普土壤样点数据

4、请按照规范组织数据集。

4. PROCESS数据集内容	• DCYD//调查样点			
	• 土壤二普土壤图室内校核前、后图斑			
	• 重新定义坐标的土壤二普土壤剖面样点的土壤类型野外校核结果			
	• 土壤类型改变区各类地块提取结果			
	• 推测制图虚点数据			
	• 野外校核点位数据			
	• 推测的土壤三普图（矢量）			
	• 预测/推测不确定性分布图			
				
	• 土壤三普土壤类型成果图（矢量）			
5. RESULT数据集内容				



5、请按照规范要求命名



质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 30 日
------	-------	------	-----------------