

临漳县质控结果

一、数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 耕地质量等级评价单元图属性表字段长度与顺序有误



2. 土壤图中土壤连续命名字段为空

土壤图							
OBJECTID *	Shape *	序号	土类	亚类	土属	土种	土种连续命名
1	面	1	潮土	典型潮	潮砂土	砂质潮土	
2	面	2	潮土	盐化潮	苏打盐化潮	轻盐质轻度苏打盐化潮土	
3	面	3	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻盐质石灰性潮土	
4	面	4	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐	轻盐质底砂泥砂质潮褐土	
5	面	5	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻盐质石灰性潮土	
6	面	6	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐	轻盐质底砂泥砂质潮褐土	
7	面	7	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐	轻盐质底砂泥砂质潮褐土	
8	面	8	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐	中壤质泥砂质潮褐土	
9	面	9	潮土	盐化潮	氯化物盐化	轻盐质轻度氯化物盐化潮土	
10	面	10	潮土	盐化潮	苏打盐化潮	轻盐质轻度苏打盐化潮土	
11	面	11	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻盐质石灰性潮土	
12	面	13	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	
13	面	14	潮土	盐化潮	苏打盐化潮	轻盐质轻度苏打盐化潮土	
14	面	16	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻盐质夹砂石灰性潮土	
15	面	17	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻盐质石灰性潮土	
16	面	18	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻盐质石灰性潮土	
17	面	20	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻盐质夹砂石灰性潮土	
18	面	21	潮土	典型潮	石灰性潮壤	砂质石灰性潮土	
19	面	22	潮土	盐化潮	苏打盐化潮	轻盐质轻度苏打盐化潮土	
20	面	23	潮土	盐化潮	氯化物盐化	轻盐质轻度氯化物盐化潮土	
21	面	24	潮土	盐化潮	氯化物盐化	中壤质轻度氯化物盐化潮土	
22	面	25	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	
23	面	26	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质底砂石灰性潮土	
24	面	28	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐	轻盐质底砂泥砂质潮褐土	
25	面	29	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐	中壤质底砂泥砂质潮褐土	
26	面	30	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐	轻盐质底砂泥砂质潮褐土	
27	面	31	褐土	潮褐土	泥砂质潮褐	中壤质底砂泥砂质潮褐土	
28	面	32	潮土	潮土	潮土	轻盐质底砂泥砂质潮土	

3. 耕地等级评价样点图字段顺序与长度有误

↑ ↓

选项 ▼

选择哪些字段可见

☒ OBJECTID_1
☒ Shape
☒ OBJECTID
☒ 样点编号
☒ 坐落单位代码
☒ 坐落单位名称
☒ 坡度
☒ 土类
☒ 亚类
☒ 土属
☒ 土种
☒ 海拔高度
☒ 经度
☒ 纬度
☒ 侵蚀类型
☒ 侵蚀程度

外观

别名	亚类
高亮显示	否
只读	否

字段详细信息

数据类型	文本
长度	254
名称	YL
允许空值	是

(3) 准确性

1. 耕层厚度隶属度计算是否正确，请核查

拼层厚度	F拼层厚度
17	0.8416
18	0.8605
17	0.8511
17	0.8558
17	0.8463
17	0.8463
17	0.8319
17	0.8367
17	0.8319
17	0.8367
17	0.8416
17	0.8463
17	0.8558
17	0.8463
17	0.8463
17	0.8463
17	0.8463
17	0.8511
17	0.8463
18	0.8832
18	0.8832
18	0.8832
18	0.8832
18	0.8832
18	0.8697
18	0.8697
18	0.8697

2. 平差面积计算有误

[illegible]

二、图件成果

1. 图片缺少文本比例尺, 无法确定是否为 1: 50000

质量等级	面积(公顷)	占比(%)
2等	23455.99	46.30
3等	20807.00	41.07
4等	3759.54	7.42
5等	2015.14	3.98
6等	626.22	1.24


图例

- 乡镇政府驻地
- 乡镇行政界
- 铁路
- 县属行政界线
- 地级行政界线
- 城镇居民地
- 河流水面
- 公路
- 其他地类
- 质量等级
- 2等地
- 3等地
- 4等地
- 5等地
- 6等地
- 1000
- 200

0 5 10 km

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

原则要求成图比例尺为1:5万。面积超过4000 km²的县可依据面积大小制作1:10—1:20万耕地质量等级图。




- ## 2. 缺少县政府驻地注记

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

3. 图例建议用框框住



4.

三、文字成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 文字缩进

5. 计算耕地质量综合指数^④

采用累加法计算耕地质量综合指数。^④

$$P=\sum \left(C_i\times F_i \right) \cdots \cdots \cdots \left(1 \right) \text{④}$$

式(1)中: P 为耕地质量综合指数(Comprehensive index of cultivated land quality);

C_i 为第 i 个评价指标的组合权重; F_i 为第 i 个评价指标的隶属度; ^④

2. 文字描述中对图表应确定描述，且表和图最好分章节命名。如表 2-1 等

通过建立二级区层次结构模型和构造判断矩阵，经层次排序与一致性检验后确定各指标权重。各指标权重见下表。↵

3. 缺少指标体系空间分布说明和插图

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

4. 评价结果验证部分缺少数据支持

(五)评价结果验证↵

为增强临漳县耕地质量评价结果的科学性与外推性，可采用跨区域的对比较证法，即选取与本县地理环境特征相似和相异的邻近县份进行横向比较。↵

具体而言，可选取同样位于太行山前平原区、农业条件相近的县作为相似环境参照组。将临漳县的评价结果，尤其是东部平原高等级耕地的比例、关键肥力指标的平均水平，与参照组县份已公布的耕地质量等别数据^①进行对比。若临漳的结果在等级结构、主导限制因子类型及空间分布规律上与这些县份具有合理的相似性和过渡性，则证明其评价标准与区域规律相符。↵

示例

（一）与历史数据进行对比

与临漳市第三次国土调查耕地质量评价结果进行对比。临漳市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为 6.69 等，临漳市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为 6.20 等，两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相符。

表 7-7 与临漳市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	土壤评价结果 面积/公顷	土壤评价结果 占比	国调 面积/公顷	土壤评价结果 占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.93%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.53%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.28%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.59%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

（二）产量验证法

产量验证法是通过不同的方法和技术来验证的，其中，方法包括：
田间调查：通过对农田的实际情况进行调查和采样，来估计产量。涉及对作物种植面积、生长情况以及收获情况的实地观察和调查。

卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和植被指数来估算产量。

统计数据分析：通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算出临漳市第三次土壤普查现状耕地的产量数据与历史统计年鉴、土壤普查调查的数据进行产对比等。

农业生产模型：利用农业生产模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

（三）专家实地符合法

针对审查中出现的存疑的数据和等级比较低的，请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地踏勘。根据实地调查的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查方法、调查范围和访问等。专家到实地进行观察和调查，收集相关信息。最后根据实地调查和数据分析结果，给出处理意见和建议。

（五）评价结果验证

为验证耕地土壤质量等级评价结果的科学性与合理性，在土壤质量等级评价初步结果的基础上开展评价结果验证工作。具体采用合理性验证、对比验证、专家验证等方法。

耕地土壤质量等级评价结果从空间分布特征、土壤类型、地形特征、灌溉条件等方面进行合理性检查。临中县高质量等级评价单元分布于盆地、灌溉良好的区域，而低质量等级耕地一般分布于丘陵山地等海拔和坡度较大的区域。临中县农业种植业的核心区耕地土壤主要是黑钙土、黄壤土、灌淤土，因而质量等级较高。

耕地土壤质量等级评价结果与产量数据进行比较验证。收集临中县各乡镇的粮食产量数据，与各乡镇的土壤质量等级进行相关性分析。与临中县往年耕地质量等级评价结果进行对比验证。从质量平均等级、各等级空间分布等方面对比土壤“三普”和临中县往年评价结果。

聘请熟悉临中县耕地质量状况的专家、农技人员对评价指标体系、各指标权重、隶属函数建立、评价过程属性赋值、评价结果计算等行系统评估，从而完成专家验证。对评价不合理的单元进行综合分析，查明原因并进行修正，使评价结果更加科学合理。

评价验证没有具体数据支撑。