

130424 成安县质控结果

一、数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 耕地评价样点图灌溉方式别名有误

外观	
别名	GGFS
高亮显示	否
只读	否
字段详细信息	
数据类型	文本
长度	6
名称	GGFS
允许空值	是

2. 耕地质量等级评价单元图中有 2 个图斑耕层质地为空值

耕地质量等级评价单元图											
耕地图斑号	耕地平差面积	地形部位	有效土层厚	质地构型	耕层质地	土壤容重	有机质	有效磷	速效钾	水资源条件	排水能力
46.796821	平原低阶	130	松散型	<空>	1.468398	16.02509	11.38318	147.4333	满足	基本满足	
9.141459	平原低阶	130	松散型	<空>	1.468398	16.02509	11.38318	147.4333	满足	基本满足	
66069.381459	平原低阶	130	紧实型	黏壤土	1.42748	16.60381	13.35612	184.5428	满足	满足	
90587.971459	平原低阶	130	紧实型	黏壤土	1.451281	16.32292	13.55726	192.7735	满足	满足	

3.

(3) 准确性

二、图件成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1. 图名不正确



2. 除了比例文本外，建议插上比例尺

比例尺 1:50000

3.

三、文字成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

1.这是第 2 章的内容，报告中图表的名字应该修改

图例表：2000 国家大地坐标系

图 1-12· 成安县耕地土壤酸碱度分布图

3.确定指标权重

按照《规范》附录 A 耕地质量等级划分区域范围，成安县在农业区划上属于黄淮海区域的燕山太行山山麓平原农业区，各指标权重见表 1-3。

表 1-3· 各指标权重分布表

一级农业区	二级农业区	指标名称	指标权重
黄淮海区	燕山太行山山麓平原农业区	水资源条件	0.171
		耕层质地	0.142
		地形部位	0.133
		有效土层厚度	0.117
		质地构型	0.09

2.报告内容缺失

从空间上看，本次评价结果与 2023 年耕地质量评价对比分析，高等级耕地（二等、三等）主要集中李家町镇、道东堡镇、北乡义镇等区域，中等级耕地（四等、五等、六等）主要集中在漳河店镇、北乡义镇、辛义乡等，低等级耕地（七等）零星分布于李家町镇，整体分布规律与 2023 年一致。

..... 本次评价结果..... 2023 年（换图）

图 2-14· 成安县耕地质量空间分布对比图

3.公式描述正常缩进即可

$$Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times S_i) \cdot k$$

式中：Y 为区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）；

Q_i 为第 i 个评价单元年度耕地粮食生产潜力水平；

S_i 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩）；

n 为区域内评价单元数量；

k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。

根据成安县农业农村局发布数据，2020—2022 年成安县平均粮食复种面积 62.62 万亩，其中小麦 32.95 万亩，玉米 29.67 万亩，按照实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。

(3) 准确性

无

注：其余意见参考魏县成果进行修改，整改后通过