

数据、图件和文字成果

116°12'0"E
绘制单位：吴桥县农业农村局
调查时间：二零二三年九月至二零二四年四月
投影坐标系：CGCS2000_3_Degree_GK_Zone_39

平面坐标系：采用“2000 国家大地坐标系”；
高程系统：采用“1985 国家高程基准”；
投影方式：采用高斯—克吕格投影3°分带或6°分带。

制图单位: *****
制图时间: ****年**月**日

2. 请核对所有图件是否完整表达道路、水系、居民地、行政界线等基础地理要素，避免图例压盖、所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整。如图例缺失晕线、居民点。



2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	— —	K100
	省级行政区界	— · — · — ·	K100 (国家级图件) K60 (外围省)
	地级行政区界	— · — · — ·	K80 (国家级图件) K100 (省级图件) K60 (外围地市)
	县级行政区界	— · — ·	K80 (省级图件) K100 (县级图件) K60 (外围县)
	乡镇行政界	— · — ·	K80 (县级图件) K60 (外围乡镇)

[A] 提取文字 更多


2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划名称	国家行政区划	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	江苏-省 江苏-省	M50Y50, 隶书 K60, 隶书 (外围省)
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外围地市)
	县级行政区	津水区 津水区	K100, 楷体 K60, 楷体 (外围县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外围乡镇)
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外围村)
	首都	★	M100Y100 K60 (外围首都)
主要城市驻地	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外围省)
	地级政府驻地	◎	K100 K60 (外围地市)
	县级政府驻地	◎	K100 K60 (外围县)
	乡镇政府驻地	◎	K100 K60 (外围乡镇)
	村	◎	K100 K60 (外围村)
	居民地	■	C33 M71 Y65 颜色 M55 Y30
	主要河流	— · — ·	C100 C100K30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	— · — ·	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	— · — ·	C100K50 C100K30, 斜宋体
	铁路	— · — ·	K60
主要交通设施	省道及以上公路	— · — ·	C41M100Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

3、缺少河流、道路等注记，请按照规范核对补充完整




市

2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划名称	国家级行政区	中华人民共和国	K60, 隶书
	省级行政区	红、黄、绿	K500/50, 隶书 K60, 隶书 (外國省)
	地级行政区	北京市 南京市 西安市	K500/50, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外國城市)
	县级行政区	渭城区 渭水區	K100, 黑体 K60, 黑体 (外國县)
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 K60, 仿宋体 (外國乡镇)
	行政村	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外國村)
	首都	★	K100/100 K60 (外國首都)
主要城市驻地	省级政府驻地	◎	K100 K60 (外國省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外國城市)
	县级政府驻地	◎	K100 K60 (外國县)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外國乡镇)
	村	○	K100 K60 (外國村)
	居民地	■	C33 K71 K65 颜色 K65 K60
	主要河流	W、Y	C100K30, 新宋体
江河湖海	主要湖泊	W、Y	C20 C100 C100K30, 新宋体
	海洋	W、Y	C100K60 C100K30, 新宋体
	铁路	—	K60

注记
图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

4、道路、河流要素应只保留县域内的，裁剪掉多余部分。请核查全部图件类似问题。



数据成果

1. 数据命名、组织问题：按照耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，一级文件夹应是行政区划代码 6 位+县级行政区名称，二级为数据库成果、图件成果、文字成果。请核实并统一修改。

> ... 130928吴桥县耕地质量等级评价 >

名称	修改日期
数据库成果	2026/5,
图件成果	2026/5,
文字成果	2026/5,
吴桥县耕地质量等级统计表.xlsx	2026/1,

2、请检查数据库中所有图字段小数点位数问题与字段名称，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，例如样点图海拔高度保留两位等，请全部仔细核对。

耕地质量等级评价样点图										海拔高度
样点编号	坐落单位代码	坐落单位名	经度	纬度	土类	亚类	土属	土种		
1309280102000001	130928203239	王士良村	116.622656	37.663905	潮土	典型潮	潮壤土	轻壤质底潮土		21
1309280102000002	130928203236	大悟寺村	116.580778	37.671471	潮土	典型潮	潮壤土	轻壤质潮土		12
1309280102000003	130928204232	王马店村	116.622709	37.692168	潮土	脱潮土	脱潮壤土	中壤质脱潮土		17
1309280102000004	130928104233	口上王村	116.439044	37.755446	潮土	典型潮	潮壤土	中壤质潮土		12
1309280102000005	130928100226	焦庄村	116.408014	37.668862	潮土	典型潮	潮壤土	轻壤质潮土		9
1309280102000007	130928104229	温家寨村	116.448258	37.751838	潮土	典型潮	潮壤土	中壤质潮土		20
1309280102000008	130928200236	楼子铺村	116.456585	37.654655	潮土	典型潮	潮壤土	轻壤质潮土		15
1309280102000010	130928200201	上村陈村	116.44671	37.612592	潮土	典型潮	潮壤土	轻壤质潮土		14
1309280102000011	130928102215	徐王村	116.51199	37.742715	潮土	盐化潮	硫酸盐盐化	轻壤质中度硫酸盐		12
1309280102000012	130928102229	邵庄村	116.569472	37.725255	潮土	典型潮	潮壤土	轻壤质潮土		7
1309280102000013	130928103228	五里杨村	116.507583	37.785747	潮土	典型潮	潮壤土	中壤质潮土		19
1309280102000014	130928103213	油房王村	116.54719	37.74423	潮土	典型潮	潮壤土	轻壤质潮土		18
1309280102000015	130928104253	佛刘三村	116.460763	37.692092	潮土	典型潮	潮壤土	中壤质潮土		22
1309280102000016	130928202232	前刘寺村	116.454373	37.521936	潮土	典型潮	潮壤土	中壤质潮土		11
1309280102000017	130928103222	甄辛村	116.49884	37.765057	潮土	盐化潮	硫酸盐盐化	轻壤质中度硫酸盐		21

耕地质量等级评价样点属性结构表					
序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数
1	YDBH	样点编号	Char	16	
2	ZLDWDM	坐落单位代码	Char	12	
3	ZLDWMC	坐落单位名称	Char	60	
4	JD	经度	Float	9	6
5	WD	纬度	Float	8	6
6	TL	土类	Char	60	
7	YL	亚类	Char	60	
8	TS	土属	Char	60	
9	TZ	土种	Char	60	
10	HBGD	海拔高度	Float	8	2

2、耕地质量等级评价单元图部分指标隶属度分值计算错误，请全部核实。

	F土壤容重	F土壤容重1	准确度
043	0.96450001	0.966465113	FALSE
005	0.901899993	0.895174215	FALSE
043	0.94630003	0.946285701	TRUE
024	0.924300015	0.922312887	FALSE
024	0.924000025	0.922312887	FALSE
062	0.980300009	0.98228294	FALSE
081	0.99119997	0.99326812	FALSE
024	0.922999978	0.922312887	FALSE
024	0.926400006	0.922312887	FALSE
024	0.917200029	0.922312887	FALSE
043	0.947799981	0.946285701	FALSE
052	0.961300015	0.956886878	FALSE
043	0.949800014	0.946285701	FALSE
052	0.975199997	0.974951345	FALSE
043	0.94690001	0.946285701	FALSE
043	0.942900002	0.946285701	FALSE
095	0.885100007	0.880621114	FALSE
043	0.941500008	0.946285701	FALSE
033	0.938399971	0.934735215	FALSE
052	0.971899986	0.974951345	FALSE
052	0.961700022	0.956886878	FALSE
062	0.979099989	0.98228294	FALSE
014	0.903900027	0.909098738	FALSE
033	0.940400004	0.934735215	FALSE
014	0.913200021	0.909098738	FALSE

三、文字成果

1、请参考规范中的技术路线，不可以有遗漏，可以更全面。

按程序报送省级土壤普查办公室审核。




图 1-1 吴桥县第三次全国土壤普查耕地质量等级评价流程图

2、帽段未完整标注级农业分区全称、缺少每等级地的占比信息，请按照规范核实帽段结构内容。

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》的全国农业区域划分标准，吴桥县隶属于黄淮海农业区。基于 2023 年度国土变更调查数据库及耕地质量普查数据精确统计，全区耕地总面积为 41300.66 公顷，耕地资源构成呈现以下特点：地类结构以水浇地为主，水浇地面积 40149.92 公顷，占耕地总面积的 97.21%；旱地面积 1150.74 公顷，占耕地总面积的 2.79%。土壤类型以潮壤土为主，其次为硫酸盐盐化潮土和脱潮壤土，土壤质地疏松，肥力中等。耕地资源在各乡镇分布相对均衡，本次普查共涉及 13999 个调查单元，其中铁城镇耕地面积最大，达 5950.09 公顷；安陵镇、何庄乡、宋门乡等乡镇耕地资源也较为丰富。评价结果表明，吴桥县耕地面积加权平均质量等级为 4.07 等，较 2021 年调查结果有所变化，总体地力水平居河北省中上游，全区耕地年度粮食总生产潜力约为 456940266.2kg。

总体来看，吴桥县耕地质量具备良好的产能基础，灌溉条件优越，但在土壤

示例-帽段

本市大力实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，为全国真实掌握招远市耕地土壤现状性状，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、棕壤土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区，其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地，采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻，西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

粮食作物种植面积 1477825.80 亩，其中：水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.75 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在临中县北部，黄河南岸的曹娥镇。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、连徐镇、小堡镇等，占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。位于 2 度及以下坡度的耕地 147139.95 亩，占耕地的 9.96%；位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212348.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.80 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.68%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和农田基础设施构成的满足农产品种粮产量和质量安全的能力进行评价划分的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至六等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%，四等占比为 7.99%，五等地占比为 11.36%，六等地占比为 7.00%，七等地占比为 20.98%，八等地占比为 38.47%，九等地占比为 13.02%，十等地占比 0.73%。粮食第三次全国土壤普查调查耕地土壤属性耕地 1183 个，样点布设广，空间覆盖度高，开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评价提供基础，为保障粮食安全提供科学依据，对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，也可为社会生态文明建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

3、资料收集与整理部分表格信息不完善，如缺少年份、比例尺、格式等信息，请按照示例进行修改。

表 1-1 基础数据及来源

序号	数据名称	数据来源
1	2023 年度土地利用现状数据	自然资源部门
2	土壤普查外业调查数据	县土壤普查办
3	土壤普查内业测试化验数据	县土壤普查办
4	第三次全国土壤普查土壤类型图成果	县土壤普查办
5	第三次全国土壤普查土壤属性成果	县土壤普查办
6	数字高程模型（DEM）、等高线	自然资源部门
7	农田水利工程项目数据	农业农村部门、水利部门
8	高标准农田建设项目等农田基础设施数据	农业农村部门
9	灌区数据	水利部门

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

提取文字 更多

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022 年	1: 10000	电子	GDB 格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984 年	1: 50000	电子	shp 格式	
二普校核土壤图	耕地质量保护站	2023 年	1: 50000	电子	shp 格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023 年	1: 50000	电子	shp 格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021~2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012~2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012~2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020~2022	1: 10000	电子	工作空间	

4、评价指标体系建立部分不完整，例如缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析，请按照规范补充完整

(四) 评价指标体系建立

1.评价指标与权重

耕地质量等级评价是从农业生产角度出发，通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和田间基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分出的等级。吴桥县隶属于黄淮海区（一级农业区）及对应冀鲁豫低洼平

原农业区（二级农业区），以水资源条件、耕层质地、质地构型、有机质、地形部位、盐渍化程度、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚度、土壤容重、耕层厚度共 12 个因素作为评价指标。

表 1-3 黄淮海区耕地质量等级评价指标体系

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）**空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。**

5、缺少耕地质量评价指标数据提取方法表格展示。请按照规范核实并修改。

耕层厚度	0.022
2.评价单元赋值及指标获取	
根据评价指标类型划分，可分为概念型和数值型两种指标类型。其中，地形部位、水资源条件、排水能力、盐渍化程度、耕层质地、和质地构型属于概念型指标；有机质、速效钾、有效磷、有效土层厚度、土壤容重和耕层厚度属于数值型指标。按照评价指标类型，吴桥县耕地质量等级评价单元指标属性赋值方法主	
7	
要有三种：基于土壤属性图成果获取、基于土壤类型图成果获取和基于专题图数	
据获取	

4. 评价指标数据的提取		
为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价单元图上。		
表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法		
数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表联接获取

6、各乡镇耕地质量状况需要对主要限制因素等进行详细阐述。请按照规范补充修改。

2.各乡镇耕地质量状况	
于集镇的耕地质量以中等级为主，其中中等级耕地占比 89.52%（相对本镇	
17	
各等级最高），高等级耕地占比 10.48%，耕地合计面积 4950.49 公顷。中等级支	
撑全镇农业生产，单季粮食产能约 282.0kg/亩，无低等级耕地影响，产能稳定性	
较强。	
何庄乡的耕地质量以中等级为主，其中中等级耕地占比 83.89%（相对本镇	
各等级最高），高等级耕地占比 16.11%，耕地合计面积 4038.43 公顷。中等级支	
撑全镇农业生产，单季粮食产能约 285.0kg/亩，无低等级耕地影响，产能稳定性	
较强。	

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况
各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

[乡镇]	[高等级耕地]		[中等等级耕地]		[低等级耕地]		[合计]
	[面积(亩)]	[占比(%)]	[面积(亩)]	[占比(%)]	[面积(亩)]	[占比(%)]	
[乡镇1]							
[乡镇2]							
[...]							
[合计]							

3. 土壤类型耕地质量状况
主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 6 月 30 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院