


肃宁县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果


1. 图面信息请按照规范修改核对




2. 《规范》主要内容

署名

图件应署编制单位的正式名称和制图日期，编制单位注于图廓外左下方，制图单位、日期注于图廓外右下方，字体为宋体。



2. 指标因子图件缺少规范的面积汇总表，汇总表应统计不同指标等级的面积及占比。




2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表格。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
质量等级	一等地		C78 M34 Y100
	二等地		O65 M27 Y100
	三等地		C49 M19 Y100
	四等地		C31 M12 Y100
	五等地		C11 M4 Y100
	六等地		O0 M12 Y100
	七等地		O0 M33 Y100
	八等地		O0 M55 Y100
	九等地		O0 M78 Y100
	十等地		O0 M100 Y100

质量等级	面积 (万亩)	占比 (%)
一等地	***.***	***.***
二等地	***.***	***.***
三等地	***.***	***.***
四等地	***.***	***.***
五等地	***.***	***.***
六等地	***.***	***.***
七等地	***.***	***.***
八等地	***.***	***.***
九等地	***.***	***.***
十等地	***.***	***.***



3. 请核对所有图件是否完整表达道路、水系、居民地、行政界线等基础地理要素，避免图例压盖、所有图例的文字和颜色要按照规范上的要求进行调整。如图例缺失晕线且居民点图例样式与规范不同。

图例

⊙

乡镇驻地

⊙

区县驻地

——

县界

——

乡界

——

主要道路

——

铁路

居民点

水系

土壤容重(g/cm3)

2. 《规范》主要内容

行政界线

界线主要包括国界线、省级行政界线、地级行政界线、县级行政界线、乡镇行政界线等。

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区划界线	晕线		M10 M30
	国界	— · — ·	K100
	未定国界	—— —	K100
	省级行政区界	—— · — · —	K100（国家级图件） K60（外围省）
	地级行政区界	—— · — · — ·	K80（国家级图件） K100（省级图件） K60（外围地市）
	县级行政区界	—— · — ·	K80（省级图件） K100（县级图件） K60（外围县）
	乡镇行政界	—— · — ·	K80（县级图件） K60（外围乡镇）

[A] 提取文字 更多


2. 《规范》主要内容

要素类别	要素名称	图式符号	样式颜色
行政区名称	国家级行政区	中华人民共和国	E60, 隶书
	省级行政区	江苏省 江苏省	M50Y30, 隶书 E60, 隶书（外围省）
	地级行政区	北京市 南京市 南京市	M50Y30, 黑体（首都） K100, 黑体 K60, 黑体（外围地市）
	县级行政区	溧水区 溧水区	K100, 楷体 E60, 楷体（外围县）
	乡镇行政区	白马镇 白马镇	K100, 仿宋体 E60, 仿宋体（外围乡镇）
	村行政区	白马村 白马村	K100, 宋体 E60, 宋体（外围村）
	首都	★	M100Y100 E60（外围首都）
主要城市驻地	省级政府驻地	⊙	K100 E60（外围省）
	地级政府驻地	⊙	K100 E60（外围地市）
	县级政府驻地	⊙	K100 E60（外围县）
	乡镇政府驻地	⊙	K100 E60（外围乡镇）
	村	⊙	K100 E60（外围村）
	居民地		C33 M11 Y65 颜色 M35 Y30
	主要河流	长江	C100 C100K30, 斜宋体
江河湖海	主要湖泊	太湖	C20 C100 C100K30, 斜宋体
	海洋	东海	C100M50 C100K30, 斜宋体
	铁路		K60
主要交通设施	省道及以上公路		C41M100Y73

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

4、缺少河流、道路等注记，请按照规范核对补充完整



2. 《规范》主要内容

要素类别

要素名称

图式符号

样式颜色

行政区划名称	国家现行行政区	中华人民共和国	K00, 隶书
	省级行政区	红、黄、绿	M00G0, 隶书 K60, 隶书 (外覆省)
	地级行政区	北京市 南京市	M00G0, 黑体 (首都) K100, 黑体 K60, 黑体 (外覆地市)
	县级行政区	渭城区 渭南市	K100, 黑体 K60, 黑体 (外覆县)
	乡镇行政区	白马镇 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外覆乡镇)
	行政村	白马村 白马村	K100, 宋体 K60, 宋体 (外覆村)
主要城市驻地	首都	★	M100Y100 K60 (外覆首都)
	省级政府驻地	●	K100 K60 (外覆省)
	地级政府驻地	●	K100 K60 (外覆地市)
	县级政府驻地	●	K100 K60 (外覆县)
	乡镇政府驻地	●	K100 K60 (外覆乡镇)
	村	●	K100 K60 (外覆村)
江河湖海	居民地	■	C33 M11 V65 颜色 M11 V65
	主要河流	—	C100 C100G30, 斜宋体
	主要湖泊	—	C20 C100 C100G30, 斜宋体
	海洋	—	C100G50 C100G30, 斜宋体
交通设施	铁路	—	K60

注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

二、数据成果

1. 请检查数据库中所有图字段小数点位数问题与字段名称，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，例如样点图经纬度保留六位，海拔高度保留两位等，请全部仔细核对。

表

耕地质量等级评价样点图

坐落单位代码	坐落单位名	经度	纬度	土类	亚类	土属	土种	海拔高度
130926205205	朱家庄	115.9091	38.4778	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	11
130926101241	吴辛庄村	116.0104	38.4570	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	13
130926104212	吕家庄	115.8476	38.3327	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	17
130926204206	刘家屯	115.7687	38.4349	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	12
130926102222	西梁里村	115.8617	38.3626	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	18
130926204218	朱付家庄	115.7355	38.4320	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	16
130926105204	西南庄	115.7904	38.4080	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	16
130926103229	柳科村	115.8771	38.4544	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	14
130926105214	西谈论	115.7059	38.3744	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	15
130926104223	戴刘庄	115.9234	38.356	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	12
130926102213	刘家前头村	115.9636	38.3860	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	10
130926102217	东宋家庄村	115.9334	38.3493	潮土	典型潮	石灰性潮壤	中壤质石灰性潮土	13
130926103217	刘家务村	115.8803	38.4762	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	15
130926101215	前丰乐堡村	115.9216	38.4226	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	23
130926102215	大干庄村	115.9501	38.3652	潮土	典型潮	石灰性潮壤	轻壤质石灰性潮土	10

耕地质量等级评价样点属性结构表					
序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数
1	YDBH	样点编号	Char	16	
2	ZLDWDM	坐落单位代码	Char	12	
3	ZLDWMC	坐落单位名称	Char	60	
4	JD	经度	Float	9	6
5	WD	纬度	Float	8	6
6	TL	土类	Char	60	
7	YL	亚类	Char	60	
8	TS	土属	Char	60	
9	TZ	土种	Char	60	
10	HSGD	海拔高度	Float	8	2

2、耕地质量等级评价单元图部分指标隶属度分值计算错误，请全部核实。

F有效土层厚度	F有效土层厚度1	准确度
0.729700029	0.728190293	FALSE
0.718500018	0.720952565	FALSE
0.718999982	0.720952565	FALSE
0.728200018	0.728190293	TRUE
0.707099974	0.706525742	FALSE
0.720700026	0.720952565	FALSE
0.727699995	0.728190293	FALSE
0.71420002	0.713729921	FALSE
0.737900019	0.735439573	FALSE
0.727199972	0.728190293	FALSE
0.721099973	0.720952565	FALSE
0.726700008	0.728190293	FALSE
0.745999992	0.742696716	FALSE
0.703999996	0.706525742	FALSE
0.727999985	0.728190293	FALSE
0.737600029	0.735439573	FALSE
0.74150002	0.742696716	FALSE
0.740000000	0.740000000	FALSE

三、文字成果

1、报告目录组成和字体格式请按照土壤三普耕地质量等级评价技术规范核对。

目 录

一、 评价方法概述	1
(一) 技术路线	1
(二) 资料收集与整理	2
(三) 评价单元划分	2
(四) 评价指标体系建立	3
(五) 评价结果验证	6
(六) 产能计算方法	7
二、 评价结果与分析	9
(一) 耕地质量等级状况	9
(二) 耕地质量等级特征	17
(三) 各等级耕地主要属性对比	30
三、 存在问题及对策建议	41
(一) 存在问题	41
(二) 原因分析	41
(三) 对策建议	43

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

- (一) 技术路线
- (二) 资料收集与整理
- (三) 评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

(四) 评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

(五) 评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

(六) 产能计算方法

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

2、帽段内容不完善，如缺少每等级地的占比信息，请按照范例完善修改。

肃宁县位于河北省中南部，沧州市西部，地处黄淮海平原区—海河低平原亚区（二级区），属暖温带半湿润大陆性季风气候。全县耕地总面积约 42.95 万亩，集中分布于肃宁镇、梁家村镇、尚村镇等地的冲积平原地带。作为国家粮食主产区，县域内耕地类型以水浇地为主体，土壤类型以潮土为主导。本次评价基于第三次全国土壤普查标准，系统整合土壤理化性质、环境条件等多项指标构建符合黄淮海平原旱作区特点的耕地质量分级模型，旨在为耕地保护与粮食安全战略提供科学锚点。

示例-帽段

肃宁大力实施“藏粮于地，藏粮于技”战略，全面划定永久基本农田，大规模推进农田水利、土地整治、中低产田改造和高标准农田建设，加强粮食等大宗农产品主产区建设，探索建立粮食生产功能区重要农产品生产保护区，为全国真实掌握招远市耕地土壤现状状况，提升土壤利用水平，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展本市耕地质量等级评价工作，进一步摸清质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。

招远市耕地质量等级评价耕地面积为 67.52 万亩。土壤类型包括潮土、稻脊土、褐土、石质土、棕壤。招远市地处胶东低山丘陵地带，属于黄淮海一级农业区下的山东丘陵农林区，其耕地质量等级由高至低划分为一至十等地，一等地耕地质量最好，十等地耕地质量最差。招远市耕地质量主要集中在五、六等地，其次是四、七等地，采用耕地质量等级面积加权法，计算得到招远市现状耕地质量平均等级为 6.20 等。

海安市地处江苏省中南部，东临黄海，与如东县接壤，南和如皋市毗邻。西通泰兴市并与泰州市姜堰区相交，北与东台市相连。海安市属于长江中下游区一级农业区，长江下游平原丘陵陵农畜水产区二级农业区。下辖 4 个街道、9 个镇。耕地面积 77.93 万亩。其中，水田 66.45 万亩，占 85.26%；水浇地 9.77 万亩，占 12.54%；旱地 1.71 万亩占 2.20%。全县共分水稻土、潮土和滨海盐土三大土类。本次海安市依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，开展耕地质量评价工作，通过耕地质量评价，海安市第三次全国土壤普查耕地质量等级划分为一至十等，平均等级为 2.82 等，摸清了质量家底，有针对性开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。|

榆中县耕地面积 1477825.80 亩，其中：水田 2315.25 亩，占耕地总面积的 0.16%；水浇地 351588.25 亩，占 23.79%；旱地 1123921.80 亩，占 76.05%。水田全部分布在榆中县北部，黄河南岸的雷城峡。水浇地主要分布在城关镇、夏官营镇、连家湾、小崖湾等。占全县水浇地的 57.18%。北部山区旱地面积较大，占全县旱地的 43%。低于 2 度及以下程度的耕地 147139.90 亩，占耕地的 9.96%；位于 2-6 度坡度（含 6 度）的耕地 212248.35 亩，占 14.36%；位于 6-15 度坡度（含 15 度）的耕地 507024.00 亩，占 34.31%；位于 15-25 度坡度（含 25 度）的耕地 556493.70 亩，占 37.68%；位于 25 度以上坡度的耕地 54919.20 亩，占 3.71%。

耕地质量等级评价是通过综合指数法对耕地地力、土壤健康状况和内部基础设施构成的满足农产品持续产出和质量安全的能力进行评价划分的等级。根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范（试行）》，本县耕地质量等级为三等至头等，平均等级为 7.02。其中，三等地占比 0.44%，四等占比为 7.99%，五等地占比为 11.38%，六等地占比为 7.03%，七等地占比为 20.98%，八等地占比为 38.47%，九等地占比为 13.02%，十等地占比 0.73%。榆中县第三次全国土壤普查调查耕地土壤类型耕地 1183 个，样点布设广，空间覆盖度高，开展耕地质量等级评价，为耕地质量生产潜力评价提供基础，为确保持续粮食安全提供科学依据。对于落实“藏粮于地”战略起到基础性作用。掌握耕地的质量，为土壤的规划利用、改良培肥、保护管理提供科学支撑，也可为社会生态建设重大政策的制定提供决策依据。

帽段内容要简要，突出重点，缺少土壤类型的描述。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

3、资料收集与整理部分表格信息不完善，如缺少年份、比例尺、格式等信息，请按照示例进行修改。

表 1.1 耕地质量评价各指标数据来源			
序号	数据名称	来源	提取方法
1	水资源条件	第三次土壤普查数据库	以点代面
2	耕层质地	第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定
3	地形部位	第三次土壤普查数据库、数字高程模型DEM	以点代面并结合DEM影像综合判定
4	有效土层厚	第二次土壤普查数据库、第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定
5	质地构型	第二次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定
6	有机质	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加
7	有效磷	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加
8	速效钾	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加
9	排水能力	第三次土壤普查数据库	以点代面并结合当地情况判定
10	酸碱度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加
11	土壤容重	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加
12	耕层厚度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	以点代面并结合当地情况判定

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料和有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

A 提取文字

更多

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普校核土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jsw	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

4、评价指标体系建立部分不完整，例如缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析，请按照规范补充完整

（四）评价指标体系建立

依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，肃宁县属于黄淮海区—冀鲁豫低洼平原农业区，耕地质量评价分为立地条件、理化性状、健康状况和农田管理四个准则层构成，评价指标由基础性指标、区域补充性指标组成，其中，基础指标包括耕层质地、质地构型、有机质、地形部位、排水能力、有效磷、速效钾、有效土层厚、土壤容重；区域指标包括盐渍化程度、耕层厚度。

综合指数计算。根据每个评价单元的指标值按指标体系赋值权重和隶属度，并根据权重和隶属度采用累加法计算各评价单元的综合指数得分。耕地质量综合指数计算公式为：

$$P = \sum_{i=1}^n (C_i \times F_i)$$

式中：P—耕地质量综合指数；

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）**空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。**

5、缺少耕地质量评价指标数据提取方法表格展示。请按照规范核实并修改。

4. 评价指标数据的提取		
为每个耕地质量评价单元获取指标数据是耕地质量评价的基础，耕地质量评价指标数据土壤养分状况、理化性状、立地条件等，根据指标数据提供的类型以及指标数据的特点采用不同的方法为每个耕地质量评价单元赋值。对土壤养分含量数据，如酸碱度、有机质、有效磷、速效钾等，从第三次全国土壤普查县级土壤属性成果图件提取；对地形部位、灌溉能力等指标，具有地貌类型图、灌溉分区图等相关属性分区图，主要采用属性提取的方法，并结合三次全国土壤普查外业调查数据综合判断提取；对土壤容重等指标，主要采用以点代面方法，将点位中的属性连入评价单元图；对耕层质地、质地构型、有效土层厚度、耕层厚度等与土壤有较强相关性的因子，主要采用图表关联的方式，提取到评价单元图上。		
表 7.6 海安市耕地质量评价指标数据提取方法		
数据名称	数据来源	处理方法
酸碱度、有效磷、有机质、速效钾	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果	区域统计
排水能力	排水分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
灌溉能力	灌溉分区图、三普调查数据	属性提取, 结合三普调查数据
耕层厚度、地形部位、土壤容重	第三次全国土壤普查县级土壤属性成果、三普调查数据	以点代面、属性提取
耕层质地、质地构型、有效土层厚	土壤相关属性数据表	属性表关联获取

6、各乡镇耕地质量状况需要对主要限制因素等进行详细阐述。请按照规范补充修改。

2. 各乡镇耕地质量状况							
肃宁县共 9 个乡镇，均无低等级耕地。其中万里镇的高等级耕地占比最高，高等级耕地面积为 218.65 公顷，占比 6.94%；其次为邵庄乡，高等级耕地占比 5.49%。窝北镇、梁家村镇、师素镇、付家佐镇、肃宁镇的中等级耕地占比均接近 100%，其中付家佐镇中等级耕地占比最高，达 99.99%；梁家村镇次之，为 99.81%；师素镇为 99.2%；肃宁镇为 99.09%；窝北镇为 98.7%。							
表 2.2 肃宁县各乡镇耕地质量等级情况							
乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	面积/公顷	占比/%	
师素镇	37.34	0.8	4641.46	99.2	0	0	4678.8
付家佐镇	0.23	0.01	2641.05	99.99	0	0	2641.27
尚村镇	38.26	1.4	2689.15	98.6	0	0	2727.41

3.2 报告提纲

2. 各乡镇耕地质量状况

各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

[乡镇]	[高等级耕地]		[中等等级耕地]		[低等级耕地]		[合计]
	[面积(亩)]	[占比(%)]	[面积(亩)]	[占比(%)]	[面积(亩)]	[占比(%)]	
[乡镇1]							
[乡镇2]							
[...]							
[合计]							

3. 土壤类型耕地质量状况

主要土种耕地质量等级、面积、分布等（详细阐述）。

7、产能计算方法章节需要列出拟合函数、参数和校正过程。

例

海安市产能计算情况


根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，拟合区域耕地质量综合指数与生产潜力评估函数，可以由耕地质量等级评价结果评出各等级耕地年度粮食产能水平和单季粮食产能水平。

统计每个等级的综合指数平均值，组织县内栽培、育种相关农业专家及农业生产大户，对每个等级给定所对应年度粮食产能水平。

表1 海安市耕地质量生产潜力与年度粮食产能水平对应关系表

等级	综合指数平均值	粮食年亩产（公斤/亩）
一等	0.9279	1200
二等	0.8922	1130
三等	0.8681	1070
四等	0.8434	1000
五等	0.8169	950
六等	0.7905	870
七等	0.7666	800
八等	0.7368	730
九等	0.7107	720
十等	0.6803	650

通过 10 组数据，采用最小二乘法，拟合成上型求属函数。



年度粮食产能水平 y_i =
$$\begin{cases} \frac{627.9}{1200} & u \leq 0.6803 \\ \frac{1}{1 + 10.3484 \times (u - 0.9770)^2} & 0.6803 < u < 0.9279 \\ \frac{1170.8}{1170.8} & u \geq 0.9279 \end{cases}$$

将每个评价单元的耕地质量综合指数，代入公式，求得每个评价单元的年度粮食产能水平，乘以单元面积，汇总统计全区一年可产出的粮食产量 83.55 万吨，平均年度粮食产能水平 1072.18kg/亩，单季粮食产能 536.09 kg/亩。

2022年海安粮食生产保持稳定

来源：海安市统计局 发布日期：2023-01-18 11:23 累计次数：次 字体：[大 中 小]

2022年海安市委围绕乡村振兴战略，高度重视粮食安全，克服新冠肺炎疫情、夏季高温等多重不利因素的影响，粮食生产保持稳定。据国家统计局江苏调查总队反馈，2022年海安粮食播种面积120.09万亩，较上年增加0.42万亩，同比增长0.4%；粮食总产62.37万吨，与上年持平。

根据海安市统计局，2022 年海安市播种面积 120.09 万亩，按实际种植粮食作物面积与区域耕地面积的比值做调整系数。

调整系数=（120.09/2）/77.93=0.7705

产能潜力约为 64（83.55×0.7705）万吨，与 2022 年统计局发布结果 62.37 万吨较为符合。

产能计算列出拟合函数，参数等。计算结果需要与公布数据进行校正。

质控意见

不通过

质控日期

2026 年 6 月 30 日

整改复核结论

继续整改

质控单位

中国农业大学土地科学与技术学院

