


赵县耕地质量等级评价质控反馈

数据、图件和文字成果

一、图件成果

1. 所有图件图名不符合规范（未加粗）。图名底部距外图廓的间距约为 1/3 字高。图廓缺少经纬度标注。晕线太细。所有指标因子图件缺少汇总表格。图例不够规范，应整合到一起。请检查所有图件。



规范：

图名
图名为“××(地区)耕地质量等级图”，字体采用宋体，加粗，居中显示，置于图廓外，图名底部距外图廓的间距约为1/3字高。




2. 《规范》主要内容

耕地质量等级

使用评价单元图来呈现耕地质量等级结果，并插入汇总表。

质量等级	质量等级	质量等级	质量等级
一等	一等	一等	一等
二等	二等	二等	二等
三等	三等	三等	三等
四等	四等	四等	四等
五等	五等	五等	五等
六等	六等	六等	六等
七等	七等	七等	七等
八等	八等	八等	八等
九等	九等	九等	九等
十等	十等	十等	十等

质量等级	面积 (万亩)	占比 (%)
一等	***.***	***.***
二等	***.***	***.***
三等	***.***	***.***
四等	***.***	***.***
五等	***.***	***.***
六等	***.***	***.***
七等	***.***	***.***
八等	***.***	***.***
九等	***.***	***.***
十等	***.***	***.***



二、数据成果

1、赵县 SZYTJ 和 PSNL 两个字段全县仅见“充分满足”和“满足”两个级别，未出现“基本满足”和“不满足”。

SZYTJ	PSNL
☒ 充分满足	☒ 充分满足
☐ 满足	☐ 满足
☐ 基本满足	☐ 基本满足
☐ 不满足	☐ 不满足

2、部分评价单元的综合指数 (PJZHVS) 已达到该区二级农业区“二等”等级的指数区间，但属性表中质量等级 (ZLDJ) 仍判定为“三等”，存在综合指数与等级判定不一致的错误。

PJZHVS	ZLDJ
0.916000009	3
0.916000009	3
0.916000009	3

三、文字成果

1、资料收集与整理请使用表格展示数据来源、年份、比例尺、格

式，请按照示例进行修改。

示例-数据来源

(二) 资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料 and 有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
二普复核土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

表 1 数据来源表

序号	数据名称	数据来源
1	2023 年土地利用现状数据	自然资源部门
2	土壤普查外业调查数据	县三普办

2、评价指标体系建立缺少对评价单元赋值方法的详细描述，请将每个因子的赋值方法整理到一起。缺少各指标插图以及其空间分布特征的简要分析（请每个因子一个单独图+图名+对应的空间分布特征文字描述）。

3.2 报告提纲

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

一、评价方法

（一）技术路线

（二）资料收集与整理

（三）评价单元划分

评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

（五）评价结果验证

可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。

（六）产能计算方法

4.指标基础数据来源

1.地形部位

结合外业调查数据，从地貌图中提取二级地貌单元信息并统一归并到山间盆地、宽谷盆地、平原低阶、平原中阶、平原高阶、丘陵上部、丘陵中部、丘陵下部、山地坡上、山地坡中、山地坡下、塬等类型。

2.有效土层厚度

从县级土壤类型图等相关成果图件提取。通过建立与土种的对应关系，关联提取到每个评价单元中。

5.空间制图和评价单元赋值

在指标体系建立后，采用以下方法为每个评价单元的各项指标赋值：

对于与土壤发生类型紧密相关的稳定指标，如有效土层厚度、质地构型、耕层质地等，其空间变异主要受土种控制。赋值时严格禁止使用空间插值，而是通过建立土壤三普成果中“土种”与这些属性的对应关系，从县级土壤类型图属性中直接提取，或利用代表性剖面点“以点带面”进行关联赋值。

3、不可以标题后直接接表格，先文字描述后表格。

3.2 报告提纲

二、评价结果与分析

(一) 耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）						
分 级	面积/亩	比例/%	等 级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

2. 各乡镇耕地质量状况

表 8 赵县各乡镇耕地质量等级情况

乡镇	高等级面积/公顷	高等级占比/%	乡镇总计/公顷
北王里镇	5094.95	13.17	5094.95
范庄镇	205.10	0.53	205.10
高村乡	4503.47	11.64	4503.47
韩村镇	4670.43	12.07	4670.43
南柏舍镇	3728.73	9.64	3728.73
前大章乡	5215.16	13.48	5215.16
沙河店镇	3423.33	8.85	3423.33
王西章乡	2858.02	7.39	2858.02
谢庄乡	740.89	1.92	740.89
新寨店镇	3416.88	8.83	3416.88
赵州镇	4824.89	12.47	4824.89
合计	38681.85	100	38681.85

质控意见	不通过	质控日期	2026 年 7 月 6 日
整改复核结论	继续整改	质控单位	中国农业大学土地科学与技术学院