


河北省第三次全国土壤普查


土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位		区县/市名	新乐市
质控结果		质控日期	2026.9.5

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	第一章 土壤普查概述 新乐市位于河北省西南部，地处太行山东麓山前倾斜平原，是华北平原向太行山过渡的重要农业区，地理区位优势显著。其地理坐标跨度为东经114°30'至115°10'、北纬38°20'至38°40'，东与定州市接壤，南邻藁城区，西连行唐市，北接曲阳县，周边交通网络密集，G4京港澳高速公路、S52新元高速公路及多条国省干道贯穿全境，对外联系便捷。全市辖区总面积达525平方公里，耕地面积约46万亩，在石家庄市各市区中占据重要的农业生产份额。 气候方面，新乐市属于典型的暖温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，气温日较差较大。年平均气温约为13.2℃，全年无霜期约200天，热量资源可满足一年两熟制的农作物生长需求。年平均降雨量约为498.6毫米，降水时空分布不均，其中每年7至8月的汛期降雨量最为集中，占全年总降雨量的60%以上，降水特征对区域农业生产和土壤墒情调控具有重要影响。 地形地貌上，新乐市整体呈现出“西北高、东南低”的缓倾地势格局，地貌类型以山前倾斜平原为主，海拔高度在65至105米之间，自然坡度约为千分之1.3。境内地势平坦开阔，土壤母质以河流冲积物为主，表层土壤约70%为沙壤质和轻	文本格式不符合标准，行距以及是否加粗等
2	面积为46.2万亩，以水浇地为主，是粮食和经济作物生产的核心区域，主要种植小麦、玉米、花生及西瓜等作物；园地面积约5.8万亩，集中分布在大沙河沿岸乡镇，以梨、苹果等果树为主；林地面积约6.5万亩，主要为农田防护林和部分	单位为万亩没有保留两位小数

序号	问题截图	备注																																												
3	： 土类只有潮土亚类一个亚类。总面积46240亩，占全市、布于沙河与木刀沟两个河道、河漫滩内以及木村、堽洼地带。再按土壤的发育特征，成土母质类型和表层中积潮土属，壤质冲积潮土属，壤质洪积冲积潮土属，	整个报告种的面积单位未统一																																												
4		概述部分不够详细，未列出部分关键数据																																												
5		土壤类型与制图部分，土壤性状变化分析不足，未进行系统性的量化分析																																												
6	潮土、沙质潮土(冲积土)，A21—UT。 2.土壤类型分布规律 新乐市位于河北省南部、石家庄市东北部。东南稍高，西北低，由东南向西北倾斜。根据新乐市三普数据，新乐市土壤类型分布特征可概括如下：  <table><tr><td>亚 类</td><td>潮 褐 土</td><td>棕 褐 土</td><td>潮 褐 土</td><td>典型潮土</td><td>典型潮土</td><td>典型潮土</td><td>潮 褐 土</td><td>石灰性褐土</td><td>典型潮土</td><td>潮 褐 土</td></tr><tr><td>土 属</td><td>泥 砂 质</td><td>壤 质</td><td>泥 砂 质</td><td>壤 质</td><td>石灰性潮土</td><td>壤 质</td><td>泥 砂 质</td><td>砂 质</td><td>石灰性潮土</td><td>泥 砂 质</td></tr><tr><td>母 质</td><td colspan="10">冲 洪 积 物</td></tr><tr><td>地 形</td><td colspan="10">冲 积 平 原</td></tr></table> 图3.3新乐市断面图	亚 类	潮 褐 土	棕 褐 土	潮 褐 土	典型潮土	典型潮土	典型潮土	潮 褐 土	石灰性褐土	典型潮土	潮 褐 土	土 属	泥 砂 质	壤 质	泥 砂 质	壤 质	石灰性潮土	壤 质	泥 砂 质	砂 质	石灰性潮土	泥 砂 质	母 质	冲 洪 积 物										地 形	冲 积 平 原										断面图不规范，未标注土种
亚 类	潮 褐 土	棕 褐 土	潮 褐 土	典型潮土	典型潮土	典型潮土	潮 褐 土	石灰性褐土	典型潮土	潮 褐 土																																				
土 属	泥 砂 质	壤 质	泥 砂 质	壤 质	石灰性潮土	壤 质	泥 砂 质	砂 质	石灰性潮土	泥 砂 质																																				
母 质	冲 洪 积 物																																													
地 形	冲 积 平 原																																													

序号	问题截图	备注										
7	及时补充到调查数据中，使土壤普查数据更加完善和准确。野外校核信息见下图。  图3.36新乐市野外校核信息表 (3) 野外工作实施阶段	部分图片在报告中看不清										
8	以15.0~20.0g/kg的3级耕地为主体，配以一定面积20.0~25.0g/kg的2级耕地，极高和偏低有机质地块占比较小。统计结果表明，全市耕地有机质含量范围为9.24~27.49g/kg，面积加权平均值约为17.57g/kg。按本次有机质分级结果，1级(>25.0g <table><tr><td>1级(1.00-1.25)</td><td>2级(1.25-1.35,)</td><td>3级(1.35-1.45)</td><td>4级(1.45-1.55)</td><td>5级(>1.55)</td></tr><tr><td>)</td><td>≤1.00)</td><td>)</td><td>)</td><td>)</td></tr></table>	1级(1.00-1.25)	2级(1.25-1.35,)	3级(1.35-1.45)	4级(1.45-1.55)	5级(>1.55)	)	≤1.00)	)	)	)	表示范围的符号前后表达不统一
1级(1.00-1.25)	2级(1.25-1.35,)	3级(1.35-1.45)	4级(1.45-1.55)	5级(>1.55)								
)	≤1.00)	)	)	)								