

河北省第三次全国土壤普查

土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位		区县/市名	深泽县
质控结果		质控日期	2026.9.5

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	部分少量坑塘、沟渠，构成了较为完善的农田水利灌溉体系。 本次普查涉及的主要土地利用类型及面积如下：耕地27.14万亩，包括水田（约1亩）、水浇地（27.14万亩）共2个二级类；园地1.56万亩，含果园（1.54万亩）、其他园地（0.02万亩）共2个二级类；林地1.89万亩，含乔木林地、其他林地共2个二级类；草地0.23万亩，含其他草地1个二级类；未利用地0.61万亩。各类型土地均纳入普查范围，确保土壤资源调查的全面性。（附土地利用现状图）。	面积单位未统一
2	全域以一年两熟为主（小麦-玉米轮作）。主要作物播种面积中，粮食作物45.4万亩，经济作物6.8万亩，饲料作物1.2万亩，粮经饲比例为84.1:12.6:3.3。近年来，特色农业发展迅速，深泽红薯、白山药、中药材、特色果品等种植规模达5.2万亩，成为县域农业增效、农民增收的重要支撑。	万亩单位没有保留两位小数
3		土壤农业利用适宜性评价部分没有将评价结果与“三区三线”对比，没有涉及扣除城镇空间和生态空间后分析广义后备耕地资源

序号	问题截图	备注																																																																																																																				
4	二、存在问题及对策建议 321 第八章 土壤资源综合利用建议 326 一、土壤资源利用现状与问题 326 二、土壤农业综合利用分区 335 三、土壤资源保护与利用建议 341 I 摘要 第三次全国土壤普查是重要的国情国力调查,对提升土壤资源保护与利用水平、保障国家粮食安全意义重大。深泽县积极响应国家部署,扎实推进土壤三普 报告缺少图表目录																																																																																																																					
5	质耕地。 表7.7 深泽县耕地质量等级评价土壤有机质含量分布统计 <table><tr><th rowspan="2">行政 单位</th><th colspan="2">1级 (>25g/kg)</th><th colspan="2">2级 (20~25g/kg)</th><th colspan="2">3级 (15~20g/kg)</th><th colspan="2">4级 (10~15g/kg)</th><th colspan="2">5级 (≤10g/kg)</th><th colspan="2">合计</th></tr><tr><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th></tr><tr><td>深泽镇</td><td>0</td><td>0</td><td>2811</td><td>23.06</td><td>6178</td><td>50.69</td><td>3185</td><td>26.13</td><td>14</td><td>0.11</td><td>12188</td><td>4.49</td></tr><tr><td>铁杆镇</td><td>0</td><td>0</td><td>7427</td><td>10.76</td><td>42350</td><td>61.34</td><td>18984</td><td>27.5</td><td>282</td><td>0.41</td><td>69043</td><td>25.44</td></tr><tr><td>赵八镇</td><td>0</td><td>0</td><td>6269</td><td>17.85</td><td>25867</td><td>73.64</td><td>2693</td><td>7.67</td><td>298</td><td>0.85</td><td>35126</td><td>12.94</td></tr><tr><td>大桥头镇</td><td>0</td><td>0</td><td>455</td><td>0.85</td><td>40587</td><td>75.66</td><td>12473</td><td>23.25</td><td>131</td><td>0.24</td><td>53647</td><td>19.77</td></tr><tr><td>白庄乡</td><td>0</td><td>0</td><td>29220</td><td>47.58</td><td>29726</td><td>48.4</td><td>1543</td><td>2.51</td><td>926</td><td>1.51</td><td>61415</td><td>22.63</td></tr><tr><td>留村乡</td><td>0</td><td>0</td><td>21867</td><td>54.75</td><td>16218</td><td>40.61</td><td>1659</td><td>4.15</td><td>193</td><td>0.48</td><td>39937</td><td>14.72</td></tr><tr><td>全县</td><td>0</td><td>0</td><td>68049</td><td>25.08</td><td>160926</td><td>59.3</td><td>40537.23</td><td>14.94</td><td>1844</td><td>0.68</td><td>271355</td><td>100.00</td></tr></table> 289	行政 单位	1级 (>25g/kg)		2级 (20~25g/kg)		3级 (15~20g/kg)		4级 (10~15g/kg)		5级 (≤10g/kg)		合计		面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	深泽镇	0	0	2811	23.06	6178	50.69	3185	26.13	14	0.11	12188	4.49	铁杆镇	0	0	7427	10.76	42350	61.34	18984	27.5	282	0.41	69043	25.44	赵八镇	0	0	6269	17.85	25867	73.64	2693	7.67	298	0.85	35126	12.94	大桥头镇	0	0	455	0.85	40587	75.66	12473	23.25	131	0.24	53647	19.77	白庄乡	0	0	29220	47.58	29726	48.4	1543	2.51	926	1.51	61415	22.63	留村乡	0	0	21867	54.75	16218	40.61	1659	4.15	193	0.48	39937	14.72	全县	0	0	68049	25.08	160926	59.3	40537.23	14.94	1844	0.68	271355	100.00	部分表格未居中
行政 单位	1级 (>25g/kg)		2级 (20~25g/kg)		3级 (15~20g/kg)		4级 (10~15g/kg)		5级 (≤10g/kg)		合计																																																																																																											
	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)																																																																																																										
深泽镇	0	0	2811	23.06	6178	50.69	3185	26.13	14	0.11	12188	4.49																																																																																																										
铁杆镇	0	0	7427	10.76	42350	61.34	18984	27.5	282	0.41	69043	25.44																																																																																																										
赵八镇	0	0	6269	17.85	25867	73.64	2693	7.67	298	0.85	35126	12.94																																																																																																										
大桥头镇	0	0	455	0.85	40587	75.66	12473	23.25	131	0.24	53647	19.77																																																																																																										
白庄乡	0	0	29220	47.58	29726	48.4	1543	2.51	926	1.51	61415	22.63																																																																																																										
留村乡	0	0	21867	54.75	16218	40.61	1659	4.15	193	0.48	39937	14.72																																																																																																										
全县	0	0	68049	25.08	160926	59.3	40537.23	14.94	1844	0.68	271355	100.00																																																																																																										

序号	问题截图	备注																																																																																										
6	表7.8 深泽县耕地质量等级评价土壤酸碱度分布统计 <table><tr><th colspan="2">1级 6.5~7.5)</th><th colspan="2">2级 (7.5~8.0)</th><th colspan="2">3级 (8.0~8.5)</th><th colspan="2">4级 (8.5~9.0)</th><th colspan="2">合计</th></tr><tr><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th><th>面积 (亩)</th><th>占比 (%)</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>12188</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>12188</td><td>4.49</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>69043</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>69043</td><td>25.44</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>35126</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>35126</td><td>12.94</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>53647</td><td>100</td><td>0</td><td>0</td><td>53647</td><td>19.77</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>35</td><td>0.06</td><td>61380</td><td>99.94</td><td>0</td><td>0</td><td>61415</td><td>22.63</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>77</td><td>0.19</td><td>39860</td><td>99.81</td><td>0</td><td>0</td><td>39937</td><td>14.72</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>112</td><td>0.04</td><td>271243</td><td>99.96</td><td>0</td><td>0</td><td>271355</td><td>100.00</td></tr></table> 东部的滹沱河冲积平原及全县主要农耕区域；褐土占县域面积的36.69%，以潮褐土亚类为主，主要分布在深泽县西部、北部的缓岗台地区域；风沙土面积仅892亩，以草甸风沙土为主，仅在滹沱河故道、河漫滩及东部局部区域呈条带状零星分布。（2）土壤以壤土和砂质壤土为主体，整体呈弱碱性至碱性，99.59%的区域pH集中在8.0~8.5之间；阳离子交换量均值12.97cmol/kg，保肥能力中等偏上；土壤有机质均值17.46g/kg、全氮均值1.03g/kg，整体储备较为丰富；全磷均值0.98g/kg、全钾均值18.61g/kg、速效钾均值139.30mg/kg，磷钾库总量充足，但受碱性环境影响磷素易被钙镁固定，有效磷供应受土壤碱性制约明显；中微量元	1级 6.5~7.5)		2级 (7.5~8.0)		3级 (8.0~8.5)		4级 (8.5~9.0)		合计		面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	0	0	0	0	12188	100	0	0	12188	4.49	0	0	0	0	69043	100	0	0	69043	25.44	0	0	0	0	35126	100	0	0	35126	12.94	0	0	0	0	53647	100	0	0	53647	19.77	0	0	35	0.06	61380	99.94	0	0	61415	22.63	0	0	77	0.19	39860	99.81	0	0	39937	14.72	0	0	112	0.04	271243	99.96	0	0	271355	100.00	PH 数据前后表述不一致
1级 6.5~7.5)		2级 (7.5~8.0)		3级 (8.0~8.5)		4级 (8.5~9.0)		合计																																																																																				
面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)	面积 (亩)	占比 (%)																																																																																			
0	0	0	0	12188	100	0	0	12188	4.49																																																																																			
0	0	0	0	69043	100	0	0	69043	25.44																																																																																			
0	0	0	0	35126	100	0	0	35126	12.94																																																																																			
0	0	0	0	53647	100	0	0	53647	19.77																																																																																			
0	0	35	0.06	61380	99.94	0	0	61415	22.63																																																																																			
0	0	77	0.19	39860	99.81	0	0	39937	14.72																																																																																			
0	0	112	0.04	271243	99.96	0	0	271355	100.00																																																																																			
7	理化性状、化学性质、生态环境及生产条件等关键程度，具体情况如下： （1）6项指标作为适宜类判断的依据：确定坡度（p）、潜在土壤侵蚀量（c）、土壤厚度（l）、水资源保障条件（w）、排水能力（d）、土壤盐碱化（s）。 （2）4项指标用以在适宜类基础上进一步细分高度适宜、中等适宜和勉强适宜等适宜程度：土壤pH（a）、土壤质地（m）、有机质含量（n）、土壤重金属污染（c）。 在限制因素选取过程中，结合无极县地形地貌等自然资源禀赋以及土壤三数据等因素对黄淮海区10项指标进行逐一分析，最终筛选出纳入无极县土壤农利用适宜评价中的7项关键限制因素，分别是坡度、水资源保障条件、排水能力、土壤盐碱化、有机质含量、pH、土壤重金属污染，具体情况如下。 表4.13 深泽县土壤农利用适宜性评价限制因素指标	文本中出现其他县，有套用模板痕迹																																																																																										
8	土壤砂化，同时耕作管理较为粗放，容重也处于较高水平。 表4.10 土壤物理性质历史变化 <table><tr><th>土壤理化性质</th><th>单位</th><th>2006年均值</th><th>2017年均值</th><th>三普均值</th></tr><tr><td>耕作层厚度</td><td>cm</td><td>12.8</td><td>19.0</td><td>13.23</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>g/cm3</td><td>1.32</td><td>1.38</td><td>13.41</td></tr></table> 103 <table><tr><th>土壤理化性质</th><th>单位</th><th>2006年均值</th><th>2017年均值</th><th>三普均值</th></tr><tr><td>耕作层厚度</td><td>cm</td><td>12.8</td><td>19.0</td><td>13.23</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>g/cm3</td><td>1.32</td><td>1.38</td><td>13.41</td></tr></table>	土壤理化性质	单位	2006年均值	2017年均值	三普均值	耕作层厚度	cm	12.8	19.0	13.23	土壤容重	g/cm3	1.32	1.38	13.41	土壤理化性质	单位	2006年均值	2017年均值	三普均值	耕作层厚度	cm	12.8	19.0	13.23	土壤容重	g/cm3	1.32	1.38	13.41	表出现了两个表头																																																												
土壤理化性质	单位	2006年均值	2017年均值	三普均值																																																																																								
耕作层厚度	cm	12.8	19.0	13.23																																																																																								
土壤容重	g/cm3	1.32	1.38	13.41																																																																																								
土壤理化性质	单位	2006年均值	2017年均值	三普均值																																																																																								
耕作层厚度	cm	12.8	19.0	13.23																																																																																								
土壤容重	g/cm3	1.32	1.38	13.41																																																																																								

序号	问题截图	备注																									
9	土壤电导率 <table><tr><th>级</th><th>值域(cmol/kg)</th></tr><tr><td>及</td><td>>20</td></tr><tr><td>及</td><td>15.0-20.0</td></tr><tr><td>及</td><td>10.0-15.0</td></tr><tr><td>及</td><td>5.0-10.0</td></tr><tr><td>及</td><td><=5.0</td></tr></table> 从电导率来看，2级区间有175个，占总样点的79.04%，对应2级区间（15.0~20.0cmol/kg）样点334个，4级区间（5.0~10.0cmol/kg）样点仅1个。全域未出现CEC大于20cmol/kg的1级高	级	值域(cmol/kg)	及	>20	及	15.0-20.0	及	10.0-15.0	及	5.0-10.0	及	<=5.0	前后表示范围的符号未统一形式													
级	值域(cmol/kg)																										
及	>20																										
及	15.0-20.0																										
及	10.0-15.0																										
及	5.0-10.0																										
及	<=5.0																										
10	类（褐土、潮土、风沙土），4个亚类（典型潮土、脱潮土、草甸风沙土、潮褐土），7个土属和24个土种（表3.1）。 表3.1 深泽县土壤发生分类系统 <table><tr><th>土类</th><th>亚类</th><th>土属</th><th>土种（简称）</th><th>土种</th></tr><tr><td></td><td></td><td>砂质潮土</td><td></td><td>均砂壤潮土</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>均砂质潮土</td></tr><tr><td></td><td>典型潮土</td><td>砂质石灰性潮土</td><td></td><td>均砂壤石灰性潮土</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>砂底黏石灰性潮土</td></tr></table>  下发的土壤类型成果里就是空的	土类	亚类	土属	土种（简称）	土种			砂质潮土		均砂壤潮土					均砂质潮土		典型潮土	砂质石灰性潮土		均砂壤石灰性潮土					砂底黏石灰性潮土	确保提交的是最终版本
土类	亚类	土属	土种（简称）	土种																							
		砂质潮土		均砂壤潮土																							
				均砂质潮土																							
	典型潮土	砂质石灰性潮土		均砂壤石灰性潮土																							
				砂底黏石灰性潮土																							
11	<table><tr><th>经纬度</th><th>土壤管理：种肥同播</th><th>土</th><th>剖面描述</th></tr><tr><td>115.196048, 38.169727 河北省石家庄市深泽县南关村</td><td>气候：暖温带半湿润大陆性季风气候； 母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：乔木林地；植被类型：阔叶林-杨树</td><td> 潮土 脱潮土 脱潮壤土 轻壤夹黏 脱潮土 </td><td>雏形土-干润 雏形土-底锈 干润雏形土- 普通底锈干 润雏形</td></tr><tr><td>115.274825, 38.184863 河北省石家庄市深泽县赵庄村</td><td>气候：暖温带半湿润大陆性季风气候； 母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：乔木林地；植被类型：阔叶林-杨树</td><td>潮土_脱潮 土_脱潮壤 土_轻壤质 脱潮土</td><td>雏形土-干润 雏形土-底锈 干润雏形土- 普通底锈干 润雏形</td></tr><tr><td>115.178077, 38.193662 河北省石家庄市深泽县小贾庄</td><td>气候：暖温带半湿润大陆性季风气候； 母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：乔木林地；植被类型：乔木林地； 植被类型：阔叶林-杨树</td><td> 潮土 脱潮土 脱潮壤土 轻壤底黏 脱潮土 </td><td>雏形土-干润 雏形土-底锈 干润雏形土- 普通底锈干 润雏形</td></tr><tr><td>115.255013, 38.235555</td><td>气候：暖温带半湿润大陆性季风气候； 母质：洪冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用</td><td>褐土_潮褐 土_泥砂质 潮褐土_轻</td><td>淋溶土-干润 淋溶土-简育</td></tr></table>	经纬度	土壤管理：种肥同播	土	剖面描述	115.196048, 38.169727 河北省石家庄市深泽县南关村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候； 母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：乔木林地；植被类型：阔叶林-杨树	潮土 脱潮土 脱潮壤土 轻壤夹黏 脱潮土	雏形土-干润 雏形土-底锈 干润雏形土- 普通底锈干 润雏形	115.274825, 38.184863 河北省石家庄市深泽县赵庄村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候； 母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：乔木林地；植被类型：阔叶林-杨树	潮土_脱潮 土_脱潮壤 土_轻壤质 脱潮土	雏形土-干润 雏形土-底锈 干润雏形土- 普通底锈干 润雏形	115.178077, 38.193662 河北省石家庄市深泽县小贾庄	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候； 母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：乔木林地；植被类型：乔木林地； 植被类型：阔叶林-杨树	潮土 脱潮土 脱潮壤土 轻壤底黏 脱潮土	雏形土-干润 雏形土-底锈 干润雏形土- 普通底锈干 润雏形	115.255013, 38.235555	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候； 母质：洪冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用	褐土_潮褐 土_泥砂质 潮褐土_轻	淋溶土-干润 淋溶土-简育	表格中部分文字位置存在问题					
经纬度	土壤管理：种肥同播	土	剖面描述																								
115.196048, 38.169727 河北省石家庄市深泽县南关村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候； 母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：乔木林地；植被类型：阔叶林-杨树	潮土 脱潮土 脱潮壤土 轻壤夹黏 脱潮土	雏形土-干润 雏形土-底锈 干润雏形土- 普通底锈干 润雏形																								
115.274825, 38.184863 河北省石家庄市深泽县赵庄村	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候； 母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：乔木林地；植被类型：阔叶林-杨树	潮土_脱潮 土_脱潮壤 土_轻壤质 脱潮土	雏形土-干润 雏形土-底锈 干润雏形土- 普通底锈干 润雏形																								
115.178077, 38.193662 河北省石家庄市深泽县小贾庄	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候； 母质：冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用类型：乔木林地；植被类型：乔木林地； 植被类型：阔叶林-杨树	潮土 脱潮土 脱潮壤土 轻壤底黏 脱潮土	雏形土-干润 雏形土-底锈 干润雏形土- 普通底锈干 润雏形																								
115.255013, 38.235555	气候：暖温带半湿润大陆性季风气候； 母质：洪冲积物；母岩：第四纪松散沉积物；地形地貌：平原-冲积平原-阶地-低阶地；侵蚀状况：无；土地利用	褐土_潮褐 土_泥砂质 潮褐土_轻	淋溶土-干润 淋溶土-简育																								

序号	问题截图	备注
12	深泽县土壤类型图	附上的部分图略欠清晰