






河北省第三次全国土壤普查

土壤资源评价与利用报告质控表



被检单位	河北湛沪软件开发有限公司	区县/市名	井陘县
质控结果		质控日期	2026.9.5

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	 图 3.1 井陘县三普土壤图	部分图清晰度过低
2		存在土种命名对不上，如砂壤厚层麻砂质褐土没有在三普分类表中出现

序号	问题截图	备注
3	 130121井陘县第三次全国土壤普查工作报告 130121井陘县第三次全国土壤普查数据报告 130121井陘县第三次全国土壤普查土壤资源评... 130121井陘县第三次全国土壤普查总体报告	未提供 PDF 版本
4	 图表目录 图 1.1 普查任务技术路线图.....7 表 1.1 主要数据来源概述.....7 表 2.1 土地利用现状统计表.....14 表 3.1 井陘县土壤.....17 表 3.2 井陘县土壤系统分类与发生分类参比对照表.....19 表 3.3 二普-三普土体构型对比.....20 表 3.4 二普与三普土属分类对应一览表.....21 表 3.5 二普与三普土种命名规则对应一览表.....21 表 3.6 二普土壤类型参比表.....22 图 3.2 技术路线图.....25 图 3.3 井陘县边界校核对比图.....27 图 3.4 井陘县室内校核对比图.....28 表 3.7 井陘县疑问图斑情况表.....29	目录不整齐
5	 灰泥质淋溶褐土、麻砂质淋溶褐土、泥质淋溶褐土、暗泥质石灰性褐土、硅质石灰性褐土、黄土质石灰性褐土、灰泥质石灰性褐土、泥砂质石灰性褐土、泥质石灰性褐土、运移扰动土、硅质棕壤、麻砂质棕壤），66个土种。 土壤三普土壤分类体系表（表 3.1）；此表后附上发生分类与系统分类对照表。	格式错误常见
6	 K \I _Toc13137 表3.8雄安新区容城县野外校核土种变更信息 \I _Toc10786 表3.10雄安新区容城县可能改变区校核结果表 表3.8雄安新区容城县野外校核土种变更信息表	常出现非本县内容

序号	问题截图	备注																																																																																																						
7	质含量低（一般 10-20 g/kg 左右），而且表土层薄（一般小于 30 cm）。（为活动与气候变迁叠加过程。人为耕作施肥，特别是华北地区的河谷地区，施用土粪（黄土垫圈堆肥），形成壤土的叠加过程。井陘县的褐土土类分布在水镇、辛庄乡、苍岩山镇，面积为 2050560 亩。 （1）潮褐土：主要分布在小作镇、吴家窑乡、微水镇皇镇、土门乡、乡，潮褐土除腐殖质积累和黏化过程外，要存在潜育化过程。 河等河谷地带的河漫滩和一级阶地，具有很明显的石灰性，均为典型潮土亚 井陘县土壤总面积约 1749204 亩，从成土的自然条件及分布面积上看土土类是井陘县面积最大的一类土壤，占土壤总面积的 95% 以上，以典型和褐土性土为主；其次是潮土土类，仅占总面积的 5% 以下，全部为典型	褐土面积大于土壤总面积																																																																																																						
8		文本格式不符合规范，字体字号错误																																																																																																						
9	本外为井陘县容城县土壤类型图斑面积及面积信息表。如下表， <table><caption>表 3.8 雄安新区容城县野外校核土种变更信息表</caption><thead><tr><th>经度</th><th>纬度</th><th>二普土种</th><th>校核结果</th><th>面</th></tr></thead><tbody><tr><td>115.7810285</td><td>38.96885096</td><td>轻壤质潮土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>42.</td></tr><tr><td>116.0301286</td><td>38.99344947</td><td>轻壤质轻度氯化物盐化潮土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>6.0</td></tr><tr><td>115.9986954</td><td>38.99842683</td><td>壤质氯化物盐化潮土</td><td>均黏壤石灰性潮土</td><td>1.3</td></tr><tr><td>115.8814176</td><td>38.99937515</td><td>轻壤质潮土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>25.9</td></tr><tr><td>116.0297747</td><td>39.00330617</td><td>轻壤质身砂潮土</td><td>壤体砂石灰性潮土</td><td>1.8</td></tr><tr><td>116.0022823</td><td>39.00467493</td><td>壤质氯化物盐化潮土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>1.3</td></tr><tr><td>115.8197999</td><td>39.01326219</td><td>轻壤质底黏潮土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>0.9</td></tr><tr><td>115.783466</td><td>39.04544384</td><td>轻壤质潮土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>42.</td></tr><tr><td>115.7712763</td><td>39.06853469</td><td>轻壤质夹黏潮土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>6.8</td></tr><tr><td>115.9767073</td><td>39.07024443</td><td>轻壤质轻度硫酸盐盐化潮土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>3.1</td></tr><tr><td>115.794394</td><td>39.08502982</td><td>轻壤质身黏潮土</td><td>壤体黏石灰性潮土</td><td>9.6</td></tr><tr><td>115.8227328</td><td>39.08798431</td><td>轻壤质身黏潮土</td><td>壤体黏石灰性潮土</td><td>3.9</td></tr><tr><td>115.9658811</td><td>39.08888472</td><td>轻壤质泥砂质潮褐土</td><td>均壤质泥砂质潮褐土</td><td>23.</td></tr><tr><td>115.830342</td><td>39.10481958</td><td>轻壤质底黏潮土</td><td>壤底黏石灰性潮土</td><td>8.</td></tr><tr><td>115.8811193</td><td>39.10881273</td><td>轻壤质泥砂质潮褐土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>34.</td></tr><tr><td>115.8219516</td><td>39.10217835</td><td>轻壤质底黏潮土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>8.</td></tr><tr><td>115.8252358</td><td>38.99480128</td><td>轻壤质泥砂质潮褐土</td><td>均壤质石灰性潮土</td><td>2.6</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>17</td><td>6</td><td>221</td></tr></tbody></table> 提取了土壤类型可能发生变化的地块图斑之后，对土壤类型可能发生变化的地块图斑进行了土壤类型预判研讨，结合母质、图斑位置、原有土种信息等，判提取图斑土壤类型可能发生的变化。 识别土壤类型可能改变区之后，选取了各种可能改变情形下的典型图斑，其是可能改变图斑集中分布的区域，进行了野外校核点位布置。 <table><caption>表 3.10 雄安新区容城县可能改变区校核结果表</caption><thead><tr><th>改变类型</th><th>图斑个数</th><th>点位个数</th><th>二普土种</th><th>校核结果</th><th>编号</th><th>面积(k</th></tr></thead></table>	经度	纬度	二普土种	校核结果	面	115.7810285	38.96885096	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	42.	116.0301286	38.99344947	轻壤质轻度氯化物盐化潮土	均壤质石灰性潮土	6.0	115.9986954	38.99842683	壤质氯化物盐化潮土	均黏壤石灰性潮土	1.3	115.8814176	38.99937515	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	25.9	116.0297747	39.00330617	轻壤质身砂潮土	壤体砂石灰性潮土	1.8	116.0022823	39.00467493	壤质氯化物盐化潮土	均壤质石灰性潮土	1.3	115.8197999	39.01326219	轻壤质底黏潮土	均壤质石灰性潮土	0.9	115.783466	39.04544384	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	42.	115.7712763	39.06853469	轻壤质夹黏潮土	均壤质石灰性潮土	6.8	115.9767073	39.07024443	轻壤质轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	3.1	115.794394	39.08502982	轻壤质身黏潮土	壤体黏石灰性潮土	9.6	115.8227328	39.08798431	轻壤质身黏潮土	壤体黏石灰性潮土	3.9	115.9658811	39.08888472	轻壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	23.	115.830342	39.10481958	轻壤质底黏潮土	壤底黏石灰性潮土	8.	115.8811193	39.10881273	轻壤质泥砂质潮褐土	均壤质石灰性潮土	34.	115.8219516	39.10217835	轻壤质底黏潮土	均壤质石灰性潮土	8.	115.8252358	38.99480128	轻壤质泥砂质潮褐土	均壤质石灰性潮土	2.6	合计		17	6	221	改变类型	图斑个数	点位个数	二普土种	校核结果	编号	面积(k	表 3.8 后就是 3.10
经度	纬度	二普土种	校核结果	面																																																																																																				
115.7810285	38.96885096	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	42.																																																																																																				
116.0301286	38.99344947	轻壤质轻度氯化物盐化潮土	均壤质石灰性潮土	6.0																																																																																																				
115.9986954	38.99842683	壤质氯化物盐化潮土	均黏壤石灰性潮土	1.3																																																																																																				
115.8814176	38.99937515	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	25.9																																																																																																				
116.0297747	39.00330617	轻壤质身砂潮土	壤体砂石灰性潮土	1.8																																																																																																				
116.0022823	39.00467493	壤质氯化物盐化潮土	均壤质石灰性潮土	1.3																																																																																																				
115.8197999	39.01326219	轻壤质底黏潮土	均壤质石灰性潮土	0.9																																																																																																				
115.783466	39.04544384	轻壤质潮土	均壤质石灰性潮土	42.																																																																																																				
115.7712763	39.06853469	轻壤质夹黏潮土	均壤质石灰性潮土	6.8																																																																																																				
115.9767073	39.07024443	轻壤质轻度硫酸盐盐化潮土	均壤质石灰性潮土	3.1																																																																																																				
115.794394	39.08502982	轻壤质身黏潮土	壤体黏石灰性潮土	9.6																																																																																																				
115.8227328	39.08798431	轻壤质身黏潮土	壤体黏石灰性潮土	3.9																																																																																																				
115.9658811	39.08888472	轻壤质泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	23.																																																																																																				
115.830342	39.10481958	轻壤质底黏潮土	壤底黏石灰性潮土	8.																																																																																																				
115.8811193	39.10881273	轻壤质泥砂质潮褐土	均壤质石灰性潮土	34.																																																																																																				
115.8219516	39.10217835	轻壤质底黏潮土	均壤质石灰性潮土	8.																																																																																																				
115.8252358	38.99480128	轻壤质泥砂质潮褐土	均壤质石灰性潮土	2.6																																																																																																				
合计		17	6	221																																																																																																				
改变类型	图斑个数	点位个数	二普土种	校核结果	编号	面积(k																																																																																																		

序号	问题截图	备注
10	 图 3.15 井陘县推测制图应用对比	图不对齐
11		存在多处前后数据对不上情况
12	(五) 空间验证  图 4.32 空间验证图	图片过于小

序号	问题截图	备注
13	主要结果：一是土壤类型方面，全县土壤质地以黏壤土、砂质黏土、壤质黏土为主要类型，从样点统计看，黏壤土样点占比最高为 46.33%，其次是砂质黏壤土（18.77%）、壤质黏土（16.13%）；从制图统计看，砂土及壤质砂土面积最大为 311118 亩，占比 17.79%，其次是黏壤土（352030 亩，占比 20.13%）、砂质黏土（323388 亩，占比 18.49%）。土壤分布呈现明显区域性特征：砂土及	表述明显有误
14	区域，总面积约 13.4 万亩（ 区域，总面积约 71.3 万亩（ 区域，总面积约 14.7 万亩（	面积单位未统一，且万亩未保留两位小数，亩未保留整数
15	等多项核心指标检测。系统完成全县 20911.36 公顷耕地质量等级评价，划定等土地利用类型，其中全县耕地总面积约 20911.36 公顷（313670.4 亩） 地利用现状方面，全县耕地总面积约 20911.36 公顷（31.37 万亩），其中：镇 7 乡全域范围，其中耕地总面积约 20911.36 公顷，涵盖水浇地、旱地等	耕地面积不可使用公顷，应用亩或者万亩
16		规范要求须追溯二普以来土地利用、农业生产、基础设施的历史变化及成因，本报告这部分无数据、无量化、过于简单概括
17		没有对三类土壤类型变化进行详细分析

序号	问题截图	备注
18		土壤农业利用适宜性评价中，没有出现三区三线的具体对比分析，未明确计算和阐述广义后备耕地资源的面积和分布。