

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	天津市地质研究和海洋地质中心	区县/市名	130522 临城区
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注；《县级成果导引》综合报告评分注。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	缺少土特产品评价等章节	
2		
3		

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	一、前言 （一）西部山区.....225 （二）中部丘陵区.....226 （三）东部平原区.....226 四、政策保障与实施路径.....227 （一）资金扶持政策.....227 （二）技术支撑政策.....227 （三）监管与长效管护政策.....227 分节符(下一页)..... 第一章土壤普查概述 临城县隶属河北省邢台市，地处河北省中南部、太行山东麓，北接石家庄赞皇、高邑，东连邢台柏乡县、隆尧县，南邻内丘，西隔太行与山西相望，总面积797平方公里；下辖临城镇、东镇镇、西竖镇、郝庄镇、黑城镇5镇及鸭鸽营乡、石城乡、赵庄乡3乡，共220个行政村、6个社区与1个省级经济开发区。该县属暖温带亚湿润大陆性季风气候，四季分明，年均温13.5℃、年均降水量605	缺少前言、图目录、表目录、摘要。
2	2.分析测试异常值处理方法及结果 依据相关规范，进行滨海新区的检测数据审核，以完整性、规范性和准确性为原则，采用的审核方法如下： ①数据频度分析：采用SPSS软件对土壤pH值、水溶性盐总量、八大离子、阳离子交换量等属性数据进行统计分析，统计指标包括最大值、最小值、中位数、平均值、2%、5%、10%、20%、80%、90%、95%、98%、标准差、变异系数等。同时针对极值和区间值的数据进行分析，判断数据的真实性。	存在“滨海新区”等模板化表述。
3		单位、小数位不统一。

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☒ 符合 ☐ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																											
1	①单甸土：其成土过程、剖面性状和划分依据，同单甸土土类。 ▪ (3) 土属 土属是亚类与土种间具有承上启下的过渡单元，也是基本分类单元，是土种的归纳。同一土属中，剖面特征和生产特性基本相同，改良利用方式也基本一致。土属的划分主要以母质的不同为划分依据。全县共分为 26 个土属。 表 3.2 土属分系统类表 <table><tr><th>土属</th><th>土属名称</th><th>土种个数</th><th>土种号</th><th>面积 (亩)</th><th>占总面积%</th></tr><tr><td rowspan="4">粘 壤 土</td><td>灰钙片麻岩残积粘壤土</td><td>1</td><td>1</td><td>3108</td><td>0.3</td></tr><tr><td>砂页岩残积粘壤土</td><td>1</td><td>2</td><td>918</td><td>0.1</td></tr><tr><td>花岗岩残积粘壤土</td><td>1</td><td>3</td><td>34287</td><td>2</td></tr><tr><td>砂页岩残积粘壤土</td><td>1</td><td>4</td><td>15844</td><td>1.3</td></tr><tr><td rowspan="4">粉 壤 土</td><td>灰钙片麻岩残积粉壤土</td><td>1</td><td>5</td><td>47793</td><td>3.6</td></tr><tr><td>砂页岩残积粉壤土</td><td>1</td><td>6</td><td>19090</td><td>1.7</td></tr><tr><td>人工堆垫粉壤土</td><td>1</td><td>7</td><td>1844</td><td>0.1</td></tr><tr><td>灰钙片麻岩残积粉壤土</td><td>2</td><td>8—9</td><td>7829</td><td>0.6</td></tr><tr><td rowspan="3">黄 土</td><td>砂页岩残积黄土</td><td>1</td><td>10</td><td>1889</td><td>0.1</td></tr><tr><td>黄土性黄土</td><td>2</td><td>11—12</td><td>20771</td><td>1.6</td></tr><tr><td>人工堆垫黄土</td><td>2</td><td>13—14</td><td>6893</td><td>0.6</td></tr><tr><td rowspan="2">石 漠 土</td><td>花岗岩残积灰钙性黄土</td><td>1</td><td>15</td><td>11364</td><td>1</td></tr><tr><td>砂页岩残积灰钙性黄土</td><td>1</td><td>16</td><td>489</td><td>0.03</td></tr></table>	土属	土属名称	土种个数	土种号	面积 (亩)	占总面积%	粘 壤 土	灰钙片麻岩残积粘壤土	1	1	3108	0.3	砂页岩残积粘壤土	1	2	918	0.1	花岗岩残积粘壤土	1	3	34287	2	砂页岩残积粘壤土	1	4	15844	1.3	粉 壤 土	灰钙片麻岩残积粉壤土	1	5	47793	3.6	砂页岩残积粉壤土	1	6	19090	1.7	人工堆垫粉壤土	1	7	1844	0.1	灰钙片麻岩残积粉壤土	2	8—9	7829	0.6	黄 土	砂页岩残积黄土	1	10	1889	0.1	黄土性黄土	2	11—12	20771	1.6	人工堆垫黄土	2	13—14	6893	0.6	石 漠 土	花岗岩残积灰钙性黄土	1	15	11364	1	砂页岩残积灰钙性黄土	1	16	489	0.03	制作表格，图片不清晰
土属	土属名称	土种个数	土种号	面积 (亩)	占总面积%																																																																								
粘 壤 土	灰钙片麻岩残积粘壤土	1	1	3108	0.3																																																																								
	砂页岩残积粘壤土	1	2	918	0.1																																																																								
	花岗岩残积粘壤土	1	3	34287	2																																																																								
	砂页岩残积粘壤土	1	4	15844	1.3																																																																								
粉 壤 土	灰钙片麻岩残积粉壤土	1	5	47793	3.6																																																																								
	砂页岩残积粉壤土	1	6	19090	1.7																																																																								
	人工堆垫粉壤土	1	7	1844	0.1																																																																								
	灰钙片麻岩残积粉壤土	2	8—9	7829	0.6																																																																								
黄 土	砂页岩残积黄土	1	10	1889	0.1																																																																								
	黄土性黄土	2	11—12	20771	1.6																																																																								
	人工堆垫黄土	2	13—14	6893	0.6																																																																								
石 漠 土	花岗岩残积灰钙性黄土	1	15	11364	1																																																																								
	砂页岩残积灰钙性黄土	1	16	489	0.03																																																																								
2		缺少系统分类参比表格																																																																											

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合

审查标准	审查结果
	☒ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																					
1	第四章对物理、化学属性进行了较详细分析，但生物学属性基本未涉及；历史变化分析多集中在有机质、全氮、有效磷、速效钾等，其他属性历史变化不足。																																																																						
2	<table><tr><td>母质</td><td>二普土壤类型图</td><td>1:5万</td><td>1982年</td><td>邢台市土壤三普办</td></tr></table> ▪ (2) 处理方法 通过将上述不同来源的环境变量进行统一格式，总共分为五类环境变量输入反演模型进行不同属性预测，数据处理过程以及最终的属性预测均在 Python3.10 与 ArcGIS10.8 中完成。 地形数据 基于 12.5m 分辨率的 DEM 高程数据，使用 GIS 软件中的表面分析工具计算坡度、坡向等，将其和 DEM 数据一起作为地形因子环境变量。 气象因子 通过在国家青藏高原科学数据中心网站下载的中国 1km 分辨率逐月平均气温数据集（1901-2024）和中国 1km 分辨率逐月降水量数据集（1901-2024）的气温和降水数据，选取 2004-2023 年的数据，按照行政区划裁剪，并将其重分类为 30m 分辨率。 植被因子 Landsat8 遥感影像数据经过辐射校正、大气校正、几何校正、影像镶嵌、裁剪、去云(云量=0)及阴影处理、平滑噪声等操作后，提高了影像的质量，确保后续分析的准确性和可靠性。再使用 Landsat8 遥感影像数据遥感数据的红、绿、蓝、近红外波段计算多种指数，如归一化植被指数 NDVI 和植被指数 EVI，不同波段之间进行数学运算，计算 2018-2023 年五年内的平均含量。 ▪ (3) 土地利用和土壤类型	母质	二普土壤类型图	1:5万	1982年	邢台市土壤三普办	参数、环境变量筛选过程较简略																																																																
母质	二普土壤类型图	1:5万	1982年	邢台市土壤三普办																																																																			
3	临城县土壤砂粒含量水平总体处在丰富水平。临城县土壤粉粒的全县平均均值为 18.46%，表明粉粒含量水平总体在中等偏下。临城县土壤黏粒含量在 1.40-39.40% 之间，土壤黏粒含量处于较缺乏水平。 表 4.1 临城县土壤质地分级分布 <table><tr><th rowspan="2">土壤三普分级</th><th colspan="2">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th>数量（个）</th><th>占比（%）</th><th>面积（亩）</th><th>占比（%）</th></tr><tr><td>砂土及壤质砂土</td><td>21</td><td>9.42</td><td>22</td><td>0.00</td></tr><tr><td>砂质壤土</td><td>68</td><td>30.49</td><td>391186</td><td>40.26</td></tr><tr><td>壤土</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>粉（砂）质壤土</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>砂质黏壤土</td><td>85</td><td>38.12</td><td>574545</td><td>59.12</td></tr><tr><td>黏壤土</td><td>28</td><td>12.56</td><td>4663</td><td>0.48</td></tr><tr><td>粉（砂）质黏壤土</td><td>1</td><td>0.45</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>砂质黏土</td><td>9</td><td>4.04</td><td>196</td><td>0.02</td></tr><tr><td>壤质黏土</td><td>11</td><td>4.93</td><td>1147</td><td>0.12</td></tr><tr><td>粉（砂）质黏土</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>黏土</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>223</td><td>100.00</td><td>971758</td><td>100.00</td></tr></table> ▪ (2) 土地利用类型差异	土壤三普分级	样点统计		制图统计		数量（个）	占比（%）	面积（亩）	占比（%）	砂土及壤质砂土	21	9.42	22	0.00	砂质壤土	68	30.49	391186	40.26	壤土	0	0.00	0	0.00	粉（砂）质壤土	0	0.00	0	0.00	砂质黏壤土	85	38.12	574545	59.12	黏壤土	28	12.56	4663	0.48	粉（砂）质黏壤土	1	0.45	0	0.00	砂质黏土	9	4.04	196	0.02	壤质黏土	11	4.93	1147	0.12	粉（砂）质黏土	0	0.00	0	0.00	黏土	0	0.00	0	0.00	合计	223	100.00	971758	100.00	样点统计与制图统计差异多处未解释。
土壤三普分级	样点统计		制图统计																																																																				
	数量（个）	占比（%）	面积（亩）	占比（%）																																																																			
砂土及壤质砂土	21	9.42	22	0.00																																																																			
砂质壤土	68	30.49	391186	40.26																																																																			
壤土	0	0.00	0	0.00																																																																			
粉（砂）质壤土	0	0.00	0	0.00																																																																			
砂质黏壤土	85	38.12	574545	59.12																																																																			
黏壤土	28	12.56	4663	0.48																																																																			
粉（砂）质黏壤土	1	0.45	0	0.00																																																																			
砂质黏土	9	4.04	196	0.02																																																																			
壤质黏土	11	4.93	1147	0.12																																																																			
粉（砂）质黏土	0	0.00	0	0.00																																																																			
黏土	0	0.00	0	0.00																																																																			
合计	223	100.00	971758	100.00																																																																			

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	避免盲目施肥，提高养分利用率；三是推行保护性耕作，减少深耕翻，采用免耕、少耕技术，降低土壤有机质消耗，改善土壤结构；四是因地制宜调整种植结构，在极度贫瘠区域种植耐瘠薄作物，逐步培肥土壤，实现土地的可持续利用。 二、土壤缺素 （一）分布范围 与土壤瘠薄区域高度重合，主要集中于西部山区、中部丘陵区经济作物种植区和东部设施农业区；其中，核桃种植区易出现缺铁、缺锌，设施蔬菜区易出现缺钙、缺镁等问题。 （二）成因分析 一是土壤瘠薄基础，土壤本身养分储备不足，有机质匮乏导致养分转化和供应能力差，无法满足作物生长需求；二是施肥结构不合理，长期单一施用氮、磷、钾化肥，忽视中微量元素肥料的补充，导致土壤中微量元素逐渐耗尽；三是作物吸收消耗，核桃、枣树等经济作物对特定元素需求较高，长期连作种植会持续消耗土壤中的相应元素，且未及时补充，加剧缺素程度。 （三）危害表现 不同缺素症状直接影响作物生长和产量品质，如缺铁导致作物叶片黄化，光合作用减弱；缺钙导致作物裂果、烂根，产品商品率下降；缺锌导致作物生长萎缩、早衰，产量大幅降低。长期缺素还会进一步削弱作物抗逆性，增加病虫害发生风险，形成恶性循环。 （四）改良措施建议 一是精准补素，针对不同作物缺素类型，采用叶面喷施或土壤基施对应微量元素肥料，设施蔬菜缺钙增施钙肥并配合叶面补钙；二是优化施肥结构，推广测土配方施肥，在施用氮磷钾化肥的基础上，搭配施用含中微量元素的复合肥料，避免单一施肥；三是提升土壤基础肥力，增施腐熟有机肥、生物菌肥，改善土壤结构，增强土壤养分转化和供应能力，从根本上缓解缺素问题；四是合理轮作，避免长期连作，通过轮作豆科作物等方式，平衡土壤养分消耗，减少特定元素匮乏现象。 分节符(下一页)	缺少关键数据和图表支撑。
2		无独立退化报告
3		

问题类别七：第六至八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																						
1	<table><tr><td>总计</td><td>4719</td><td>4618.63</td><td>17.37</td></tr></table> ▪ (2) 六等地属性特征 六等地每个地形都有分布，以丘陵中部为主，占比 5.10%，其次是丘陵上部（占比 3.86%）；有效土层厚度以 60-100cm 为主，占比 9.74%，有效土层厚度 ≥100cm 和 30-60cm 面积较小；质地构型以海绵型和松散型为主，占比 2.67%、3.44%；耕层质地以粉（砂）质壤土、砂质黏壤土为主；酸碱度集中于 8.0-8.5；有机质以 10.0-15.0g/kg 为主，占比 12.59%；有效磷 30.0-40.0mg/kg 面积仅 31.97 公顷；速效钾以 100-150mg/kg、50-100mg/kg 为主；水资源条件以充分满足为主，占比 2705.05%，水资源条件满足占比 2.96%，水资源条件基本满足面积分布较小；排水能力满足占比 8.97%，排水能力充分满足占比 14.42%。 ▪ 6.七等地	总计	4719	4618.63	17.37	笔误																																																		
总计	4719	4618.63	17.37																																																					
2	洪涝灾害等，利用存在严重的土壤退化危险，不适宜农业利用。 ▪ 2.判定适宜程度 在适宜类内，根据限制因素等级≥3 级的限制因素的个数，将宜耕、宜园、宜林、宜草等四个适宜类分别细化为高度适宜（I）、中度适宜（II）、勉强适宜（III）三种适宜程度。 、适宜程度判别表 <table><tr><td>适宜类\适宜程度</td><td>高度适宜（I）</td><td>中度适宜（II）</td><td>勉强适宜（III）</td></tr><tr><td>宜耕</td><td>0</td><td>1</td><td>≥2</td></tr></table> 次土壤农业适宜性评价贴合临城县地形、土壤与传统利用格局，指标体系与分级标准可行，可作为国土空间农业布局优化的可靠依据。 表 6.21 与 2000 年遥感影像验证（单位：亩） <table><tr><td>适宜类</td><td>宜耕</td><td>宜园</td><td>宜林</td><td>总计</td></tr><tr><td>耕地</td><td>426775</td><td>165</td><td>50825</td><td>477765</td></tr><tr><td>林地</td><td>15673</td><td>1644</td><td>172214</td><td>189531</td></tr><tr><td>灌木林地</td><td>4</td><td>3734</td><td>11</td><td>3749</td></tr><tr><td>草地</td><td>83720</td><td>2927</td><td>86276</td><td>172923</td></tr></table> 以山前冲积平原、缓坡台地为主，地势平缓，常规降雨可依靠人工沟渠完成排水 表 6.21 排水能力因素分级表 <table><tr><td>排水能力因素分级</td><td>面积（亩）</td><td>占比（%）</td></tr><tr><td>d1</td><td>593614</td><td>60.71</td></tr><tr><td>d2</td><td>384244</td><td>39.29</td></tr><tr><td>d3</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>d4</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>d5</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>合计</td><td>977859</td><td>100.00</td></tr></table> 临城县排水能力分级图	适宜类\适宜程度	高度适宜（I）	中度适宜（II）	勉强适宜（III）	宜耕	0	1	≥2	适宜类	宜耕	宜园	宜林	总计	耕地	426775	165	50825	477765	林地	15673	1644	172214	189531	灌木林地	4	3734	11	3749	草地	83720	2927	86276	172923	排水能力因素分级	面积（亩）	占比（%）	d1	593614	60.71	d2	384244	39.29	d3	-	-	d4	-	-	d5	-	-	合计	977859	100.00	编号问题
适宜类\适宜程度	高度适宜（I）	中度适宜（II）	勉强适宜（III）																																																					
宜耕	0	1	≥2																																																					
适宜类	宜耕	宜园	宜林	总计																																																				
耕地	426775	165	50825	477765																																																				
林地	15673	1644	172214	189531																																																				
灌木林地	4	3734	11	3749																																																				
草地	83720	2927	86276	172923																																																				
排水能力因素分级	面积（亩）	占比（%）																																																						
d1	593614	60.71																																																						
d2	384244	39.29																																																						
d3	-	-																																																						
d4	-	-																																																						
d5	-	-																																																						
合计	977859	100.00																																																						
3																																																								

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☒ 符合 ☐ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	面积单位“亩”“公顷”“混用； 部分表格小数位不一致；编号错误	
2		
3		