

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	河北合众恩规划管理有限公司	区县/市名	临漳县
质控结果	修改补充后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注：《县级成果导引》综合报告评分注。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注


序号	问题截图	备注
1	缺少“第八章 土特产品土壤适宜性评价”章节 缺少“第五章 土壤退化、障碍与改良”章节	

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。	☐ 符合
来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		缺少图表目录
2		面积单位有“亩”“公顷”“平方公里”混用

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。	☒ 符合
来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☐ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。	☐ 符合
来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☒ 存在问题
自然、社会和农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☐ 存在问题

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

1

▪（二）普查涉及土地利用类型与面积▪

本次普查涵盖的主要地类及面积如下：耕地约·74.92·万亩，包含永久基本农田、粮食生产功能区与一般耕地，是普查的核心对象；园地约·1.87·万亩，以果园种植为主；林地约·8.83·万亩，包含防护林、用材林与经济林；草地约·0.20·万亩，全部为零星分布的其他草地；同时涵盖部分内陆滩涂、沙地等农业关联未利用地，总普查面积约·86·万亩。

一级地类	面积（亩）	占总面积比例	二级地类构成说明
林地	88316.4	7.93%	以乔木林地为主，兼有灌木林地、其他林地，涵盖防护林、用材林、经济林三大功能类型
草地	1976.4	0.17%	全部为其他草地，无天然牧草地与人工牧草地，为零星分布的荒草地
湿地	2075.85	0.19%	以内陆滩涂为主，主要分布在漳河主河道两侧行洪范围内
城镇村及工矿用地	197885.4	17.78%	包含建制镇用地、村庄用地、采矿用地、风景名胜及特殊用地，是城乡建设的主要载体
交通运输用地	29810.55	2.68%	包含公路用地、农村道路、交通运输辅助用地，构成县域内外交通网络
水域及水利设施用地	17537.7	1.58%	包含河流水面、坑塘水面、沟渠、水利建筑用地，承担行洪、灌溉、生态等功能
其他土地	7178.85	0.65%	包含设施农用地、田坎、沙地等，为农业生产配套与未完全利用的边角地块

面积不一致

面积不一致

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积	☐ 符合

审查标准	审查结果
统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☒ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																					
1	▪（一）土壤分类系统▪ 根据土壤二普成果以及临漳县土壤历史资料，结合《GB/T 17296-2009·中国土壤分类与代码》和《第三次全国土壤普查土壤分类系统》（试行版）规范，按照土壤土类、亚类、土属、土种的分类系统，临漳县校核成果有 4 个土类、7 个亚类、12 个土属、44 个土种。潮土分为典型潮土、湿潮土与盐化潮土 3 个亚类。 1. 土壤类型概述 临漳县三普土壤类型按照土类、亚类、土属、土种的分类系统，临漳县有潮土、褐土、人工土 3 个土类，5 个亚类，9 个土属，38 个土种。见表 3-1。 潮土：是临漳县分布最广的土类，由漳河冲积物发育而成。其土层深厚，质地适中，养分较丰富，沉积层里明显。潮土受地下水运动和耕作活动影响较大，具有耕作层、犁底层、盐化层和潜育层等剖面特征。	报告写“临漳县校核成果有 4 个土类、7 个亚类、12 个土属、44 个土种”，但后文“二、土壤类型与变化”写“临漳县有潮土、褐土、人工土 3 个土类，5 个亚类，9 个土属，38 个土种”，前后不一致																																					
2	土族准确命名，所以只做到亚类层级的对比。见表 3-2。 表 3-2·临漳县土壤系统分类与发生分类参比对照 <table><tr><th colspan="2">系统分类</th><th colspan="2">发生分类</th></tr><tr><th>土类</th><th>亚类</th><th>土类</th><th>亚类</th></tr><tr><td>淡色潮湿锥形土</td><td>普通淡色潮湿锥形土</td><td rowspan="3">潮土</td><td>典型潮土</td></tr><tr><td>筒育湿润锥形土</td><td>斑纹筒育湿润锥形土</td><td>湿潮土</td></tr><tr><td>淡色潮湿锥形土</td><td>弱盐淡色潮湿锥形土</td><td>盐化潮土</td></tr><tr><td>筒育干润淋溶土</td><td>斑纹筒育干润淋溶土</td><td rowspan="2">褐土</td><td>潮褐土</td></tr><tr><td>筒育干润淋溶土</td><td>钙积筒育干润淋溶土</td><td>石灰性褐土</td></tr><tr><td>暗沃正常潜育土</td><td>普通暗沃正常潜育土</td><td>沼泽土</td><td>典型沼泽土</td></tr><tr><td>筒育湿润锥形土</td><td>斑纹筒育湿润锥形土</td><td>草甸土</td><td>潜育草甸土</td></tr><tr><td>潮湿砂质新成土</td><td>普通潮湿砂质新成土</td><td>风沙土</td><td>草甸风沙土</td></tr></table> ▪（二）土壤分类历史沿革▪	系统分类		发生分类		土类	亚类	土类	亚类	淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土	潮土	典型潮土	筒育湿润锥形土	斑纹筒育湿润锥形土	湿潮土	淡色潮湿锥形土	弱盐淡色潮湿锥形土	盐化潮土	筒育干润淋溶土	斑纹筒育干润淋溶土	褐土	潮褐土	筒育干润淋溶土	钙积筒育干润淋溶土	石灰性褐土	暗沃正常潜育土	普通暗沃正常潜育土	沼泽土	典型沼泽土	筒育湿润锥形土	斑纹筒育湿润锥形土	草甸土	潜育草甸土	潮湿砂质新成土	普通潮湿砂质新成土	风沙土	草甸风沙土	统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径
系统分类		发生分类																																					
土类	亚类	土类	亚类																																				
淡色潮湿锥形土	普通淡色潮湿锥形土	潮土	典型潮土																																				
筒育湿润锥形土	斑纹筒育湿润锥形土		湿潮土																																				
淡色潮湿锥形土	弱盐淡色潮湿锥形土		盐化潮土																																				
筒育干润淋溶土	斑纹筒育干润淋溶土	褐土	潮褐土																																				
筒育干润淋溶土	钙积筒育干润淋溶土		石灰性褐土																																				
暗沃正常潜育土	普通暗沃正常潜育土	沼泽土	典型沼泽土																																				
筒育湿润锥形土	斑纹筒育湿润锥形土	草甸土	潜育草甸土																																				
潮湿砂质新成土	普通潮湿砂质新成土	风沙土	草甸风沙土																																				

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☐ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☐ 存在问题
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☐ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																																				
1	成性较强的品种，避免因土壤酸碱度不适而导致的产量与品质下降。⁴⁾ 表 10·临漳县土壤 pH 分级分布⁴⁾ <table><tr><th colspan="2">土壤三普分级⁴⁾</th><th colspan="2">样点统计⁴⁾</th><th colspan="2">制图统计⁴⁾</th></tr><tr><th>分级⁴⁾</th><th>值域⁴⁾</th><th>数 量/个⁴⁾</th><th>占 比 /%⁴⁾</th><th>面 积 / 亩⁴⁾</th><th>占 比 /%⁴⁾</th></tr><tr><td>I 级⁴⁾</td><td>6.5-7.5⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td></tr><tr><td>II 级⁴⁾</td><td>7.5-8.0, ⁴⁾ 6.0-6.5⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td></tr><tr><td>III 级⁴⁾</td><td>8.0-8.5, ⁴⁾ 5.5-6.0⁴⁾</td><td>55 8⁴⁾</td><td>100⁴⁾</td><td>110511 2⁴⁾</td><td>100⁴⁾</td></tr><tr><td>IV 级⁴⁾</td><td>8.5-9.0, ⁴⁾ 5.0-5.5⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td></tr><tr><td>V 级⁴⁾</td><td>>9.0, ⁴⁾ ≤5.0⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td></tr></table> 化高标准农田建设中的生态配套措施，逐步遏制土壤持续碱性化，提升土壤养分有效性与健康水平。⁴⁾ 表 15·临漳县土壤 pH 分级历史变化(样点统计)⁴⁾ <table><tr><th colspan="2">土壤三普分级⁴⁾</th><th colspan="2">土壤二普⁴⁾</th><th colspan="2">土壤三普⁴⁾</th></tr><tr><th>分级⁴⁾</th><th>值域⁴⁾</th><th>数量/ 个⁴⁾</th><th>占 比 /%⁴⁾</th><th>数量/ 个⁴⁾</th><th>占 比 /%⁴⁾</th></tr><tr><td>I 级⁴⁾</td><td>6.5-7.5⁴⁾</td><td>10⁴⁾</td><td>38.46⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td></tr><tr><td>II 级⁴⁾</td><td>7.5-8.0 , ⁴⁾ 6.0-6.5⁴⁾</td><td>14⁴⁾</td><td>53.85⁴⁾</td><td>10⁴⁾</td><td>1.79⁴⁾</td></tr><tr><td>III 级⁴⁾</td><td>8.0-8.5 , ⁴⁾ 5.5-6.0⁴⁾</td><td>2⁴⁾</td><td>7.69⁴⁾</td><td>492⁴⁾</td><td>88.17⁴⁾</td></tr><tr><td>IV 级⁴⁾</td><td>8.5-9.0 , ⁴⁾ 5.0-5.5⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td><td>55⁴⁾</td><td>9.86⁴⁾</td></tr><tr><td>V 级⁴⁾</td><td>>9.0, ⁴⁾ ≤5.0⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td><td>1⁴⁾</td><td>0.18⁴⁾</td></tr></table>	土壤三普分级 ⁴⁾		样点统计 ⁴⁾		制图统计 ⁴⁾		分级 ⁴⁾	值域 ⁴⁾	数 量/个 ⁴⁾	占 比 /% ⁴⁾	面 积 / 亩 ⁴⁾	占 比 /% ⁴⁾	I 级 ⁴⁾	6.5-7.5 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	II 级 ⁴⁾	7.5-8.0, ⁴⁾ 6.0-6.5 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	III 级 ⁴⁾	8.0-8.5, ⁴⁾ 5.5-6.0 ⁴⁾	55 8 ⁴⁾	100 ⁴⁾	110511 2 ⁴⁾	100 ⁴⁾	IV 级 ⁴⁾	8.5-9.0, ⁴⁾ 5.0-5.5 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	V 级 ⁴⁾	>9.0, ⁴⁾ ≤5.0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	土壤三普分级 ⁴⁾		土壤二普 ⁴⁾		土壤三普 ⁴⁾		分级 ⁴⁾	值域 ⁴⁾	数量/ 个 ⁴⁾	占 比 /% ⁴⁾	数量/ 个 ⁴⁾	占 比 /% ⁴⁾	I 级 ⁴⁾	6.5-7.5 ⁴⁾	10 ⁴⁾	38.46 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	II 级 ⁴⁾	7.5-8.0 , ⁴⁾ 6.0-6.5 ⁴⁾	14 ⁴⁾	53.85 ⁴⁾	10 ⁴⁾	1.79 ⁴⁾	III 级 ⁴⁾	8.0-8.5 , ⁴⁾ 5.5-6.0 ⁴⁾	2 ⁴⁾	7.69 ⁴⁾	492 ⁴⁾	88.17 ⁴⁾	IV 级 ⁴⁾	8.5-9.0 , ⁴⁾ 5.0-5.5 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	55 ⁴⁾	9.86 ⁴⁾	V 级 ⁴⁾	>9.0, ⁴⁾ ≤5.0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	1 ⁴⁾	0.18 ⁴⁾	1、表格编号错误 2、表格显示全县 pH100%为Ⅲ级，与【第 45 页表 15】中出现Ⅳ级、Ⅴ级 pH 不符；
土壤三普分级 ⁴⁾		样点统计 ⁴⁾		制图统计 ⁴⁾																																																																																		
分级 ⁴⁾	值域 ⁴⁾	数 量/个 ⁴⁾	占 比 /% ⁴⁾	面 积 / 亩 ⁴⁾	占 比 /% ⁴⁾																																																																																	
I 级 ⁴⁾	6.5-7.5 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾																																																																																	
II 级 ⁴⁾	7.5-8.0, ⁴⁾ 6.0-6.5 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾																																																																																	
III 级 ⁴⁾	8.0-8.5, ⁴⁾ 5.5-6.0 ⁴⁾	55 8 ⁴⁾	100 ⁴⁾	110511 2 ⁴⁾	100 ⁴⁾																																																																																	
IV 级 ⁴⁾	8.5-9.0, ⁴⁾ 5.0-5.5 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾																																																																																	
V 级 ⁴⁾	>9.0, ⁴⁾ ≤5.0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾																																																																																	
土壤三普分级 ⁴⁾		土壤二普 ⁴⁾		土壤三普 ⁴⁾																																																																																		
分级 ⁴⁾	值域 ⁴⁾	数量/ 个 ⁴⁾	占 比 /% ⁴⁾	数量/ 个 ⁴⁾	占 比 /% ⁴⁾																																																																																	
I 级 ⁴⁾	6.5-7.5 ⁴⁾	10 ⁴⁾	38.46 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0 ⁴⁾																																																																																	
II 级 ⁴⁾	7.5-8.0 , ⁴⁾ 6.0-6.5 ⁴⁾	14 ⁴⁾	53.85 ⁴⁾	10 ⁴⁾	1.79 ⁴⁾																																																																																	
III 级 ⁴⁾	8.0-8.5 , ⁴⁾ 5.5-6.0 ⁴⁾	2 ⁴⁾	7.69 ⁴⁾	492 ⁴⁾	88.17 ⁴⁾																																																																																	
IV 级 ⁴⁾	8.5-9.0 , ⁴⁾ 5.0-5.5 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	55 ⁴⁾	9.86 ⁴⁾																																																																																	
V 级 ⁴⁾	>9.0, ⁴⁾ ≤5.0 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	1 ⁴⁾	0.18 ⁴⁾																																																																																	
2	易随水蒸发在表层富集；林地、草地的人为扰动（如采伐、放牧）破坏了土壤有机质积累过程，进一步削弱了酸碱缓冲性能，使得土壤对碱性物质的调控能力大幅降低。⁴⁾ 表 16·临漳县土壤 pH 分级历史变化(制图统计)⁴⁾ <table><tr><th colspan="2">土壤三普分级⁴⁾</th><th colspan="2">土壤二普（或其他）⁴⁾</th><th colspan="2">土壤三普⁴⁾</th></tr><tr><th>分级⁴⁾</th><th>值 域 / (g/kg) ⁴⁾</th><th>面 积 / 亩⁴⁾</th><th>占 比 /%⁴⁾</th><th>面 积 / 亩⁴⁾</th><th>占 比 /%⁴⁾</th></tr><tr><td>I 级⁴⁾</td><td>6.5-7.5⁴⁾</td><td>106567 9⁴⁾</td><td>97.6 6⁴⁾</td><td>0⁴⁾</td><td>0.00⁴⁾</td></tr></table>	土壤三普分级 ⁴⁾		土壤二普（或其他） ⁴⁾		土壤三普 ⁴⁾		分级 ⁴⁾	值 域 / (g/kg) ⁴⁾	面 积 / 亩 ⁴⁾	占 比 /% ⁴⁾	面 积 / 亩 ⁴⁾	占 比 /% ⁴⁾	I 级 ⁴⁾	6.5-7.5 ⁴⁾	106567 9 ⁴⁾	97.6 6 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾	表头单位错误																																																																		
土壤三普分级 ⁴⁾		土壤二普（或其他） ⁴⁾		土壤三普 ⁴⁾																																																																																		
分级 ⁴⁾	值 域 / (g/kg) ⁴⁾	面 积 / 亩 ⁴⁾	占 比 /% ⁴⁾	面 积 / 亩 ⁴⁾	占 比 /% ⁴⁾																																																																																	
I 级 ⁴⁾	6.5-7.5 ⁴⁾	106567 9 ⁴⁾	97.6 6 ⁴⁾	0 ⁴⁾	0.00 ⁴⁾																																																																																	

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☐ 符合 ☐ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无本章节	
2		
3		

问题类别七：第六至八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无第八章土特产品评价。	
2		
3		

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
------	------

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☐ 符合 ☒ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	县域土壤整体分为潮土、褐土、人工土三大土类，全域所有土壤类型的土地适宜性均为中度宜耕，无高度适宜、勉强适宜耕地分布，宜园、宜林、宜草、不适宜类土地面积全部为 0，无任何土壤类型天然适配果园、林地、牧草种植，这是本次统计最核心的结论。该结果匹配临漳县漳河冲积平原的自然地理特征，全域土壤均为河流沉积形成的农耕型土壤，土层深厚、光热水土条件适配粮油种植，无山地、缓坡、河滩荒滩等支撑林果、牧草发育的立地条件，从土壤本底层面决定了县域土地天然仅适合粮食耕作的核心属性。 提前落实排涝调度，降低灾害损失。 五、园地特色作物提升区——因土种植，品牌赋能 （一）区域范围与土壤特征 打造绿色蔬菜生产基地，对接京津冀与中原城市群消费市场，提升农产品附加值。 三、漳河故道沙质土壤改良区——生态固沙，特色种养 （一）区域范围与土壤特征	前文土壤农业利用适宜性评价全县全部为中度宜耕，宜园、宜林、宜草均为 0，但第七章仍提出“园地特色作物提升区”“漳河故道沙质土壤改良区”发展特色林果等，需说明是否与适宜性评价冲突。

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☐ 存在问题
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☐ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	报告标题基本符合，但目录不完整，只列到第七章；图表编号部分混乱，如“表 3-1”出现多次，“图 3-1”等编号不连续；单位和小数位不统一；仅提交 word 文件	
2		
3		